



Slimību profilakses un
kontrolē centrs



Uzvari cīņā ar vēzi, pirms tā sākas!

MAMMU, TĒTI, VAI JŪS ESAT IZDARĪJUŠI VISU IESPĒJAMO, LAI PASARGĀTU MANI NO VĒŽA?

Vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu (CPV) ir valsts apmaksāta meitenēm vecumā no 12 līdz 17 gadiem un zēniem vecumā no 12 līdz 14 gadiem. CPV vakcīna pasargā no dažādām CPV izraisītām sasilšanām.

Par iespēju vakcinēties jautā ģimenes ārstam!

Vizītes datums pie
ģimenes ārsta:



dd / mm / gg

**1.
pote**

dd / mm / gg

**2.
pote**

dd / mm / gg

Divas potes, ja vakcinācija
veikta 12 līdz 15 g. v.

**3.
pote**

dd / mm / gg

Trīs potes, ja vakcinācija
uzsākta pēc 15 g. v.

Zini faktus par CPV!



Cilvēka papilomas vīruss, saukts arī par CPV vai HPV (ang. val. *Human papillomavirus*), var izraisīt dzemdes kakla, maksts, vulvas vēža attīstību sievietēm, dzimumlocekļa vēža attīstību vīriešiem, anālā kanāla, kā arī mutes un rīkles vēža attīstību gan sievietēm, gan vīriešiem.



Ar CPV parasti inficējas dzimumkontakta ceļā.
8 no 10 seksuāli aktīviem cilvēkiem ir inficēti ar CPV.



CPV izraisa 99 % gadījumu dzemdes kakla vēzi, 95 % – anālā kanāla vēzi, vairāk nekā 70 % – mutes dobuma un rīkles vēzi.



Latvijā dzemdes kakla vēzis ir otrs biežāk sastopamais ļaundabīgais audzējs gados jaunām sievietēm.



Vakcinācijas pret CPV mērķis ir novērst priekšvēža izmaiņas un saslimšanu ar dzemdes kakla vēzi un citām CPV izraisītām onkoloģiskajām slimībām.



Visaugstākā vakcinācijas efektivitāte ir pusaudžiem pirms dzimumattiecību uzsākšanas.

**Kā pasargāt sevi no vēža un par iespēju vakcinēties jautā
savam ģimenes ārstam vai ārstam speciālistam.**

Vairāk informācijas: www.spkc.gov.lv