

ВАКЦИНАЦІЯ

проти сезонного грипу та Covid-19

рекомендована всій громаді

Адаптовані вакцини проти Covid-19 доступні у лікарів загальної практики та кабінетах вакцинації. Нагадуємо, що зараз є можливість зробити щеплення від грипу, тим самим убезпечивши себе від ускладнень, викликаних грипом.

Вакцинацію від грипу та Covid-19 можна отримати за одне щеплення.

Грип

Вакцинація особливо рекомендована особам, які за державну оплату можуть її отримати:

- дітям віком до 17 років (включно);
- дітям та дорослим із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом (імуносупресією);
- вагітним жінкам;
- медичному персоналу та медичному допоміжному персоналу, які під час виконання службових обов'язків знаходяться в тісному контакті з хворими;
- працівникам центрів довгострокового соціального догляду, які під час виконання службових обов'язків перебувають у тісному контакті з клієнтами;
- клієнтам центрів довготривалого соціального догляду;
- особам віком від 50 років;
- людям із психічними захворюваннями.

КУДИ звернутися для вакцинації?

- до свого сімейного лікаря;
- в кабінет щеплень лікувального закладу;
- на сайті [Manavakcina.lv](https://manavakcina.lv).

Вакцинацію від грипу та Covid-19 можна і потрібно проводити одночасно. Вакцина проти грипу не захищає від зараження Covid-19, а щеплення від Covid-19 не захищає від зараження грипом.

проти COVID-19

Особливо рекомендується вакцинація:

- медичному персоналу;
- людям похилого віку від 65 років;
- людям із хронічними захворюваннями;
- людям з ослабленим імунітетом та тим, хто тісно контактує з ними;
- довготривалим мешканцям центрів соціальної допомоги та обслуговуючому їх персоналу;
- вагітним жінкам.

КУДИ звернутися для вакцинації?

- до свого сімейного лікаря;
- в кабінет щеплень лікувального закладу;
- на сайті [Manavakcina.lv](https://manavakcina.lv).

Коли робити вакцинацію від Covid-19

- **через 3 місяці** після отримання останньої вакцини для людей віком від 65 років і людей з ослабленим імунітетом;
- **через 6 місяців** (але не раніше ніж через 3 місяці) після отримання останньої вакцини для інших осіб;
- **через 4-6 місяців** (але не раніше, ніж через 3 місяці) після зараження Covid-19.