



Slimību profilakses un kontroles centrs

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, fakss 67501591, e-pasts pasts@spkc.gov.lv

EPIDEMIOLOĢIJAS BIĻETENS

Nr. 22 (1941)

2025. gada 30. aprīlī

Gripa, Covid-19 un citas akūtas augšējo elpceļu infekcijas 2024. – 2025. gada sezonā

Saturs

KOPSAVILKUMS PAR 2025. GADA 17. NEDĒĻU	1
GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS	3
STACIONĒTIE PACIENTI SARI GADĪJUMOS	6
VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒJUMS	9
GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI	11
MIKROBIOLOĢIJAS DATI	12
COVID-19 INFEKCIJAS DATI	16
PVO EIROPAS REĢIONA GRIPAS UZRAUDZĪBAS TĪKLA INFORMĀCIJA	17
PAR GRIPAS MONITORINGU	20

KOPSAVILKUMS PAR 2025. GADA 17. NEDĒĻU

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumu Nr. 948 „Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem”¹ 6.5.2. punktu un, pamatojoties uz 2025. gada 14. – 16. nedēļas monitoringa datiem, Slimību profilakses un kontroles centrs paziņo par gripas epidēmijas beigām no 2025. gada 25. aprīļa.

2025. gada 17. nedēļā (21.04. – 27.04.) gripas monitoringā iesaistītajās ambulatorajās iestādēs (38 ģimenes ārsta prakses) gripa klīniski noteikta 28 pacientiem, citas akūtas augšējo elpceļu infekcijas (turpmāk – AAEI) – 592 pacientiem un pneimonija – 54 pacientiem.

Gripas intensitāte monitoringa populācijā (67 738 reģistrētie pacienti), rēķinot uz 100 000 iedzīvotājiem, 17. nedēļā samazinājās līdz zemam līmenim.

Vēršanās ambulatorajās iestādēs citu AAEI gadījumos 17. nedēļā ir samazinājusies, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.

Pacientu skaits, kas vērsušies ambulatorajās iestādēs pneimoniju gadījumos, šajā sezonā vismaz divas reizes pārsniedz iepriekšējo sezonu rādītājus, bet 17. nedēļā saslimstība ar pneimonijām pakāpeniski turpināja samazināties.

Monitoringā iekļautajās 10 stacionārajās ārstniecības iestādēs Rīgā un citos Latvijas reģionos 17. nedēļā stacionēto pacientu īpatsvars smagas akūtas respiratoras infekcijas (turpmāk – SARI) gadījumos ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.

Iepriekšējā nedēļā saņemts viens paziņojums par nāves gadījumu pacientam ar apstiprinātu gripas infekciju.

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS) Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorijā (turpmāk – NMRL) 17. nedēļā gripas pozitīvo paraugu

¹ „Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem” <https://likumi.lv/ta/id/148626-noteikumi-par-gripas-pretepidemijas-pasakumiem>

īpatsvars samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu (1,9%). Kopš sezonas sākuma apstiprināti galvenokārt *A tipa* gripas vīrusi (galvenokārt *A/H1pdm* apakštips), tomēr pēdējo nedēļu laikā palielinās arī apstiprināto *B tipa* gripas vīrusu īpatsvars. Respiratori sincitiālais vīruss (RSV) 17. nedēļā apstiprināts 11 paraugos (3,4%), kas ir mazāk kā iepriekšējā nedēļā.

SARS-CoV-2 vīrusa pozitīvo paraugu īpatsvars 17. nedēļā samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu (2,5%), un vīrusa izplatībai sezonas laikā vērojama lejupejoša tendence.

Galvenie akūtu augšējo elpceļu infekciju monitoringa rādītāji pēdējo trīs nedēļu laikā

Ambulatorās veselības aprūpes iestāžu monitoringa rādītāji*

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	15.	16.	17.
Pacientu ar elpceļu infekciju simptomiem īpatsvars no kopējā ambulatoro apmeklējumu skaita	20%	18%	15%
AAEI gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	1 345,2	975,2	874,0
Gripas gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	136,2	90,3	41,3
Pneimoniju gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	93,2	88,9	79,7

*Monitoringā iekļautās ambulatorās ārstniecības iestādes (38 ģimenes ārstu prakses)

Stacionāro ārstniecības iestāžu monitoringa rādītāji

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	15.	16.	17.
SARI stacionēto pacientu skaits*	199	186	160
SARI īpatsvars no kopējā uzņemto pacientu skaita*	4,5%	4,8%	3,7%
Covid-19 stacionēto pacientu skaits**	22	17	22
Nāves gadījumu skaits Covid-19 pacientiem**	3	5	5
Nāves gadījumu skaits gripas pacientiem***	1	4	1

*Monitoringā iekļauto 10 stacionāro ārstniecības iestāžu dati

**Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmas (SAIRIS) dati (27 slimnīcas)

***Saņemto paziņojumu skaits (MK noteikumu Nr. 948 2. pielikums)

Laboratoriju monitoringa rādītāji

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	15.	16.	17.
Gripas pozitīvo paraugu īpatsvars*	7,2%	7,7%	1,9%
RSV pozitīvo paraugu īpatsvars*	5,6%	7,4%	3,4%
SARS-CoV-2 pozitīvo paraugu īpatsvars**	3,7%	3,6%	2,5%

*SIA RAKUS NMRL dati

**Nacionālā veselības dienesta datu centralizētās sistēmas (DCS) dati

Izglītības iestāžu monitoringa rādītāji*

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	15.	16.	17.
Vidējais vispārējās izglītības iestāžu apmeklējuma īpatsvars	88,6%	89,2%	89,1%
Vidējais pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējuma īpatsvars	72,0%	72,1%	79,5%


*Monitoringā iesaistīto izglītības iestāžu dati

GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS

2025. gada 17. nedēļā informācija par pacientu skaitu, kas vērsušies ambulatorajās ārstniecības iestādēs akūtu elpceļu infekciju gadījumos, saņemta no 38 ģimenes ārstu praksēm (turpmāk – ĢĀP). Pacientu īpatsvars ambulatorajās iestādēs 17. nedēļā ar elpceļu infekcijām veido 15% no kopējā iestādē vērsušos pacientu skaita.


Gripas intensitāte 2024.–2025. gadā un iepriekšējās sezonās

2025. gada 17. nedēļā reģistrēti 28 klīniski apstiprināti gripas gadījumi. Gripas izplatības intensitāte samazinājās līdz 41,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem (16. nedēļā 90,3 gadījumi uz 100 000 iedz.). Kopš sezonas sākuma (2024. gada 40. nedēļa) ĢĀP kopā reģistrēti 4 024 gripas gadījumi.




Gripas intensitāte atsevišķās vecuma grupās

Saslimstība ar gripu, līdzīgi kā iepriekšējā sezonā, galvenokārt sastopama bērniem līdz 14 gadu vecumam. Iepriekšējā nedēļā saslimstība samazinājās visās vecuma grupās.




Gripas intensitāte administratīvajās teritorijās 2023.–2024. un 2024.–2025. gada sezonā

2025. gada 17. nedēļā klīniski apstiprināti gripas gadījumi reģistrēti sešās monitoringa teritorijās. Augstākā gripas intensitāte reģistrēta Jēkabpils novadā – kopā ziņots par 3 gripas gadījumiem (78,3 gad. uz 100 000 iedz.). Gripas gadījumi reģistrēti arī Gulbenes novadā (61,3 gad. uz 100 000 iedz.), Liepājā (61,0 gad. uz 100 000 iedz.), Rīgā (53,9 gad. uz 100 000 iedz.), Daugavpilī (45,3 gad. uz 100 000 iedz.) un Jūrmalā (18,8 gad. uz 100 000 iedz.).




Akūtas augšējo elpceļu infekcijas (AAEI) 2024.–2025. gadā un iepriekšējās sezonās

2025. gada 17. nedēļā vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs citu AAEI gadījumos (874,0 uz 100 000 iedz.) samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Kopumā saslimstība ar AAEI šajā sezonā ir līdzīga iepriekšējo piecu sezonu vidējiem rādītājiem.




Akūtu augšējo elpceļu infekciju (AAEI) intensitāte atsevišķās vecuma grupās

Kopš monitoringa sezonas sākuma biežāk ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām, tāpat kā iepriekšējās sezonās, slimo bērni 0 – 14 gadu vecuma grupā. 2025. gada 17. nedēļā saslimstība ar AAEI vecuma grupā 0 – 4 gadi palielinājās. Pārējās vecuma grupās saslimstība samazinājās.




Pneimonijas 2024.–2025. gadā un iepriekšējās sezonās

Kopš sezonas sākuma Latvijā reģistrēta augstākā saslimstība ar pneimonijām, kāda netika novērota vismaz desmit pēdējās sezonās. Šajā monitoringa sezonā augstākie saslimstības rādītāji vērojami 2024. gada 49. nedēļā (232,3 gad. uz 100 000 iedz.) un 2025. gada 8. nedēļā (234,2 gad. uz 100 000 iedz.). Sākot ar 9. nedēļu saslimstība ar pneimonijām pakāpeniski samazinājusies. Iepriekšējā, 17. nedēļā ģimenes ārstu praksēs vērsušies 54 pacienti, kuriem noteikta pneimonija jeb 79,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem.



Pneimoniju intensitāte atsevišķās vecuma grupās


Kopš sezonas sākuma visaugstākā saslimstība ar pneimonijām reģistrēta bērniem 0 – 14 gadu vecumā. Iepriekšējā nedēļā vecuma grupās 0 – 4 gadi un 15 – 64 gadi saslimstība ar pneimonijām nedaudz palielinājās. Pārējās vecuma grupās saslimstība samazinājās.



STACIONĒTIE PACIENTI SMAGU AKŪTU RESPIRATORO INFEKCIJU (SARI) GADĪJUMOS


Stacionētie SARI pacienti 2024.–2025. gada sezonā

Par stacionētiem pacientiem smagas akūtas respiratoras infekcijas (turpmāk – SARI) gadījumos un to testēšanu ziņoja 10 stacionārās aprūpes iestādes, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS). 2025. gada 17. nedēļā stacionēto SARI pacientu īpatsvars ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu – 3,7% no kopā stacionētajiem pacientiem.




Stacionēti SARI pacienti pa vecuma grupām

2025. gada 17. nedēļā stacionēto pacientu bija visvairāk vecuma grupā 65 un vairāk gadi (45,0%), bet stacionēti pacienti arī vecuma grupās 15 – 64 gadi (29,4%), 0 – 4 gadi (13,1%) un 5 – 14 gadi (12,5%).




Stacionēto pacientu testēšana uz gripu

Kopš monitoringa sezonas 48. nedēļas ir pakāpeniski palielinājies pozitīvo gripas testu īpatsvars stacionārās aprūpes iestādēs, 8. nedēļā sasniedzot augstāko rādītāju kopš sezonas sākuma (26,6%). 2025. gada 17. nedēļā stacionāros uz gripu tika testēts 351 pacients, t.sk. 10 gadījumos (2,8%) apstiprināta gripa: *A tipa* gripas vīruss noteikts 5 pacientiem un *B tipa* gripa – 5 pacientiem.




Stacionēto pacientu testēšana uz Covid-19

Kopš sezonas sākuma ik nedēļu vairāk nekā 600 pacienti stacionāros tika testēti Covid-19 infekcijas noteikšanai un kopumā pozitīvo paraugu īpatsvaram ir vērojama lejupejoša tendence. Pozitīvo paraugu īpatsvars šajā periodā veido vidēji 2,5%. 2025. gada 17. nedēļā pozitīvo Covid-19 paraugu īpatsvars samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. No 639 testētajiem pacientiem SARS-CoV-2 apstiprināts 3 pacientiem (0,5%).



Stacionēto pacientu testēšana uz RSV

Apstiprināto RSV infekcijas gadījumu īpatsvars kopš sezonas sākuma ir bijis svārstīgs. 2025. gada 17. nedēļā RSV pozitīvo paraugu īpatsvars ir saglabājies iepriekšējās nedēļas līmenī. RSV infekcija tika apstiprināta 5 pacientiem (6,0%) no 83 testētiem pacientiem.



VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒJUMS

2025. gada 17. nedēļā (ceturtdien) vispārējās izglītības iestādes apmeklēja aptuveni tikpat skolēnu, cik iepriekšējā nedēļā – vidēji 89,1%. Vismākais apmeklējums reģistrēts Rīgā.

Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto skolēnu skaita (%)									
	Daugavpils	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils novads	Jūrmala	Liepāja	Rēzekne	Rīga	Valmieras novads	Ventspils
40.	91,0	87,6	83,9	93,6	86,6	90,0	98,6	90,0	68,8	92,9
41.	87,0	92,1	86,3	92,3	89,1	89,9	98,3	89,9	78,8	92,3
42.	85,7	83,9	87,2	91,5	87,2	89,8	98,1	89,5	80,5	91,7
43.	Brīvdienas									
44.	94,8	92,5	87,8	86,6	87,2	90,8	97,4	91,9	84,0	92,6
45.	88,0	90,9	86,4	91,7	87,7	89,6	96,2	82,8	91,0	91,7
46.	88,6	90,1	83,1	89,7	86,8	86,3	96,6	89,4	91,2	91,9
47.	86,8	90,3	81,7	87,9	83,9	89,6	97,4	89,8	93,1	87,1
48.	87,4	87,5	79,3	89,6	84,4	86,8	96,9	89,6	93,6	89,2
49.	86,1	88,3	82,0	88,1	87,1	89,4	98,1	89,3	94,7	90,0
50.	86,2	89,3	80,4	83,0	86,3	89,5	95,7	88,3	95,7	90,5
51.	83,7	91,8	78,8	90,2	87,0	89,0	98,6	88,3	92,2	91,1
52.	Brīvdienas									
01.	Brīvdienas									
02.	88,0	91,7	87,8	92,4	87,3	89,7	96,2	90,6	94,1	92,3
03.	87,0	89,4	86,4	92,2	86,5	87,1	98,1	89,7	90,9	91,4
04.	85,9	84,6	78,6	90,9	83,7	86,2	89,0	86,1	91,9	90,5
05.	83,9	92,6	73,8	86,8	77,6	83,9	89,2	85,7	94,1	87,1
06.	76,3*	86,8	71,8*	85,0	82,2*	74,7*	81,5	84,6*	92,2	85,3
07.	84,2	91,6	83,1	73,4*	85,0	83,9	76,5	87,8	94,7	86,9*

08.	84,7	85,6	83,5	89,4	82,1	84,1	90,2	85,6	90,3	86,4*	85,7
09.	82,7	85,2	80,8	84,3	83,2	83,3	89,0	86,2	86,0	84,1	84,6
10.	82,4	87,1	80,8	82,6	82,8	83,6	93,3	84,6	91,2	86,6	84,7
11.	Brīvdienas										
12.	90,0	92,7	83,9	92,7	81,7	87,2	94,5	89,3	83,8	92,2	89,5
13.	88,7	90,3	86,1	93,3	86,7	87,6	96,2	90,4	89,8	93,1	90,4
14.	89,3	91,9	86,7	89,8	86,3	86,7	95,7	90,1	90,2	92,1	89,9
15.	86,7	90,3	83,2	81,5	85,6	86,0	95,0	90,4	91,4	90,7	88,6
16.	87,8	90,4	85,0	88,7	86,0	83,9	93,3	90,4	88,3	91,9	89,2
17.	89,5	92,5	88,0	91,3	89,2	86,5	94,0	84,9	93,3	95,0	89,1
Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu (±)	1,7	2,1	3,0	2,6	3,2	2,7	0,7	-5,5	5,0	3,1	-0,1

*Izglītības iestāžu apmeklējumu ietekmē 1. klases izglītojamo brīvlaiks

Pirmsskolas izglītības iestādes 2025. gada 17. nedēļā (ceturtdien) apmeklēja vairāk bērnu nekā iepriekšējā nedēļā – vidēji 79,5%. Viszemākais apmeklējums reģistrēts Jēkabpils novadā.

Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto bērnu skaita (%)										
	Daugavpils	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils novads	Jūrmala	Liepāja	Rēzekne	Rīga	Valmieras novads	Ventspils	Vidēji
40.	73,4	65,9	75,7	60,8	79,4	67,6	69,3	70,8	71,2	68,1	70,1
41.	67,8	69,9	77,0	56,2	65,5	68,8	78,1	71,6	68,3	69,2	69,0
42.	72,1	69,1	77,4	61,8	64,5	74,2	64,0	73,2	74,5	70,0	70,7
43.	71,8	61,8	70,4	57,4	58,8	65,6	68,4	62,9	65,9	60,9	62,9
44.	82,1	65,9	71,2	65,0	72,6	74,7	66,7	76,1	75,0	70,4	73,0
45.	81,4	69,1	68,6	64,5	66,8	73,5	81,6	74,6	83,7	66,1	71,3
46.	76,1	72,4	72,1	64,8	68,5	69,0	79,8	74,6	82,2	63,9	70,3
47.	76,1	70,7	70,8	57,6	65,8	64,7	73,7	70,3	75,5	63,8	67,4
48.	68,4	67,5	71,2	60,3	63,9	73,5	71,9	73,4	75,5	68,2	69,4
49.	77,4	61,0	72,6	64,5	67,2	68,8	80,7	74,4	77,4	69,1	71,3
50.	78,7	71,5	75,7	62,6	68,9	71,5	70,2	74,6	73,1	69,9	71,8
51.	76,4	73,2	62,8	69,5	64,3	76,7	74,6	74,6	70,2	67,7	71,1
52.	Brīvdiena										
01.	56,8	42,3	32,3	31,8	50,5	31,2	71,1	43,5	41,3	30,7	39,4
02.	80,7	72,4	73,9	70,2	76,7	82,6	83,3	80,7	81,7	76,9	78,3
03.	78,1	78,9	75,2	64,0	68,5	74,4	71,9	74,8	72,1	71,3	72,6
04.	69,8	67,5	60,2	57,9	70,2	62,0	62,3	68,8	67,8	71,3	67,7
05.	63,8	73,2	66,8	55,4	65,8	55,0	65,8	68,3	67,3	63,8	64,6
06.	65,1	68,3	65,5	56,2	72,3	71,3	70,2	68,4	68,3	63,0	66,3
07.	71,8	69,9	69,0	61,8	67,6	70,6	60,5	71,7	75,5	63,6	68,1
08.	68,1	70,7	70,4	58,4	61,1	69,5	63,2	71,0	63,5	63,7	66,5
09.	70,1	56,9	64,6	58,1	63,2	72,6	60,5	69,8	49,0	61,6	64,9
10.	71,1	32,5	63,3	57,6	71,0	62,0	61,4	68,4	62,0	61,0	64,0
11.	67,4	56,1	57,1	54,7	60,5	52,0	57,9	61,0	65,9	58,1	59,2
12.	74,1	78,9	70,8	68,2	69,7	72,9	74,6	64,9	70,2	76,0	70,7
13.	73,4	52,8	65,9	64,8	74,6	74,7	76,3	75,6	78,8	74,7	73,5
14.	73,8	49,6	74,3	66,0	72,3	77,1	81,6	76,2	86,5	72,6	73,9
15.	78,1	69,9	71,7	64,0	67,9	71,7	64,9	73,3	79,8	72,5	72,0
16.	77,4	72,4	65,0	65,0	70,0	79,4	63,2	72,4	82,7	71,5	72,1
17.	81,4	78,0	74,8	70,0	73,7	86,4	85,1	80,2	87,0	80,0	79,5
Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu (±)	4,0	5,7	9,7	4,9	3,8	7,0	21,9	7,9	4,3	8,6	7,4

GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI


2025. gada 17. nedēļā saņemts viens paziņojums par nāves gadījumiem pacientam ar apstiprinātu *A tipa* gripas infekciju. Pacients bija vecumā virs 80 gadiem un tam bija noteiktas arī hroniskas slimības (sirds un asinsvadu slimības, hroniskas aknu, nieru slimības).

Kopā kopš sezonas sākuma saņemti 82 paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju. Dati papildināti no Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes, kur *Medicīnas apliecībā par nāves cēloni* diagnoze *gripa* (SSK kods J09–J11) bija norādīta kā

viens no nāves cēloņiem vēl 20 mirušajiem pacientiem. Kopā apkopota informācija par 102 nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju.

Lielākā daļa mirušo pacientu bija vecumā virs 60 gadiem. Visiem pacientiem bija noteiktas vairākas hroniskas slimības, tostarp sirds un asinsvadu slimības, elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, imūnsupresija, onkoloģiskas slimības, hroniskas aknu un nieru slimības, nervu sistēmas slimības un citas slimības, tostarp smagas gaitas, kā arī tādi riska faktori kā alkohola lietošana, smēķēšana, fiziska vai psihiska pārslodze. Gripa var būt kā viens no apstākļiem, kas veicinājuši nāves iestāšanos personām ar hroniskām saslimšanām.

Iepriekšējā 2023. – 2024. gada sezonā reģistrēti 106 nāves gadījumi.



MIKROBIOLOĢIJAS DATI

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (RAKUS) Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorijā (NMRL) kopš sezonas sākuma uz dažādiem elpceļu patogēniem izmeklēti vairāk nekā 10 000 klīniskie paraugi.

Gripas A tipa un B tipa vīrusu un RSV noteikšana klīniskajos paraugos

2025. gada 17. nedēļā pozitīvo gripas paraugu īpatsvars ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu (1,9%) un kopš monitoringa 12. nedēļas saslimstībai ar gripu ir vērojama lejupejoša tendence. Iepriekšējā nedēļā noteikti 6 *B tipa* gripas vīrusi, savukārt *A tipa* gripas vīrusi nav noteikti.

RSV pozitīvo paraugu īpatsvars 17. nedēļā ir noteikts 11 paraugos (3,4%), un ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.

Monitoringa nedēļa	Izmeklēto paraugu skaits	Gripas vīrusi			Respiratori sincitiālais vīruss (RSV)	
		t.sk. pozitīvi		Pozitīvo paraugu īpatsvars	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars
		A gripa	B gripa			
40.	226	1	0	0,4%	1	0,4%
41.	222	0	0	0,0%	1	0,5%
42.	242	1	0	0,4%	1	0,4%
43.	241	3	0	1,2%	0	0,0%
44.	227	4	0	1,8%	0	0,0%
45.	217	0	0	0,0%	1	0,5%
46.	246	2	1	1,2%	3	1,2%
47.	228	1	2	1,3%	0	0,0%
48.	243	1	0	0,4%	1	0,4%
49.	242	5	2	2,9%	2	0,8%
50.	285	25	4	10,2%	0	0,0%
51.	318	31	1	10,1%	7	2,2%
52.	367	60	11	19,3%	4	1,1%
01.	297	41	4	15,2%	5	1,7%
02.	420	75	14	21,2%	6	1,4%
03.	361	61	6	18,6%	9	2,5%
04.	451	87	12	22,0%	6	1,3%
05.	421	56	11	15,9%	8	1,9%
06.	388	75	11	22,2%	10	2,6%
07.	367	41	12	14,4%	11	3,0%
08.	449	98	16	25,4%	18	4,0%
09.	526	133	25	30,0%	21	4,0%
10.	507	96	32	25,2%	26	5,1%
11.	427	65	21	20,1%	22	5,2%
12.	422	43	20	14,9%	22	5,2%
13.	377	33	10	11,4%	28	7,4%
14.	406	27	10	9,1%	23	5,7%
15.	374	16	11	7,2%	21	5,6%
16.	339	11	15	7,7%	25	7,4%
17.	319	0	6	1,9%	11	3,4%
Kopā	10 155	1 092	257	13,3%	293	2,9%

Gripas vīrusu tipēšana

Šajā sezonā kopā noteikti 1 349 gripas vīrusi, tostarp, 1 092 (80,9%) *A tipa* gripas vīrusi, no tiem 747 noteikts apakštips, un 257 (19,1%) *B tipa* gripas vīrusi, t.sk. 206 noteikta līnija. Kopš sezonas sākuma no tipētajiem gripas vīrusiem visbiežāk noteikts *AH1pdm09* apakštips (50,6%), tomēr pēdējo nedēļu laikā palielinās *AH3* apakštīpa un *B tipa* gripas vīrusu īpatsvars.

Gripas vīrusi	Skaits	Īpatsvars
<i>AH1pdm09</i>	482	50,6%
<i>AH3</i>	265	27,8%
<i>B/Victoria</i>	206	21,6%
<i>B/Yamagata</i>	0	0,0%
Kopā	953	100,0%

Citu elpceļu infekciju vīrusu noteikšana

2025. gada 17. nedēļā citi elpceļu vīrusi NMRL apstiprināti 48 gadījumos. Kopš sezonas sākuma biežāk noteikti rinovīrusi, koronavīrusi un hMPV (Cilvēka metapneimovīrusi) un mazāk – adenovīrusi, bokavīrusi un paragripa.

Monitoringa nedēļa	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi							Pozitīvie paraugi kopā	
		Paragripa	Adenovīrusi	Bokavīrusi	hMPV	Enterovīrusi	Koronavīrusi	Rinovīrusi	Skaits	Īpatsvars
40.	154	2	2	1	1	1	4	34	45	29,2%
41.	147	2	2	0	0	0	3	34	41	27,9%
42.	182	5	3	1	0	0	4	47	60	33,0%
43.	174	3	0	0	2	0	2	39	46	26,4%
44.	170	2	2	2	0	0	1	31	38	22,4%
45.	173	5	0	1	0	0	1	24	31	17,9%
46.	196	4	4	1	0	0	4	28	41	20,9%
47.	183	0	4	0	1	0	7	22	34	18,6%
48.	182	1	3	3	1	0	5	26	39	21,4%
49.	242	0	4	3	0	0	5	21	33	13,6%
50.	214	0	3	1	2	0	6	27	39	18,2%
51.	245	2	6	1	8	0	8	27	52	21,2%
52.	260	7	6	3	4	0	14	23	57	21,9%
01.	233	1	4	3	1	0	12	20	41	17,6%
02.	275	3	3	0	3	0	10	19	38	13,8%
03.	245	0	0	2	1	0	7	9	19	7,8%
04.	276	1	7	3	6	0	12	21	50	18,1%
05.	264	1	4	2	5	0	14	21	47	17,8%
06.	237	0	3	1	2	0	8	24	38	16,0%
07.	223	1	2	0	7	0	7	16	33	14,8%
08.	257	0	2	3	11	0	11	18	45	17,5%
09.	307	2	5	3	20	0	18	20	68	22,1%
10.	269	0	2	4	21	0	9	14	50	18,6%
11.	242	1	3	4	23	0	13	12	56	23,1%
12.	250	1	2	4	19	0	7	12	45	18,0%
13.	228	1	3	1	29	0	12	18	64	28,1%
14.	238	0	3	1	22	0	11	20	57	23,9%
15.	241	3	7	7	18	0	8	28	71	29,5%
16.	239	2	5	3	16	0	12	19	57	23,8%
17.	188	3	4	2	10	0	8	21	48	25,5%
Kopā	6 734	53	98	60	233	1	243	695	1 383	20,5%

Bakteriālo patogēnu noteikšana

Šajā sezonā izmeklēti 7 124 paraugi *Mycoplasma pneumoniae* baktēriju noteikšanai, pozitīvo paraugu īpatsvars veido vidēji 9,9%. 2025. gada 17. nedēļā, *Mycoplasma pneumoniae* pozitīvo paraugu īpatsvars nedaudz palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu (2,9%), tomēr ir zemāks, nekā sezonas sākumā.

Monitoringa nedēļa	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>			Izmeklēto paraugu skaits	<i>Streptococcus pneumoniae</i>		<i>Haemophilus influenzae</i>		<i>Chlamydia pneumoniae</i>		Kopējais pozitīvo paraugu skaits
	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)		t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)	
40.	130	23	17,7	37	11	29,7	5	13,5	0	0,0	39
41.	157	30	19,1	50	26	52,0	4	8,0	0	0,0	60
42.	164	26	15,9	39	21	53,8	12	30,8	0	0,0	59
43.	180	28	15,6	45	23	51,1	8	17,8	0	0,0	59
44.	162	37	22,8	37	20	54,1	11	29,7	0	0,0	68
45.	182	39	21,4	50	20	40,0	15	30,0	0	0,0	74
46.	205	46	22,4	71	26	36,6	24	33,8	0	0,0	96
47.	191	45	23,6	48	20	41,7	11	22,9	0	0,0	76
48.	182	36	19,8	46	19	41,3	8	17,4	0	0,0	63
49.	209	40	19,1	76	31	40,8	18	23,7	1	1,3	90
50.	233	31	13,3	80	35	43,8	27	33,8	0	0,0	93
51.	270	41	15,2	94	46	48,9	37	39,4	1	1,1	125
52.	244	24	9,8	36	16	44,4	12	33,3	0	0,0	52
01.	261	36	13,8	83	43	51,8	28	33,7	0	0,0	107
02.	278	28	10,1	77	33	42,9	30	39,0	0	0,0	91
03.	282	33	11,7	99	46	46,5	32	32,3	0	0,0	111
04.	266	24	9,0	62	24	38,7	20	32,3	0	0,0	68
05.	299	23	7,7	90	42	46,7	32	35,6	1	1,1	98
06.	251	22	8,8	99	59	59,6	48	48,5	0	0,0	129
07.	239	14	5,9	77	31	40,3	28	36,4	1	1,3	74
08.	281	12	4,3	81	40	49,4	24	29,6	0	0,0	76
09.	312	13	4,2	88	46	52,3	38	43,2	1	1,1	98
10.	288	9	3,1	74	36	48,6	26	35,1	0	0,0	71
11.	260	7	2,7	101	45	44,6	40	39,6	0	0,0	92
12.	289	5	1,7	107	54	50,5	48	44,9	0	0,0	107
13.	277	7	2,5	89	45	50,6	31	34,8	2	2,2	85
14.	268	11	4,1	98	53	54,1	40	40,8	0	0,0	104
15.	260	5	1,9	92	41	44,6	39	42,4	0	0,0	85
16.	294	6	2,0	111	63	56,8	52	46,8	0	0,0	121
17.	210	6	2,9	58	38	65,5	23	39,7	0	0,0	67
Kopā	7 124	707	9,9	2 195	1 053	48,0	771	35,1	7	0,3	2 538


COVID-19 INFEKCIJAS DATI

Latvijā datus par Covid-19 infekciju sniedz slimnīcas, laboratorijas un ģimenes ārstu prakses (Nacionālā veselības dienesta dati) un stacionārās ārstniecības iestādes, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS).

Kopš monitoringa sezonas sākuma ir vērojama lejupejoša tendence Covid-19 pozitīvo testu īpatsvaram un 17. nedēļā pozitīvo paraugu īpatsvars ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Pārskata nedēļā ir veikti 983 testi Covid-19 apstiprināšanai, no tiem 25 (2,5%) bija pozitīvi uz SARS-CoV-2 (16. nedēļā – 3,6%).


Stacionēto jauno pacientu skaits ar Covid-19 infekciju pa nedēļām

2025. gada 17. nedēļā slimnīcās uzņemto jauno Covid-19 pacientu skaits nedaudz palielinājās, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu (22 pacienti). Kopā šajā nedēļā stacionāros ārstējušies 47 pacienti ar Covid-19 infekciju, no tiem ar pamatdiagnozi Covid-19 bija 24 pacienti.




Mirušo Covid-19 pacientu skaits pa nedēļām

Kopš sezonas sākuma (40. nedēļas) reģistrēti 124 nāves gadījumi Covid-19 pacientiem. 2025. gada 17. nedēļā miruši pieci pacienti ar apstiprinātu Covid-19 infekciju.



Covid-19 notekūdeņu monitorings

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR monitoringa dati par SARS-COV-2 vīrusa RNS koncentrāciju notekūdeņos rāda, ka Latvijā kopumā tā mēreni pieaug.²



PVO EIROPAS REĢIONA GRIPAS UZRAUDZĪBAS TĪKLA INFORMĀCIJA

European Respiratory Virus Surveillance Summary (ERVISS)

16. nedēļas ziņojums³

Sezonas pārskats

2024. – 2025. gada elpceļu vīrusu sezonu ES/EEZ valstīs raksturo intensīva gripas izplatība, vienlaicīga RSV epidēmija. SARS-CoV-2 aktivitāte ir samazinājusies līdz zēmam līmenim, un līdz šim epidēmija nav novērota. RSV aktivitāte augstāko rādītāju sasniedza 2024. gada 52. nedēļā un kopš tā laika ir samazinājusies, taču tā joprojām ir paaugstināta un starp valstīm ir novērojamas būtiskas atšķirības RSV izplatībā. Gripas aktivitāte augstāko līmeni sasniedza 2025. gada 6. nedēļā, un tagad tiek novērota lejupejoša tendence visu apakštipu gripas vīrusiem. Lielākajā daļā valstu dominējošo *A tipa* gripas sezonu nomainīja *A/B tipa* gripas vīrusu līdzdominance vai *B tipa* gripas vīrusu dominance. Dažās valstīs, kurās *B tipa* gripas vīrusi bija dominējoši sezonas sākumā, tiek novērota pretēja tendence. Vislielāko ietekmi uz sekundāro aprūpi radījuši pacienti vecumā no 45 gadiem ar gripas infekciju un bērni līdz piecu gadu vecumam ar RSV infekciju. Kopš 2024. gada 51. nedēļas EuroMOMO⁴ ziņoja par augstu visu

² <https://bior.lv/lv/sars-cov-2-virusa-rns-kopiju-izplatiba-latvija>

³ <https://erviss.org/>

⁴ <https://www.euromomo.eu/>

cēloņu mirstību, galvenokārt pieaugušajiem vecumā no 45 gadiem, taču šobrīd mirstības līmenis ir sagaidāmajā diapazonā.

16. nedēļas pārskats

Lai gan vīrusa aktivitātes līmenis daudzos apstākļos samazinās, valstis ar pastāvīgu cirkulāciju var saskarties ar spiedienu uz veselības aprūpes sistēmām un slimnīcu kapacitāti, jo īpaši tur, kur tas jau ir ierobežots.

Pamatojoties uz datiem, kas saņemti līdz 2025. gada 16. nedēļai, primārajā un sekundārajā aprūpē vērsušos pacientu skaits akūtu elpceļu infekciju gadījumos liecina, ka ES/EEZ valstīs elpceļu vīrusu aktivitātes līmenis atgriežas pirms epidēmijas līmenī. Lielākajā daļā ziņotājvalstu gripas intensitāte ir atgriezies sākotnējā vai zemā līmenī, un lielākā daļa valstu tagad ziņo par pozitīvo testu skaitu, kas ir zemāks par 10%. Sezonas 16. nedēļā visbiežāk ziņots par *A(H3)* un *B* gripas vīrusiem. RSV aktivitāte ES/EEZ valstīs joprojām ir augsta, jo aptuveni vienā trešdaļā ziņotājvalstu RSV sezona bija vēlāka nekā parasti. SARS-CoV-2 aktivitāte visās valstīs joprojām ir zema. Lai gan elpceļu vīrusu aktivitātes līmenis samazinās, tas joprojām var ietekmēt veselības aprūpes sistēmas un slimnīcu kapacitāti, jo īpaši tajās valstīs, kur resursi jau ir ierobežoti.

Ieteikumi

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ir publicējis konkrētus sabiedrības veselības ieteikumus 2024. – 2025. gada ziemas sezonai.⁵ Valstīm, kurās turpinās elpceļu vīrusu izplatība, jānodrošina efektīva infekciju profilakses un kontroles pasākumu īstenošana ārstniecības iestādēs. Vakcinācija ir visefektīvākais līdzeklis aizsardzībai pret elpceļu vīrusu slimību smagām formām. Cilvēki, kuri ir tiesīgi saņemt vakcināciju, jo īpaši tie, kuriem ir lielāks smagu iznākumu risks, tiek aicināti vakcinēties. Balstoties uz provizoriskajiem gripas vācēšanas efektivitātes novērtējumiem 2024. – 2025. gada sezonai⁶, vairāku valstu primārās aprūpes un slimnīcu pētījumu centru iesniegto datu analīze liecina, ka gripas vakcinācija novērš no vienas trešdaļas līdz vairāk nekā trim ceturtdaļām gripas gadījumu tiem, kas vērsās pēc medicīniskās palīdzības primārajā aprūpē vai slimnīcās. Tomēr aizsardzības līmenis atšķiras atkarībā no vecuma grupas un pētījuma vietas. Agrīna pretvīrusu līdzekļu lietošana var samazināt simptomu ilgumu un novērst slimības progresēšanu līdz smagai gaitai neaizsargātām grupām. Nespecifiskā profilakse, piemēram, regulāra roku mazgāšana, fiziska distancēšanās, izvairīšanās no pulcēšanās un elpceļu aizsargmasku lietošana veselības aprūpes iestādēs arī ir efektīva epidēmijas kontrolei un elpceļu infekciju slimību izplatības ierobežošanai valstīs.

Pasaules veselības organizācijas Globāla gripas uzraudzības tīkla 2025. gada 23. aprīļa 523. ziņojums⁷

Ziemeļu puslodē gripas aktivitāte turpināja samazināties vai saglabājās zemā līmenī lielākajā daļā valstu. Par nelielu aktivitātes pieaugumu ziņoja dažas tropiskās Dienvidamerikas, Rietumāfrikas, Austrumeiropas un Austrumāzijas valstis. Pozitīvo gripas paraugu īpatsvars saglabājās paaugstināts (>10%) Amerikā (pārsvarā *A(H1N1)pdm09*), Rietumāfrikā (pārsvarā *A(H1N1)pdm09*), Ziemeļāfrikā, Austrumāfrikā (pārsvarā *A(H1N1)pdm09* un *A(H3N2)*), Eiropā

⁵ <https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/acute-respiratory-infections-eueea-epidemiological-update-and-current-public-health-0>

⁶ <https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2025.30.7.2500102>

⁷ <https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-updates/current-influenza-update>

(pārsvarā *A(H3N2)* un *B* vīrusi) un Rietumu (pārsvarā *A(H3N2)* un *B* vīrusi), Dienvidaustrumu (pārsvarā *A(H1N1)pdm09* un *B* vīrusi) un Austrumāzijā (pārsvarā *A(H1N1)pdm09*).

Dienvidu puslodē pozitīvo gripas paraugu īpatsvars kopumā bija zems (<10, izņemot dažas valstis dienvidu daļā (galvenokārt *A(H3N2)*), Austrumāfrikā un Okeānijā (pārsvarā *A(H1N1)pdm09*). Aktivitāte saglabājās zemā līmenī vai samazinājās visās valstīs, izņemot nelielu pieaugumu dažās mērenās Dienvidamerikas valstīs.

SARS-CoV-2

Pasaulē SARS-CoV-2 aktivitāte samazinājās vai saglabājās zemā līmenī lielākajā daļā valstu, izņemot dažas valstis Centrālamerikā un Karību jūras reģionā, Dienvidrietumu Eiropā un Rietumāzijā, kur arī pozitīvo gripas paraugu īpatsvars bija paaugstināts (>10%). Šis rādītājs bija paaugstināts arī atsevišķās valstīs mērenajā Dienvidamerikā un Austrumāzijā.

PVO Konsultatīvās sanāksmes 2024. gada 23. februāra ziņojums par gripas vakcīnas sastāvu 2024.–2025. gada sezonai Ziemeļu puslodē⁸

2024. gada 23. februārī notikušajā PVO Konsultatīvā sanāksmē tika apstiprināts vakcīnu sastāvs 2024. – 2025. gada sezonai Ziemeļu puslodē.

PVO iesaka izmantot trīsvērtīgas vakcīnas 2024. – 2025. gada gripas sezonā.

Vakcīnās, kuru ražošana tiek veikta izmantojot olas, jābūt šādiem komponentiem:

- *A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09* -līdzīgs vīruss;
- *A/Thailand/8/2022 (H3N2)* -līdzīgs vīruss;
- *B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)* -līdzīgs vīruss

Vakcīnās, kas tiek ražotas izmantojot šūnas jeb rekombinantās vakcīnās, jāiekļauj:

- *A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09* -līdzīgs vīruss;
- *A/Massachusetts/18/2022 (H3N2)* - līdzīgs vīruss;
- *B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)*-līdzīgs vīruss

PVO iesaka, izmantojot četrvērtīgas vakcīnas (šūnas jeb rekombinantās vakcīnās vai vakcīnas, kuru ražošanā tiek izmantotas olas) 2024. – 2025. gada gripas sezonā, kā *B/Yamagata* līnija komponentu iekļaut tālāk norādīto:

- *B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)* -līdzīgs vīruss.

⁸ <https://www.who.int/publications/m/item/recommended-composition-of-influenza-virus-vaccines-for-use-in-the-2024-2025-northern-hemisphere-influenza-season>

PAR GRIPAS MONITORINGU

2024.–2025. gada sezonā monitoringā ir iesaistītas 39 ĢĀP desmit administratīvajās teritorijās – Liepāja, Ventspils (Kurzeme), Daugavpils, Rēzekne (Latgale), Jūrmala (Pierīga), Valmieras novads, Gulbenes novads (Vidzeme), Jēkabpils novads, Jelgava (Zemgale) un Rīga.

Kopējais reģistrēto pacientu skaits atlasītajās ĢĀP – 69 730 jeb 3,7% no Latvijas iedzīvotāju populācijas un 6,8% no monitoringa populācijas. ĢĀP katru nedēļu sniedz datus par pacientu skaitu, kas vērsušies pēc medicīniskās palīdzības ārsta praksē gripas, Covid-19, citu AAEI un pneimoniju gadījumos, norādot pacientu skaitu pa vecuma grupām: 0-4, 5-14, 15-64 un 65 gadi un vairāk. Pēc ĢĀP sniegtās informācijas tiek aprēķināta gripas izplatības intensitāte pa teritorijām un pa vecuma grupām.

Lai novērtētu sezonālās gripas epidēmijas smagumu, katru sezonu monitoringā tiek iesaistītas slimnīcas visās administratīvajās teritorijās. Šajā sezonā ir iesaistītas 10 slimnīcas astoņās pilsētās: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA “Rēzeknes slimnīca”, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. Slimnīcas katru nedēļu, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS), ziņo par kopējo stacionāro pacientu skaitu pa vecuma grupām, kopējo un intensīvās terapijas nodaļā (ITN) stacionāro pacientu skaitu ar smagu akūtu respiratoru infekciju (turpmāk – SARI) pa vecuma grupām, SARI mirušo skaitu pa vecuma grupām un SARI pacientu skaitu, kas testēti uz gripu, Covid-19 un respiratori sincitiālo vīrusu (RSV), t.sk. pozitīvos gadījumus pa vecuma grupām.

Monitoringā tiek iekļautas vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes visās 10 administratīvajās teritorijās, kas katru nedēļu informē par iestāžu apmeklējumu ceturtdienā. 2024.-2025. gada sezonā tiks iesaistītas 29 skolas kurās mācās aptuveni 20 992 skolēni un 34 pirmsskolas izglītības iestādes, kuras apmeklē aptuveni 5 471 bērni.

Virusoloģijas dati par cirkulējošiem elpceļu vīrusiem tiek saņemti no SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (RAKUS) Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas (turpmāk – NMRL). Pārskatā tiek iekļauta informācija par izmeklēto klīnisko paraugu skaitu, kas tiek izmeklēti NMRL ar polimerāzes ķēdes reakcijas (RL-PKĶR) un Multiplex metodi elpceļu vīrusu noteikšanai. NMRL paraugi tiek saņemti no Rīgas stacionārajām ārstniecības iestādēm, no reģionālajām slimnīcām, kā arī no citām, ambulatorajām iestādēm.

Materiālu sagatavoja: SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģe Karīna Venediktova. 2024. – 2025. gada sezonas AAEI un gripas monitoringa 2025. gada 17. nedēļā datus sniedza: • 38 ģimenes ārsta prakses (reģistrēto pacientu skaits 67 738 jeb 6,6% no iedzīvotāju skaita monitoringa iekļautajās pilsētās; 3,6% no Latvijas iedzīvotāju skaita); • 10 stacionārās ārstniecības iestādes; • 29 vispārējās izglītības iestādes un 34 pirmsskolas izglītības iestādes. Izmantoti SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas dati un Valsts zinātniskais institūta "BIOR", Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Rīgas Tehniskās universitātes notekūdeņu monitoringa dati. Pateicamies visiem monitoringa dalībniekiem par sniegto informāciju. Datu pārpublicēšana un citēšana – atsauce uz Slimību profilakses un kontroles centra “Epidemioloģijas biļetenu” ir obligāta.
