


VAKcinācija pret cilvēka papilomas vīrusa (CPV) infekciju



Cilvēka papilomas vīruss (CPV) ir vīruss, kas inficē ādu un gļotādu.



CPV tiek pārnests tieša kontakta laikā caur ādu vai gļotādu, tai skaitā dzimumkontakta (gan vagināla, gan anāla, gan orāla) laikā.



8 no 10 seksuāli aktīviem cilvēkiem ir inficēti ar CPV.

Vakcinācija pret CPV infekciju var pasargāt pret vīrusa izraisītām

slimībām:

Kārpas un papilomas
Mutes un rīkles vēzis
Anālās atveres vēzis
Dzemes kakla vēzis
Maksts un vulvas vēzis
Dzimumlocekļa vēzis



VALSTS APMaksāta vakcinācija pieejama iedzīvotājiem, kuri iepriekš nav vakcinēti, prioritārā secībā atbilstoši vakcīnu pieejamībai:

1

**Meitenēm un zēniem
12-17 gadi**

Ar vismaz 6 mēnešu intervālu

1.deva

2.deva

Lai nodrošinātu iespējami labāko aizsardzību pret CPV infekciju, ir jāsaņem pilns vakcinācijas kurss!



2



Sievietes ar dzemes kakla adenokarcinomu in situ (AIS) un pirms vai pēc dzemes kakla vidējas/smagas pakāpes displāzijas (HSIL) ķirurģiskas ārstēšanas
18 - 55 gadi



Sievietēm ar priekšvēža izmaiņām - CIN 2/3 (dzemes kakls), VaIN 2/3 (maksts), VIN 2/3 (vulva) un AIN 2/3 (anālais kanāls)
18 - 45 gadi



Sievietēm un vīriešiem ar imūnsupresiju bez HIV infekcijas
18 - 45 gadi



Sievietēm un vīriešiem ar HIV infekciju
18 - 45 gadi

Ar vismaz 6 mēnešu intervālu

1.deva

2.deva



1.deva



2.deva

pēc 4 mēnešiem

3.deva

3

Sievietēm un vīriešiem 25 gadu vecumā

Ar vismaz 6 mēnešu intervālu

1.deva

2.deva

4

Sievietēm un vīriešiem 18 - 24 gadi (ieskaitot)

Ar vismaz 6 mēnešu intervālu

1.deva

2.deva

Pārējiem iedzīvotājiem tā ir pieejama kā maksas pakalpojums

VAKcinācijai pret CPV var pieteikties pie sava ģimenes ārsta!

VAkcīna ir pārbaudīta, droša un efektīva lietošanai



Vairāk info:

www.spkc.gov.lv/lv/cilveka-papilomas-viruss

