

Vakcinācijas shēma pret CPV infekciju


*prioritārām iedzīvotāju grupām, kuras nav
iepriekš vakcinētas pret CPV infekciju*



2 devas tiek rekomendētas:

- sievietēm (18 - 55 gadi) ar dzemdes kakla adenokarcinomu in situ (AIS) un pirms vai pēc dzemdes kakla vidējas/smagas pakāpes displāzijas (HSIL) ķirurģiskas ārstēšanas;
- sievietēm (18 - 45 gadi) ar priekšvēža izmaiņām - CIN 2/3 (dzemdes kakls), VaIN 2/3 (maksts), VIN 2/3 (vulva) un AIN 2/3 (anālais kanāls);
- sievietēm un vīriešiem 25 gadu vecumā;
- sievietēm un vīriešiem no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot).

2 devu shēma:



1.deva

vismaz 6 mēneši




2.deva

3 devas tiek rekomendētas:


- Sievietēm un vīriešiem (18 - 45 gadi) ar imūnsupresiju bez HIV infekcijas;
- Sievietēm un vīriešiem (18 - 45 gadi), kuriem ir HIV infekcija.

3 devu shēma:



1.deva

pēc 2 mēnešiem



2.deva

pēc 4 mēnešiem



3.deva

Valsts apmaksāts vakcinācijas kurss pret CPV infekciju tiek pabeigts (saņemot 2. un 3. poti) arī tad, ja vakcinējamās personas vecums pārsniedz vecumu, kurā tiek nodrošināta valsts apmaksāta vakcinācija.

Vairāk informācijas par CPV:
www.spkc.gov.lv/lv/cilveka-papilomas-viruss



Slimību profilakses un
kontroles centrs