



Slimību profilakses un kontroles centrs

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, fakss 67501591, e-pasts pasts@spkc.gov.lv

EPIDEMIOLOĢIJAS BIĻETENS

Nr. 38 (1957)

2025. gada 8. oktobrī

Gripa un citas akūtas elpceļu infekcijas 2025. – 2026. gada sezonā

Saturs

KOPSAVILKUMS PAR 2025. GADA 40. NEDĒĻU.....	1
GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS	2
STACIONĒTIE PACIENTI SARI GADĪJUMOS	3
VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒJUMS.....	3
GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI.....	3
MIKROBIOLOĢIJAS DATI	3
COVID-19 INFEKCIJAS DATI	3
PVO EIROPAS REĢIONA GRIPAS UZRAUDZĪBAS TĪKLA INFORMĀCIJA	5
PAR GRIPAS MONITORINGU.....	8

KOPSAVILKUMS PAR 2025. GADA 40. NEDĒĻU

2025. gada 40. nedēļā (29.09. – 05.10.) gripas monitoringā iesaistītajās ambulatorajās iestādēs (44 ģimenes ārsta prakses) pacientu īpatsvars ar akūtām elpceļu infekcijām veido 18% no kopējā pacientu skaita, kas vērsušies ambulatorajās iestādēs. Monitoringa dati liecina, ka aizvadītajā nedēļā akūtu elpceļu infekciju (turpmāk – AEI) izplatība ir nedaudz zemāka, salīdzinot ar iepriekšējā sezonā attiecīgajā laika periodā novēroto līmeni.

Gripa klīniski noteikta septiņiem pacientiem jeb vidēji saslimstība sastāda 9,9 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir mazāk nekā iepriekšējā sezonā šajā laika periodā (15,6 gad. uz 100 000 iedz.).

Ar citu AEI simptomiem nedēļas laikā kopā bija vērsušies 856 pacienti jeb vidēji 1 206,1 uz 100 000 iedzīvotājiem. Aizvadītajā nedēļā AEI aktivitāte ir nedaudz zemāka nekā iepriekšējās sezonas attiecīgajā laika periodā (1 435,6 uz 100 000 iedz.).

Pneimoniju gadījumā ambulatorajās iestādēs nedēļas laikā vērsušies 30 pacienti jeb vidēji 42,3 pneimonijas gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir vismaz divas reizes zemāks rādītājs nekā iepriekšējā sezonā šajā laika periodā (104,6 gad. uz 100 000 iedz.).

Monitoringā iekļautajās 10 stacionārajās ārstniecības iestādēs Rīgā un citos Latvijas reģionos 40. nedēļā stacionēto pacientu īpatsvars smagas akūtas respiratoras infekcijas (turpmāk – SARI) gadījumos ir 3,2% (iepriekšējā sezonā 40. nedēļā – 4,4%).

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS) Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorijā (turpmāk – NMRL) 40. nedēļā uz gripas vīrusiem un RSV izmeklēti 206 klīniskie paraugi, gripas vīrusi un RSV netika noteikti.

Vasaras beigās līdzīgi kā iepriekšējās sezonās gan Latvijā, gan citās PVO Eiropas reģiona valstīs novērots Covid-19 infekcijas saslimstības pacēlums. Laboratoriski apstiprināto Covid-19 vīrusa paraugu īpatsvars 40. nedēļā ir nedaudz palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējo 39. nedēļu (no 8,9% līdz 11,4%), tomēr augstākais rādītājs kopš saslimstības pacēluma sākuma tika novērots 37. nedēļā (18,9%).

GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS

2025. gada 40. nedēļā informācija par pacientu skaitu, kas vērsušies ambulatorajās ārstniecības iestādēs akūtu elpceļu infekciju gadījumos, saņemta no 44 ģimenes ārstu praksēm (turpmāk – ĢĀP). Pacientu īpatsvars ambulatorajās iestādēs 40. nedēļā ar elpceļu infekcijām veido 18% no kopējā iestādē vērsušos pacientu skaita (iepriekšējās sezonas 40. nedēļā – 29%).

Gripas intensitāte 2025.–2026. gadā un iepriekšējā sezonā

Līdzīgi kā aizvadītās monitoringa sezonas attiecīgajā laika periodā, Latvijā gripas aktivitāte ir ļoti zema. 2025. gada 40. nedēļā reģistrēti septiņi klīniski apstiprināti gripas gadījumi, tostarp divi no tiem ir savstarpēji saistīti gadījumi (ģimene) un trīs gadījumi ir apstiprināti ar ātro antigēna testu. Gripas izplatības intensitāte sastādīja 9,9 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir mazāk nekā iepriekšējā sezonā šajā pašā laika periodā (15,6 gad. uz 100 000 iedz.).

No visiem klīniski apstiprinātajiem gripas gadījumiem, seši (13,5 gad. uz 100 000 iedz.) reģistrēti vecuma grupā 15-64 gadi un viens (6,5 gad. uz 100 000 iedz.) vecuma grupā 65 un vairāk gadi. Iepriekšējās divās sezonās saslimstība ar gripu galvenokārt bija sastopama bērniem līdz 14 gadu vecumam.

2025. gada 40. nedēļā klīniski apstiprinātie gripas gadījumi reģistrēti trijās monitoringa teritorijās. Viens gadījums reģistrēts Jelgavā (32,6 gad. uz 100 000 iedz.), pieci Rīgā (17,3 gad. uz 100 000 iedz.) un viens Daugavpilī (9,2 gad. uz 100 000 iedz.).

	2024.-2025. (nedēļas)																		2025.-2026. (nedēļas)				
Teritorija	40.	42.	44.	46.	48.	50.	52.	02.	04.	06.	08.	10.	12.	14.	16.	18.	20.	40.	42.	44.	46.	48.	
Daugavpils																							
Gulbenes nov.																							
Jelgava																							
Jēkabpils nov.																							
Jūrmala																							
Liepāja																							
Rēzekne																							
Rīga																							
Valmieras nov.																							
Ventspils																							
Vidēji Latvija																							

	0 - gripas gadījumi netika reģistrēti		200 - 399 uz 100 000 iedz.	- vidēja
	< 100 uz 100 000 iedz.	- ļoti zema	400 - 599 uz 100 000 iedz.	- augsta
	100 - 199 uz 100 000 iedz.	- zema	> 600 uz 100 000 iedz.	- ļoti augsta

Citas akūtas elpceļu infekcijas (AEI) 2025.–2026. gadā un iepriekšējā sezonā

2025. gada 40. nedēļā vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs citu AEI gadījumos bija nedaudz zemāka, nekā 40. nedēļā iepriekšējā sezonā. Ar AEI simptomiem kopā bija vērsušies 856 pacienti jeb vidēji 1 206,1 uz 100 000 iedzīvotājiem (iepriekšējā sezonā – 1 435,6 gadījumi uz 100 000 iedz.). Augstākā saslimstība ar AEI, līdzīgi kā iepriekšējā sezonā, reģistrēta bērniem 0 – 4 gadu vecuma grupā (5 981,8 uz 100 000 iedz.).

Pneimonijas 2025.–2025. gadā un iepriekšējās sezonās

Ambulatorajās iestādēs 2025. gada 40. nedēļā vērsušies 30 pacienti ar pneimoniju jeb 42,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir mazāk nekā pērn (iepriekšējā sezonā – 104,6 gadījumi uz 100 000 iedz.). Augstākā saslimstība ar pneimonijām, līdzīgi kā iepriekšējā sezonā, reģistrēta bērniem 0 – 4 gadu vecuma grupā (162,5 gadījumi uz 100 000 iedz.).

STACIONĒTIE PACIENTI SMAGU AKŪTU RESPIRATORO INFEKCIJU (SARI) GADĪJUMOS

Stacionētie SARI pacienti 2025.–2026. gada sezonā

Par stacionētiem pacientiem SARI gadījumos un to testēšanu ziņo 10 stacionārās aprūpes iestādes, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS).

2025. gada 40. nedēļā uzraudzības iestādēs stacionēti 135 pacienti ar SARI. Stacionēto SARI pacientu īpatsvars no kopā stacionētajiem pacientiem sastādīja 3,2%, kas ir nedaudz zemāks rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējās sezonas 40. nedēļu (4,4%).

2025. gada 40. nedēļā, līdzīgi kā iepriekšējā sezonā, stacionēto pacientu bija visvairāk vecuma grupā 65 un vairāk gadi – 58 (43,0%) pacienti, bet stacionēti arī 44 (32,6%) pacienti vecuma grupā 15 – 64 gadi, 25 (18,5%) pacienti vecuma grupā 0 – 4 gadi un 8 (5,9%) pacienti vecuma grupā 5 – 14 gadi.

Stacionāros 40. nedēļā 186 pacienti tika testēti uz gripu, vienā (0,5%) gadījumā tika konstatēts pozitīvs rezultāts, 298 pacienti tika testēti uz SARS-CoV-2, no kuriem 23 (7,7%) paraugos bija pozitīvs rezultāts, tāpat arī 38 pacienti tika testēti uz respiratori sincitiālo vīrusu (RSV), RSV infekcija apstiprināta vienā (2,6%) gadījumā.

VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒJUMS

Vispārējās izglītības iestādes 2025. gada 40. nedēļā (ceturtdien) apmeklēja vidēji 93,1% skolēnu, kas ir par 3,1% vairāk nekā vidējais rādītājs atbilstošā laika periodā iepriekšējā sezonā (90,0%). Zemākais apmeklējums reģistrēts Rēzeknē (82,5%).

Pirmsskolas izglītības iestādes 2025. gada 40. nedēļā (ceturtdien) apmeklēja vidēji 70,7% bērnu, kas ir aptuveni tikpat cik iepriekšējā sezonā 40. nedēļā (70,1%). Zemākais apmeklējums reģistrēts Jēkabpils novadā (55,1%).

GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI

2025. gada 40. nedēļā nav saņemti paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripu vai ar aizdomām par gripas infekciju.

MIKROBIOLOĢIJAS DATI

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (RAKUS) Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorijā (NMRL) 2025. gada 40. nedēļā uz gripas vīrusiem un RSV izmeklēti 206 klīniskie paraugi, gripas vīrusi un RSV netika noteikti.

No citiem elpceļu vīrusiem NMRL 27 gadījumos konstatēti rinovīrusi (23), paragripa (3) un koronavīrusi (1).

Mycoplasma pneumoniae baktēriju noteikšanai izmeklēti 113 paraugi, no tiem 2 pozitīvi (1,8%). Iepriekšējā sezonā šajā laika periodā novēroti līdzīgi laboratoriskās uzraudzības dati.


COVID-19 INFEKCIJAS DATI

Latvijā datus par Covid-19 infekciju sniedz slimnīcas, laboratorijas un ģimenes ārstu prakses (Nacionālā veselības dienesta dati) un stacionārās ārstniecības iestādes, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS).


Vasaras beigās līdzīgi kā iepriekšējās sezonās gan Latvijā, gan citās PVO Eiropas reģiona valstīs novērots Covid-19 infekcijas saslimstības pacēlums. Kopš pacēluma sākuma augstākā

saslimstība reģistrēta 37. nedēļā, kad laboratoriski apstiprināto testu īpatsvars sasniedza 18,9%, pēc tam saslimstība samazinājās. 2025. gada 40. nedēļā laikā veikti 315 testi Covid-19 apstiprināšanai, no tiem 36 (11,4%) bija pozitīvi uz SARS-CoV-2 (39. nedēļā – 8,9%).

2025. gada 40. nedēļā slimnīcās uzņemti 36 jauni pacienti ar Covid-19 (iepriekšējā nedēļā – 42 pacienti). Kopā 40. nedēļā stacionāros ārstējušies 75 pacienti ar Covid-19 infekciju, no tiem ar pamata diagnozi Covid-19 bija 41 (54,7%) pacients.




2025. gada 40. nedēļā reģistrēti 10 nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju (39. nedēļā – pieci gadījumi).



Covid-19 notekūdeņu monitorings

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR monitoringa dati par SARS-COV-2 vīrusa RNS koncentrāciju notekūdeņos rāda, ka Latvijā kopumā tā stabilizējas pēc vairāku nedēļu pieauguma vasaras beigās. Monitorings teritoriju notekūdeņos galvenokārt dominē Omikron KP.3 atvasinājumu apakšlīnija.¹

¹ <https://bior.lv/lv/sars-cov-2-virusa-rns-kopiju-izplatiba-latvija>



PVO EIROPAS REĢIONA GRIPAS UZRAUDZĪBAS TĪKLA INFORMĀCIJA

European Respiratory Virus Surveillance Summary (ERVISS)

39. nedēļas ziņojums²

Kopsavilkums

PVO Eiropas reģiona valstīs gripas un RSV saslimstības rādītāji saglabājas starpsezonas līmenī. SARS-CoV-2 aktivitāte joprojām ir nevienmērīga dažādās reģiona valstīs. Reģionālā līmenī kopējais pozitīvo testu īpatsvars primārajā un sekundārajā aprūpē ir stabilizējies vai samazinās. Dominējošais SARS-CoV-2 variants reģiona valstīs joprojām ir XFG.

Elpceļu vīrusu aktivitāte

Paaugstināti gripai līdzīgu saslimšanu rādītāji novēroti vienā valstī (Turcijā) un akūtu elpceļu infekciju rādītāji ir paaugstināti četrās valstīs (Igaunijā, Lietuvā, Krievijas Federācijā un Spānijā).

Saslimstības rādītāji PVO Eiropas reģiona veselības aprūpes uzraudzības iestādēs:

- **Gripas** aktivitāte saglabājusies zem epidēmiskā sliekšņa (10%), pozitīvo testu īpatsvaram sastādot 3%, tāpat kā iepriekšējā nedēļā. Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 19 reģiona valstīs bija 0% (intervāls: 0%-6%);
- **SARS-CoV-2** pozitīvo testu īpatsvars samazinājies līdz 17% (iepriekšējā nedēļā – 21%). Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 18 reģiona valstīs bija 15% (intervāls: 0%-54%);
- **RSV** pozitīvo testu īpatsvars saglabājās 0%, tāpat kā iepriekšējā nedēļā. Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 17 reģiona valstīs bija 0% (intervāls: 0%-1%).

² <https://erviss.org/>

No pozitīvajiem un tipētajiem gripas vīrusu paraugiem (n=51), visi piederēja *A tipa* vīrusiem. No tiem, apakštips noteikts 31 paraugam: *A(H1)pdm09* (71%) un *A(H3)* (29%).

Saslimšanas smaguma rādītāji

Pēc slimnīcu (SARI) uzraudzības datiem:

- **Gripas** pozitīvo testu īpatsvars saglabājās nemainīgs – 2%. Mediānais pozitīvo testu īpatsvars deviņās valstīs bija 0% (intervāls: 0%-13%). No testētajiem SARI paraugiem noteikti 19 gripas vīrusi, visi *A tipa*, no kuriem apakštips noteikts sešiem – četri *A(H1)pdm09* un divi *A(H3)*;
- **SARS-CoV-2** pozitīvo testu īpatsvars samazinājies līdz 11% (iepriekšējā nedēļā – 13%). Mediānais pozitīvo testu īpatsvars deviņās valstīs bija 7% (intervāls: 0%-31%);
- **RSV** pozitīvo testu īpatsvars saglabājās 0%, tāpat kā iepriekšējā nedēļā. Mediānais pozitīvo testu īpatsvars astoņās valstīs bija 0% (intervāls: 0%-2%).

COVID-19 mirstība 41 valstī saglabājas zema. EuroMOMO³ apkopotie dati par 26 Eiropas valstīm liecina, ka kopējā mirstība visās vecuma grupās ir atbilstoša gaidītajam līmenim.

Vīrusu raksturojums

Gripa

- Kopš 2024. gada 40. nedēļas aktivitāti dominē *A(H1)pdm09* vīrusi.
- No 19 311 raksturoto gripas vīrusu:
 - *A(H1)pdm09* – 43%
 - *B/Victoria* līnija – 31%
 - *A(H3)* – 26%

SARS-CoV-2

- 2025. gada 37. – 38. nedēļas dati no septiņām valstīm rāda, ka dominējošie varianti ir:
 - XFG – 77%,
 - NB.1.8.1 – 11%,
 - BA.2.86 – 3%,
 - LP.8.1 – 2%.
- Saskaņā ar starptautiskās vīrusu genoma datubāzes “GISAID” datiem par 2025. gada septembri Eiropas reģionā visbiežāk sastopamie SARS-CoV-2 paveidi ir XFG (59%), XFG.3 (18%) un NB.1.8.1 (10%) (n=2 154).

Jāņem vērā, ka visi dati ir provizoriski un jaunāko nedēļu tendences var ietekmēt kavēta vai nepilnīga valstu datu ziņošana.

Pasaules Veselības organizācijas Globāla gripas uzraudzības tīkla 2025. gada 1. oktobra 546. ziņojums⁴

Globāli gripas aktivitāte saglabājās zema, dominējot *A tipa* gripas vīrusiem. Vīrusa cirkulācijas intensitāte un raksturs atšķīrās starp puslodēm un transmisijas zonām.

Dienvīdus puslodē gripas aktivitāte lielākajā daļā ziņojošo valstu bija zema un stabila, tomēr paaugstināts pozitīvo paraugu īpatsvars (>10%) tika novērots atsevišķās Austrumāfrikas un

³ <https://www.euromomo.eu/>

⁴ <https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-updates/current-influenza-update>

Dienvidaustumāzijas valstīs. Neliels aktivitātes pieaugums tika reģistrēts atsevišķās Austrumāfrikas un Okeānijas valstīs.

Ziemeļu puslodē pēdējo nedēļu laikā aktivitāte saglabājās zema un stabila lielākajā daļā transmisijas zonu. Paaugstināts gripas pozitīvo paraugu īpatsvars tika konstatēts Centrālamerikā un Karību reģionā, Rietumu un Vidusāfrikā, kā arī Rietum-, Dienvid- un Dienvidaustumāzijā, pārsniedzot 30% pozitīvo paraugu īpatsvaru atsevišķās valstīs. Neliels aktivitātes pieaugums novērots atsevišķās Centrālamerikas un Karību jūras reģiona, Vidusāfrikas, Ziemeļeiropas un Dienvidaustumāzijas valstīs.

Reģionos ar paaugstinātu pozitīvo paraugu īpatsvaru dominēja *A(H1N1)pdm09* vīrusi Centrālamerikā, Karību reģionā un Vidusāfrikā, bet *A(H3N2)* – Āzijā. Austrum- un Rietumāfrikā cirkulēja abi apakštipi līdzīgā proporcijā.

SARS-CoV-2

Globāli SARS-CoV-2 pozitīvo paraugu īpatsvars nedaudz pieauga, tomēr kopējā aktivitāte saglabājās zemā līmenī. Paaugstināts pozitīvo paraugu īpatsvars (>10%) tika novērots Centrālamerikā un Karību reģionā, tropu Dienvidamerikā, Eiropā, Rietum- un Austrumāzijā, pārsniedzot 30% atsevišķās valstīs. Neliels aktivitātes pieaugums tika ziņots vienā Ziemeļeiropas valstī.

RSV

RSV pozitīvo paraugu īpatsvars saglabājās paaugstināts dažās Centrālamerikas, Karību reģiona un tropu un mērenās joslas Dienvidamerikas valstīs. Lielākajā daļā ziņojošo valstu RSV aktivitāte palika stabila, ar nelielu pieaugumu divās Centrālamerikas un Karību reģiona valstīs.

PVO Konsultatīvās sanāksmes 2025. gada 28. februāra ziņojums par gripas vakcīnas sastāvu 2025.–2026. gada sezonai Ziemeļu puslodē⁵

2025. gada 28. februārī notikušajā PVO Konsultatīvā sanāksmē tika apstiprināts vakcīnu sastāvs 2025. – 2026. gada sezonai Ziemeļu puslodē.

PVO iesaka izmantot trīsvērtīgas vakcīnas 2025. – 2026. gada gripas sezonā:

Vakcīnās, kuru ražošana tiek izmantotas olas, jābūt šādiem komponentiem:

- *A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09* – līdzīgs vīruss;
- *A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)* – līdzīgs vīruss;
- *B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria līnija)* – līdzīgs vīruss

Vakcīnās, kas tiek ražotas izmantojot šūnas jeb rekombinantās vakcīnās jāiekļauj:

- *A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09* – līdzīgs vīruss;
- *A/District of Columbia/27/2023 (H3N2)* – līdzīgs vīruss;
- *B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria līnija)* – līdzīgs vīruss

PVO iesaka, izmantojot četrvērtīgas vakcīnas (šūnas jeb rekombinantās vakcīnās vai vakcīnas, kuru ražošanā tiek izmantotas olas) 2025. – 2026. gada gripas sezonā, kā *B/Yamagata* līnija komponentu iekļaut tālāk norādīto:

- *B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata līnija)* – līdzīgs vīruss.

⁵ <https://www.who.int/publications/m/item/recommended-composition-of-influenza-virus-vaccines-for-use-in-the-2025-2026-nh-influenza-season>

PAR GRIPAS MONITORINGU

2025. – 2026. gada sezonā monitoringā ir iesaistītas 44 ĢĀP desmit administratīvajās teritorijās – Liepāja, Ventspils (Kurzeme), Daugavpils, Rēzekne (Latgale), Jūrmala (Pierīga), Valmieras novads, Gulbenes novads (Vidzeme), Jēkabpils novads, Jelgava (Zemgale) un Rīga.

Kopējais reģistrēto pacientu skaits atlasītajās ĢĀP – 70 973 jeb 3,8% no Latvijas iedzīvotāju populācijas un 7,0% no monitoringa populācijas. ĢĀP katru nedēļu sniedz datus par pacientu skaitu, kas vērsušies pēc medicīniskās palīdzības ārsta praksē gripas, citu AEI un pneimoniju gadījumos, norādot pacientu skaitu pa vecuma grupām: 0-4, 5-14, 15-64 un 65 gadi un vairāk. Pēc ĢĀP sniegtās informācijas tiek aprēķināta gripas izplatības intensitāte pa teritorijām un pa vecuma grupām.

Lai novērtētu sezonālās gripas epidēmijas smagumu, katru sezonu monitoringā tiek iesaistītas slimnīcas visās administratīvajās teritorijās. Šajā sezonā ir iesaistītas 10 slimnīcas astoņās pilsētās: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA “Rēzeknes slimnīca”, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. Slimnīcas katru nedēļu, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS), ziņo par kopējo stacionēto pacientu skaitu pa vecuma grupām, kopējo un intensīvās terapijas nodaļā (ITN) stacionēto pacientu skaitu ar smagu akūtu respiratoru infekciju (turpmāk – SARI) pa vecuma grupām, SARI mirušo skaitu pa vecuma grupām un SARI pacientu skaitu, kas testēti uz gripu, Covid-19 un respiratori sincitiālo vīrusu (RSV), t.sk. pozitīvos gadījumus pa vecuma grupām.

Monitoringā tiek iekļautas vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes visās 10 administratīvajās teritorijās, kas katru nedēļu informē par iestāžu apmeklējumu ceturtdienā. 2025.-2026. gada sezonā tiks iesaistītas 30 skolas kurās mācās aptuveni 19 902 skolēni un 32 pirmsskolas izglītības iestādes, kuras apmeklē aptuveni 4 935 bērni.

Mikrobioloģijas dati par cirkulējošiem elpceļu vīrusiem un baktērijām tiek saņemti no NMRL. Pārskatā tiek iekļauta informācija par izmeklēto klīnisko paraugu skaitu, kas tiek izmeklēti NMRL ar polimerāzes ķēdes reakcijas (RL-PKĶR) un Mutlipleks metodi elpceļu vīrusu noteikšanai. NMRL paraugi tiek saņemti no Rīgas stacionārajām ārstniecības iestādēm, no reģionālajām slimnīcām, kā arī no citām, ambulatorajām iestādēm.

Materiālu sagatavoja: SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vecākā epidemioloģe Karīna Venediktova.

2025. – 2026. gada sezonas AEI un gripas monitoringa 2025. gada 40. nedēļā datus sniedza:

- 44 ģimenes ārsta prakses (reģistrēto pacientu skaits 70 973 jeb 7,0% no iedzīvotāju skaita monitoringa iekļautajās pilsētās; 3,8% no Latvijas iedzīvotāju skaita);
- 10 stacionārās ārstniecības iestādes;
- 30 vispārējās izglītības iestādes un 32 pirmsskolas izglītības iestādes.

Izmantoti SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas dati un Valsts zinātniskais institūta "BIOR", Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Rīgas Tehniskās universitātes notekūdeņu monitoringa dati.

Pateicamies visiem monitoringa dalībniekiem par sniegto informāciju.

Datu pārpublicēšana un citēšana – atsauce uz Slimību profilakses un kontroles centra “Epidemioloģijas biļetenu” ir obligāta.