



Slimību profilakses un kontroles centrs

Dunties iela 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, fakss 67501591, e-pasts pasts@spkc.gov.lv

EPIDEMIOLOĢIJAS BIĻETENS

Nr. 41 (1960)

2025. gada 22. oktobrī

Gripa un citas akūtas elpceļu infekcijas 2025. – 2026. gada sezonā

Saturs

KOPSAVILKUMS PAR 2025. GADA 42. NEDĒĻU.....	1
GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS	3
STACIONĒTIE PACIENTI SARI GADĪJUMOS	6
VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒTĪBA.....	8
GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI	9
MIKROBIOLOĢIJAS DATI	9
COVID-19 INFEKCIJAS DATI	10
PVO EIROPAS REĢIONA ELPCEĻU VĪRUSU UZRAUDZĪBA	12
PAR GRIPAS UN CITU ELPCEĻU INFEKCIJU MONITORINGU.....	15

KOPSAVILKUMS PAR 2025. GADA 42. NEDĒĻU

2025. gada 42. nedēļā (13.10. – 19.10.) gripas monitoringā iesaistītajās ambulatorajās iestādēs pacientu īpatsvars ar elpceļu infekcijām veido 18% no kopējā pacientu skaita, kas vērsušies pie ģimenes ārsta. Monitoringa dati liecina, ka aizvadītajā nedēļā gripas un citu akūtu elpceļu infekciju (turpmāk – AEI) aktivitāte bija zema.

Gripa klīniski noteikta trijiem pacientiem jeb vidēji saslimstība sastāda 4,3 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir iepriekšējās nedēļas līmenī (4,2 uz 100 000 iedz.).

Ar citu AEI simptomiem nedēļas laikā kopā bija vērsies 891 pacients jeb vidēji 1 283,2 uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir par 6,1% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā (1 366,7 uz 100 000 iedz.).

Pneimoniju gadījumā ambulatorajās iestādēs nedēļas laikā vērsušies 32 pacienti jeb vidēji 46,1 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir par 3,8% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā (47,9 uz 100 000 iedz.).

Monitoringā iekļautajās 10 stacionārajās ārstniecības iestādēs Rīgā un citos Latvijas reģionos 42. nedēļā stacionēto pacientu īpatsvars smagas akūtas respiratoras infekcijas (turpmāk – SARI) gadījumos bija 4,0% (41. nedēļā – 3,4%). No slimnīcās testētajiem SARI pacientiem, vienā (0,5%) gadījumā tika apstiprināta *A tipa* gripa.

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā 42. nedēļā uz gripas vīrusiem un respiratori sincitiālo vīrusu (turpmāk – RSV) izmeklēti 243 klīniskie paraugi. Apstiprināti četri (1,6%) *A tipa* gripas vīrusi, visi piederēja *A/H1pdm* apakštipam. RSV netika noteikti.

Vasaras beigās līdzīgi kā iepriekšējās sezonās Latvijā, tāpat kā citās PVO Eiropas reģiona valstīs tika novērots Covid-19 infekcijas saslimstības pacēlums. Laboratoriski apstiprināto Covid-19 vīrusa paraugu īpatsvars 42. nedēļā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, ir palielinājies no 8,3% līdz 11,2%. Augstākais rādītājs kopš saslimstības pacēluma sākuma tika novērots 37. nedēļā (18,9%).

Galvenie akūtu augšējo elpceļu infekciju monitoringa rādītāji pēdējo trīs nedēļu laikā

*Ambulatorās veselības aprūpes iestāžu monitoringa rādītāji**

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	40.	41.	42.
Pacientu ar elpceļu infekciju simptomiem īpatsvars no kopējā ambulatoro apmeklējumu skaita	18%	20%	18%
AEI gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	1 206,1	1 366,7	1 283,2
Gripas gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	9,9	4,2	4,3
Pneimoniju gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	42,3	47,9	46,1

*Monitoringā iekļautās ambulatorās ārstniecības iestādes (44 ģimenes ārstu prakses)

Stacionāro ārstniecības iestāžu monitoringa rādītāji

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	40.	41.	42.
SARI stacionēto pacientu skaits*	135	143	174
SARI īpatsvars no kopējā uzņemto pacientu skaita*	3,2%	3,4%	4,0%
Covid-19 stacionēto pacientu skaits**	36	36	34
Nāves gadījumu skaits Covid-19 pacientiem**	10	5	2
Nāves gadījumu skaits gripas pacientiem***	0	0	0

*Monitoringā iekļauto 10 stacionāro ārstniecības iestāžu dati

**Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmas (SAIRIS) dati (24 slimnīcas)

***Saņemto paziņojumu skaits (MK noteikumu Nr. 948 2. pielikums)

Laboratoriju monitoringa rādītāji

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	40.	41.	42.
Gripas pozitīvo paraugu īpatsvars*	0,0%	0,0%	1,6%
RSV pozitīvo paraugu īpatsvars*	0,0%	0,0%	0,0%
SARS-CoV-2 pozitīvo paraugu īpatsvars**	11,4%	8,3%	11,2%

*SIA RAKUS NMRL dati

**Nacionālā veselības dienesta datu centralizētās sistēmas (DCS) dati

*Izglītības iestāžu monitoringa rādītāji**

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	40.	41.	42.
Vidējais vispārējās izglītības iestāžu apmeklējuma īpatsvars	93,1%	91,9%	90,0%
Vidējais pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējuma īpatsvars	70,7%	70,6%	71,9%


*Monitoringā iesaistīto izglītības iestāžu dati

GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS

2025. gada 42. nedēļā informācija par pacientu skaitu, kas vērsušies ambulatorajās ārstniecības iestādēs akūtu elpceļu infekciju gadījumos, saņemta no 43 ģimenes ārstu praksēm (turpmāk – ĢĀP). Pacientu īpatsvars ambulatorajās iestādēs ar elpceļu infekcijām veido 18% no kopējā iestādē vērsušos pacientu skaita (iepriekšējā nedēļā – 20%).

Gripas intensitāte 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās

Kopš monitoringa sezonas sākuma (2025. gada 40. nedēļa) Latvijā novērota zema gripas izplatības intensitāte. Aizvadītajā nedēļā gripa klīniski noteikta trijiem pacientiem jeb vidēji saslimstība sastāda 4,3 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir iepriekšējās nedēļas līmenī (4,2 uz 100 000 iedz.). Viens no trijiem gripas gadījumiem ir apstiprināts ar ātro antigēna testu. Kopš sezonas sākuma ĢĀP kopā reģistrēti 13 klīniski noteikti gripas gadījumi.



Gripas intensitāte atsevišķās vecuma grupās

2025. gada 42. nedēļā klīniski apstiprinātie divi gripas gadījumi reģistrēti vecuma grupā 15–64 gadi (4,6 gad. uz 100 000 iedz.) un viens reģistrēts vecuma grupā 5–14 gadi (12,8 gad uz 100 000 iedz.). Iepriekšējās divās sezonās augstāka saslimstība ar gripu bija novērota bērniem līdz 14 gadu vecumam.

Gripas intensitāte administratīvajās teritorijās 2024.–2025. un 2025.–2026. gada sezonā


2025. gada 42. nedēļā klīniski apstiprināti gripas gadījumi reģistrēti trijās monitoringa teritorijās: viens gadījums Jūrmalā (27,6 uz 100 000 iedz.), viens Daugavpilī (9,2 uz 100 000 iedz.) un viens Rīgā (3,5 uz 100 000 iedz.).

	2024.-2025. (nedēļas)																		2025.-2026. (nedēļas)			
Teritorija	40.	42.	44.	46.	48.	50.	52.	02.	04.	06.	08.	10.	12.	14.	16.	18.	20.	40.	42.	44.	46.	
Liepāja																						
Ventspils																						
Daugavpils																						
Rēzekne																						
Jūrmala																						
Valmieras nov.																						
Gulbenes nov.																						
Jēkabpils nov.																						
Jelgava																						
Rīga																						
Vidēji Latvijā																						



Akūtas elpceļu infekcijas 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās

2025. gada 42. nedēļā vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs AEI gadījumos (1 283,2 uz 100 000 iedz.) samazinājās par 6,1%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Kopumā saslimstība ar AEI šajā sezonā ir līdzīga iepriekšējo piecu sezonu vidējiem rādītājiem.




Akūtu elpceļu infekciju intensitāte atsevišķās vecuma grupās

Augstākā saslimstība ar AEI tiek reģistrēta bērniem 0 – 4 gadu vecuma grupā (7 440,8 uz 100 000 iedz.). 2025. gada 42. nedēļā saslimstība ar AEI šajā vecuma grupā palielinājās, bet pārējās nedaudz samazinājās.

Pneimonijas 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās

Ambulatorajās iestādēs 2025. gada 42. nedēļā reģistrēti 32 pneimoniju gadījumi jeb 46,1 gadījums uz 100 000 iedzīvotājiem. Pērn šajā laika periodā saslimstība ar pneimonijām bija vismaz 1,5 reizes augstāka.



Pneimoniju intensitāte atsevišķās vecuma grupās


2025. gada 42. nedēļā augstākā saslimstība ar pneimonijām, tāpat kā iepriekšējās sezonās, tiek reģistrēta vecuma grupā 5–14 gadi (76,8 uz 100 000 iedz.) un 0–4 gadi (66,7 uz 100 000 iedz.). Aizvadītajā nedēļā vislielākais saslimstības pieaugums, salīdzinot ar 41. nedēļu, novērojams vecuma grupā 65 un vairāk gadi – attiecīgi no 19,5 līdz 46,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem.

STACIONĒTIE PACIENTI SMAGU AKŪTU RESPIRATORO INFEKCIJU (SARI) GADĪJUMOS

Stacionētie SARI pacienti 2025.–2026. gada sezonā


Par stacionētiem pacientiem SARI gadījumos un to testēšanu ziņo 10 stacionārās aprūpes iestādes, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS).

2025. gada 42. nedēļā uzraudzības iestādēs stacionēti 174 SARI pacienti. Stacionēto SARI pacientu īpatsvars no kopā stacionētajiem pacientiem sastādīja 4,0% (42. nedēļā – 3,4%). No 174 pacientiem desmit (5,7%) tika ievietoti intensīvās terapijas nodaļās (ITN).




Stacionēti SARI pacienti pa vecuma grupām

2025. gada 42. nedēļā, salīdzinot ar 41. nedēļu, stacionēto SARI pacientu vidū palielinājies pacientu skaits senioru vidū – hospitalizēti 90 pacienti 65+ vecuma grupā, kas veido 51,7% no stacionētajiem SARI pacientiem šajā nedēļā.




Stacionēto pacientu testēšana uz gripu, Covid-19 un RSV


2025. gada 42. nedēļā stacionārās veselības aprūpes iestādēs uz gripu laboratoriski izmeklēti 210 pacienti, vienā (0,5%) gadījumā apstiprināts *A* tipa gripas vīruss. Iepriekšējā 41. nedēļā gripa apstiprināta četriem (1,9%) stacionāros testētiem pacientiem.



Covid-19 infekcijas pozitīvo paraugu īpatsvars 42. nedēļā, salīdzinot ar 41. nedēļu, samazinājās. Uz SARS-CoV-2 testēti 304 pacienti, no tiem sešiem (2,0%) pacientiem apstiprināta Covid-19 infekcija (iepriekšējā nedēļā – 11 pacientiem (3,3%)).



Respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) pozitīvo paraugu īpatsvars samazinājies, salīdzinot ar 41. nedēļu. Aizvadītajā nedēļā 48 pacienti tika testēti uz RSV, infekcija apstiprināta divos (4,2%) gadījumos (iepriekšējā nedēļā – četros gadījumos (4,2%)).



VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒTĪBA

Vispārējās izglītības iestādēs 2025. gada 42. nedēļā (ceturtdien) vidējā apmeklētība bija 90,0%, kas par 1,9% mazāk nekā 41. nedēļā. Zemākā apmeklētība 42. nedēļā reģistrēta Rīgā (84,2%).

Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto skolēnu skaita (%)										
	Daugavpils	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils novads	Jūrmala	Liepāja	Rēzekne	Rīga	Valmieras novads	Ventspils	Vidēji
40.	93,3	95,4	99,0	97,6	91,9	94,8	82,5	91,7	97,8	92,9	93,1
41.	93,6	92,3	96,9	92,7	92,3	93,3	91,6	89,2	96,7	92,6	91,9
42.	94,3	93,1	93,2	93,3	90,5	93,5	92,8	84,2	94,2	92,3	90,0
Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu (±)	0,7	0,7	-3,7	0,7	-1,7	0,2	1,2	-5,0	-2,6	-0,3	-1,9

Pirmsskolas izglītības iestādes 2025. gada 42. nedēļā (ceturtdien) vidēji apmeklēja aptuveni nedaudz vairāk bērnu kā iepriekšējā nedēļā – 71,9%. Zemākā apmeklētība reģistrēta Jūrmalā (68,0%).

Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto bērnu skaita (%)										
	Daugavpils	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils novads	Jūrmala	Liepāja	Rēzekne	Rīga	Valmieras novads	Ventspils	Vidēji
40.	68,7	73,0	76,5	55,1	70,5	62,7	69,7	75,3	67,1	69,2	70,7
41.	73,2	66,1	72,1	59,2	72,8	61,7	71,1	71,7	69,5	71,1	70,6
42.	69,6	72,2	74,3	68,4	68,0	81,0	75,0	73,5	68,1	70,2	71,9
Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu (±)	-3,6	6,1	2,2	9,2	-4,8	19,3	3,9	1,8	-1,4	-0,9	1,3

GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI

Kopš sezonas sākuma (2025. gada 40. nedēļa) paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripu vai ar aizdomām par gripas infekciju nav saņemti.

MIKROBIOLOĢIJAS DATI

Gripas A tipa un B tipa vīrusu un RSV noteikšana klīniskajos paraugos

2025. gada 42. nedēļā uz gripas vīrusiem un RSV izmeklēti 243 klīniskie paraugi. Apstiprināti četri A tipa gripas vīrusi, visi piederēja A/H1pdm apakštipam. RSV netika noteikti.

Monitoringa nedēļa	Izmeklēto paraugu skaits	Gripas vīrusi			Respiratori sincitiālais vīruss (RSV)	
		t.sk. pozitīvi		Pozitīvo paraugu īpatsvars	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars
		A gripa	B gripa			
40.	206	0	0	0,0%	0	0,0%
41.	250	0	0	0,0%	0	0,0%
42.	243	4	0	1,6%	0	0,0%
Kopā	699	4	0	0,6%	0	0,0%

Citu elpceļu infekciju vīrusu noteikšana

2025. gada 42. nedēļā citi elpceļu vīrusi NMRL apstiprināti 38 gadījumos, to skaitā 28 gadījumos konstatēti rinovīrusi. Laboratoriski apstiprināta arī paragripa un koronavīruss.

Monitoringa nedēļa	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi							Pozitīvie paraugi kopā	
		Paragripa	Adenovīrusi	Bokavīrusi	hMPV	Enterovīrusi	Koronavīrusi	Rinovīrusi	Skaits	Īpatsvars
40.	115	3	0	0	0	0	1	23	27	23,5%
41.	144	2	1	1	0	0	0	35	39	27,1%
42.	155	9	0	0	0	0	1	28	38	24,5%
Kopā	414	14	1	1	0	0	2	86	104	25,1%

Bakteriālo patogēnu noteikšana

Šajā sezonā izmeklēti 412 paraugi *Mycoplasma pneumoniae* baktēriju noteikšanai, pozitīvo paraugu īpatsvars veido vidēji 1,9%, kas ir ievērojami mazāk nekā iepriekšējā sezonā šajā laika periodā (2024. gada 40. – 42. nedēļā *Mycoplasma pneumoniae* apstiprināta 79 no 287 testētajiem paraugiem jeb 17,5%).

Monitoringa nedēļa	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>			Izmeklēto paraugu skaits	<i>Streptococcus pneumoniae</i>		<i>Haemophilus influenzae</i>		<i>Chlamydia pneumoniae</i>		Kopējais pozitīvo paraugu skaits
	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)		t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)	
40.	113	2	1,8	23	8	34,8	7	30,4	0	0,0	17
41.	153	2	1,3	38	12	31,6	8	21,1	0	0,0	22
42.	146	4	2,7	31	16	51,6	7	22,6	0	0,0	27
Kopā	412	8	1,9	92	36	39,1	22	23,9	0	0,0	66


COVID-19 INFEKCIJAS DATI

Latvijā datus par Covid-19 infekciju sniedz slimnīcas, laboratorijas un ģimenes ārstu prakses (Nacionālā veselības dienesta dati) un stacionārās ārstniecības iestādes, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS).

Pozitīvo testu īpatsvars un stacionēto pacientu skaits Covid-19 infekcijas gadījumos


Vasaras beigās tāpat kā iepriekšējās sezonās Latvijā un citās PVO Eiropas reģiona valstīs tika novērots Covid-19 infekcijas saslimstības pacēlums. Latvijā augstākā saslimstība reģistrēta 37. nedēļā, kad laboratoriski apstiprināto testu īpatsvars sasniedza 18,9%, pēc tam saslimstība samazinājās. 2025. gada 42. nedēļā veikti 374 testi Covid-19 apstiprināšanai, no tiem 42 (11,2%) bija pozitīvi uz SARS-CoV-2 (41. nedēļā – 35 pozitīvi (8,3%)).

2025. gada 42. nedēļā slimnīcās uzņemti 34 Covid-19 infekcijas pacienti (iepriekšējā nedēļā – 36 pacienti). Kopā 42. nedēļā stacionāros ārstējušies 68 pacienti, kuriem apstiprināta Covid-19 infekcija, no tiem ar pamata diagnozi Covid-19 bija 27 (39,7%) pacienti.




Mirušo Covid-19 pacientu skaits

2025. gada 42. nedēļā reģistrēti divi nāves gadījumi pacientiem, kuriem laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija (41. nedēļā – 5 gadījumi).



Covid-19 notekūdeņu monitorings

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR monitoringa dati par SARS-COV-2 vīrusa RNS koncentrāciju notekūdeņos rāda, ka Latvijā kopumā tā stabilizējas pēc vairāku nedēļu pieauguma vasaras beigās. Monitoringa teritoriju notekūdeņos galvenokārt dominē Omikron KP.3 atvasinājumu apakšlīnija.¹



¹ <https://bior.lv/lv/sars-cov-2-virusa-rns-kopiju-izplatiba-latvija>

PVO EIROPAS REĢIONA ELPCEĻU VĪRUSU UZRAUDZĪBA

European Respiratory Virus Surveillance Summary (ERVISS)

41. nedēļas ziņojums²

Kopsavilkums

PVO Eiropas reģiona valstīs gripas aktivitāte joprojām ir zema, taču dažas valstis ir ziņojušas par SARI rādītāju palielināšanos vai ar gripu saistīto hospitalizāciju skaita pieaugumu. SARS-CoV-2 aktivitāte joprojām ir nevienmērīga dažādās reģiona valstīs. Reģionālā līmenī kopējais pozitīvo testu īpatsvars primārajā un sekundārajā aprūpē ir stabilizējies vai samazinās. Dominējošais SARS-CoV-2 variants reģiona valstīs joprojām ir XFG. RSV aktivitātes rādītāji visā reģionā saglabājas starpsezona līmenī.

Elpceļu vīrusu aktivitāte

Paaugstināti gripai līdzīgu saslimšanu rādītāji novēroti trijās valstīs (Azerbaidžānā, Dānijā un Maltā) un akūtu elpceļu infekciju rādītāji ir paaugstināti četrās valstīs (Vācijā, Lietuvā, Spānijā un Ukrainā).

Saslimstības rādītāji PVO Eiropas reģiona veselības aprūpes uzraudzības iestādēs:

- **Gripas** aktivitāte saglabājas zem epidēmiskā sliekšņa (10%), pozitīvo testu īpatsvaram sastādot 3% (iepriekšējā nedēļā – 4%). Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 23 reģiona valstīs bija 0% (intervāls: 0%-12%) un divas teritorijas ziņoja par pārsniegtu epidēmisko sliekšni: Apvienotā Karaliste – Ziemeļīrija (12%) un Apvienotā Karaliste – Skotija (10%);
- **SARS-CoV-2** pozitīvo testu īpatsvars saglabājies iepriekšējās nedēļas līmenī – 13%. Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 25 reģiona valstīs bija 14% (intervāls: 0%-27%);
- **RSV** pozitīvo testu īpatsvars saglabājas 0%, tāpat kā iepriekšējā nedēļā. Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 22 reģiona valstīs bija 0% (intervāls: 0%-7%).

No pozitīvajiem un tipētajiem gripas vīrusu paraugiem (n=81), galvenokārt noteikti *A tipa* vīrusi (96%). No tiem apakštīps noteikts 40: *A(H1)pdm09* (65%) un *A(H3)* (35%).

Saslimšanas smaguma rādītāji

Pēc slimnīcu (SARI) uzraudzības datiem:

- **Gripas** pozitīvo testu īpatsvars saglabājas aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī – 4%. Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 13 valstīs bija 1% (intervāls: 0%-26%). No testētajiem SARI paraugiem noteikti 46 gripas vīrusi, galvenokārt *A tipa* (97%), no kuriem apakštīps noteikts 11 paraugiem – septiņi *A(H1)pdm09* un četri *A(H3)* vīrusi;
- **SARS-CoV-2** pozitīvo testu īpatsvars saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī – 9%. Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 11 valstīs bija 6% (intervāls: 2%-24%);
- **RSV** pozitīvo testu īpatsvars saglabājās 1%, tāpat kā iepriekšējā nedēļā. Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 14 valstīs bija 0% (intervāls: 0%-7%).

Ar COVID-19 saistīta mirstība 41 valstī saglabājas zema. EuroMOMO³ apkopotie dati par 23 Eiropas valstīm liecina, ka visu cēloņu mirstība visās vecuma grupās ir atbilstoša gaidītajam līmenim.

² <https://erviss.org/>

³ <https://www.euromomo.eu/>

Vīrusu raksturojums

Gripa

- Pēdējo četru nedēļu laikā dati par gripas vīrusu raksturojumu uzraudzības iestādēs nav ziņoti.

SARS-CoV-2

- 2025. gada 39. – 40. nedēļas dati no astoņām valstīm rāda, ka dominējošie varianti ir:
 - XFG – 67% (22%–85% no astoņām valstīm un apgabaliem),
 - BA.2.86 – 12% (0%–27% no sešām valstīm un reģioniem),
 - NB.1.8.1 – 9% (0%–78% no septiņām valstīm un reģioniem).
- Saskaņā ar starptautiskās vīrusu genoma datubāzes “GISAID” datiem par 2025. gada oktobri Eiropas reģionā visbiežāk sastopamie SARS-CoV-2 paveidi ir XFG (57%), XFG.3 (15%), XFG.3.4 (5%); XFG.3.4.1 (5%); un XFC (5%) (n=175).

Jāņem vērā, ka visi dati ir provizoriski un jaunāko nedēļu tendences var ietekmēt kavēta vai nepilnīga valstu datu ziņošana.

Pasaules Veselības organizācijas Globāla gripas uzraudzības tīkla 2025. gada 15. oktobra 548. ziņojums⁴

Pasaules mērogā gripas aktivitāte saglabājās zema, dominējot *A tipa* gripas vīrusiem. Vīrusa cirkulācijas intensitāte un raksturs atšķīrās starp puslodēm un transmisijas zonām.

Ziemeļu puslodē pēdējo nedēļu laikā aktivitāte saglabājās zema un stabila lielākajā daļā gripas izplatības teritorijās. Paaugstināts gripas pozitīvo paraugu īpatsvars tika konstatēts Centrālamerikā un Karību jūras reģionā, Rietumu, Ziemeļu, Austrumu un Vidusāfrikā, kā arī Rietumu, Dienvidu un Dienvidaustrumu Āzijā, pārsniedzot 30% pozitīvo paraugu īpatsvaru Dienvidaustrumāzijas un Rietumāfrikas valstīs. Aktivitātes pieaugums novērots atsevišķās Centrālamerikas un Karību jūras reģiona, Rietumu un Austumāfrikas, Rietumu un Dienvidaustrumu Āzijas valstīs.

Dienvidu puslodē gripas aktivitāte lielākajā daļā ziņojošo valstu saglabājās zema un stabila. Paaugstināts pozitīvo paraugu īpatsvars (>10%) tika novērots atsevišķās valstīs mērenajā Dienvidamerikā un Austrumāfrikā, bet atsevišķās valstīs Dienvidaustrumāzijā un Okeānijā pozitīvo paraugu īpatsvars pārsniedza 30%. Aktivitātes pieaugums tika novērots vienā valstī Dienvidaustrumāzijā.

Reģionos ar paaugstinātu pozitīvo paraugu īpatsvaru, *A(H1N1)pdm09* gripas vīrusi dominēja Centrālamerikā, Karību jūras reģionā, Austrumāfrikā un Vidusāfrikā, savukārt *A(H3N2)* gripas vīrusi dominēja mērenajā Dienvidamerikā, Rietumu, Dienvidu un Dienvidaustrumu Āzijā un Okeānijā. Rietumāfrikā cirkulēja abi apakštipi līdzīgā proporcijā.

SARS-CoV-2

Globāli SARS-CoV-2 pozitīvo paraugu īpatsvars pieauga, tomēr kopējā aktivitāte saglabājās zemā līmenī. Paaugstināts pozitīvo paraugu īpatsvars (>10%) tika novērots Ziemeļamerikā, Centrālamerikā un Karību jūras reģionā, tropu Dienvidamerikā, Eiropā, Rietumu

⁴ <https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-updates/current-influenza-update>

un Austrumu Āzijā, pārsniedzot 30% atsevišķās valstīs. Neliels aktivitātes pieaugums tika ziņots divās Dienvidrietumeiropas valstīs un vienā tropu Dienvidamerikas valstī.

RSV

RSV pozitīvo paraugu īpatsvars saglabājās paaugstināts dažās Centrālamerikas, Karību jūras reģiona un tropu un mērenās joslas Dienvidamerikas un Rietumāfrikas un Dienvidāzijas valstīs, pārsniedzot 30% atsevišķās valstīs. Lielākajā daļā ziņojošo valstu RSV aktivitāte saglabājās stabila, ar nelielu pieaugumu dažās Centrālamerikas un Karību jūras reģiona valstīs.

PVO Konsultatīvās sanāksmes 2025. gada 28. februāra ziņojums par gripas vakcīnas sastāvu 2025.–2026. gada sezonai Ziemeļu puslodē⁵

2025. gada 28. februārī notikušajā PVO Konsultatīvā sanāksmē tika apstiprināts vakcīnu sastāvs 2025. – 2026. gada sezonai Ziemeļu puslodē.

PVO iesaka izmantot trīsvērtīgas vakcīnas 2025. – 2026. gada gripas sezonā:

Vakcīnās, kuru ražošanā tiek izmantotas olas, jābūt šādiem komponentiem:

- *A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09* – līdzīgs vīruss;
- *A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)* – līdzīgs vīruss;
- *B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria līnija)* – līdzīgs vīruss

Vakcīnās, kas tiek ražotas, izmantojot šūnas, jeb rekombinantās vakcīnās, jāiekļauj:

- *A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09* – līdzīgs vīruss;
- *A/District of Columbia/27/2023 (H3N2)* – līdzīgs vīruss;
- *B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria līnija)* – līdzīgs vīruss

PVO iesaka, izmantojot četrvērtīgas vakcīnas (šūnas jeb rekombinantās vakcīnās vai vakcīnas, kuru ražošanā tiek izmantotas olas) 2025. – 2026. gada gripas sezonā, kā *B/Yamagata* līnija komponentu iekļaut:

- *B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata līnija)* – līdzīgs vīruss.

⁵ <https://www.who.int/publications/m/item/recommended-composition-of-influenza-virus-vaccines-for-use-in-the-2025-2026-nh-influenza-season>

PAR GRIPAS UN CITU ELPCEĻU INFEKCIJU MONITORINGU

2025. – 2026. gada sezonā monitoringā ir iesaistītas 44 ĢĀP desmit administratīvajās teritorijās – Liepāja, Ventspils (Kurzeme), Daugavpils, Rēzekne (Latgale), Jūrmala (Pierīga), Valmieras novads, Gulbenes novads (Vidzeme), Jēkabpils novads, Jelgava (Zemgale) un Rīga.

Kopējais reģistrēto pacientu skaits atlasītajās ĢĀP – 70 973 jeb 3,8% no Latvijas iedzīvotāju populācijas un 7,0% no monitoringa populācijas. ĢĀP katru nedēļu sniedz datus par pacientu skaitu, kas vērsušies pēc medicīniskās palīdzības ārsta praksē gripas, citu AEI un pneimoniju gadījumos, norādot pacientu skaitu pa vecuma grupām: 0-4, 5-14, 15-64 un 65 gadi un vairāk. Pēc ĢĀP sniegtās informācijas tiek aprēķināta gripas izplatības intensitāte pa teritorijām un pa vecuma grupām.

Lai novērtētu sezonālās gripas epidēmijas smagumu, katru sezonu monitoringā tiek iesaistītas slimnīcas visās administratīvajās teritorijās. Šajā sezonā ir iesaistītas 10 slimnīcas astoņās pilsētās: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA “Rēzeknes slimnīca”, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. Slimnīcas katru nedēļu, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS), ziņo par kopējo stacionēto pacientu skaitu pa vecuma grupām, kopējo un intensīvās terapijas nodaļā (ITN) stacionēto pacientu skaitu ar smagu akūtu respiratoru infekciju (turpmāk – SARI) pa vecuma grupām, SARI mirušo skaitu pa vecuma grupām un SARI pacientu skaitu, kas testēti uz gripu, Covid-19 un respiratori sincitiālo vīrusu (RSV), t.sk. pozitīvos gadījumus pa vecuma grupām.

Monitoringā tiek iekļautas vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes visās 10 administratīvajās teritorijās, kas katru nedēļu informē par iestāžu apmeklētību ceturtdien. 2025.-2026. gada sezonā tiks iesaistītas 30 skolas, kurās mācās 19 902 skolēni un 32 pirmsskolas izglītības iestādes, kuras apmeklē 4 935 bērni.

Mikrobioloģijas dati par cirkulējošiem elpceļu vīrusiem un baktērijām tiek saņemti no NMRL. Pārskatā tiek iekļauta informācija par izmeklēto klīnisko paraugu skaitu, kas tiek izmeklēti NMRL ar polimerāzes ķēdes reakcijas (RL-PKĶR) un Mutlplex metodi elpceļu vīrusu noteikšanai. NMRL paraugi tiek saņemti no Rīgas stacionārajām ārstniecības iestādēm, no reģionālajām slimnīcām, kā arī no citām, t.sk. ambulatorajām iestādēm.

Materiālu sagatavoja: SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vecākā epidemioloģe Karīna Venediktova.

2025. – 2026. gada sezonas AEI un gripas monitoringa 2025. gada 42. nedēļā datus sniedza:

- 43 ģimenes ārstu prakses (reģistrēto pacientu skaits 69 434 jeb 6,9% no iedzīvotāju skaita monitoringa iekļautajās pilsētās; 3,7% no Latvijas iedzīvotāju skaita);
 - 10 stacionārās ārstniecības iestādes;
 - 30 vispārējās izglītības iestādes un 32 pirmsskolas izglītības iestādes.
- Izmantoti SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas dati un Valsts zinātniskais institūts "BIOR", Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Rīgas Tehniskās universitātes notekūdeņu monitoringa dati.

Pateicamies visiem monitoringa dalībniekiem par sniegto informāciju.

Datu pārpublicēšana un citēšana – atsauce uz Slimību profilakses un kontroles centra “Epidemioloģijas biļetenu” ir obligāta.