



Slimību profilakses un kontroles centrs

Dunties iela 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, fakss 67501591, e-pasts pasts@spkc.gov.lv

EPIDEMIOLOĢIJAS BIĻETENS

Nr. 43 (1962)

2025. gada 5. novembrī

Gripa un citas akūtas elpceļu infekcijas 2025. – 2026. gada sezonā

Saturs

KOPSAVILKUMS PAR 2025. GADA 44. NEDĒĻU.....	1
GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS	3
STACIONĒTIE PACIENTI SARI GADĪJUMOS	6
VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒTĪBA.....	8
GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI	9
MIKROBIOLOĢIJAS DATI	9
COVID-19 INFEKCIJAS DATI	10
PVO EIROPAS REĢIONA ELPCEĻU VĪRUSU UZRAUDZĪBA	12
PAR GRIPAS UN CITU ELPCEĻU INFEKCIJU MONITORINGU.....	16

KOPSAVILKUMS PAR 2025. GADA 44. NEDĒĻU

2025. gada 44. nedēļā (27.10. – 02.11.) gripas monitoringā iesaistītajās ambulatorajās iestādēs pacientu īpatsvars ar elpceļu infekcijām veido 14% no kopējā pacientu skaita, kas vēršusies pie ģimenes ārsta. Monitoringa dati liecina, ka aizvadītajā nedēļā gripas un citu akūtu elpceļu infekciju (turpmāk – AEI) aktivitāte bija zema.

Gripa klīniski noteikta četriem pacientiem jeb vidēji saslimstība sastāda 5,9 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, tāpat, kā iepriekšējā nedēļā.

Ar citu AEI simptomiem nedēļas laikā kopā bija vēršies 731 patients jeb vidēji 1 075,6 uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir par 2,5% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā (1 103,6 uz 100 000 iedz.).

Pneimoniju gadījumā ambulatorajās iestādēs nedēļas laikā vēršusies 22 pacienti jeb vidēji 32,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir par 18,5% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā (39,7 uz 100 000 iedz.).

Monitoringā iekļautajās 10 stacionārajās ārstniecības iestādēs Rīgā un citos Latvijas reģionos 44. nedēļā stacionēto pacientu īpatsvars smagas akūtas respiratoras infekcijas (turpmāk – SARI) gadījumos bija 3,1% (43. nedēļā – 2,9%). No slimnīcās testētajiem SARI pacientiem, septiņos (3,2%) gadījumos tika apstiprināta gripa, tostarp noteikti četri *A tipa* gripas vīrusi.

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā 44. nedēļā uz gripas vīrusiem un respiratori sincitiālo vīrusu (turpmāk – RSV) izmeklēti 238 klīniskie paraugi. Apstiprināti trīs (1,3%) *A tipa* gripas vīrusi ar *A/H1pdm* apakštipu. Respiratori sincitiālais vīruss kopš sezonas sākuma testētajos paraugos netika noteikts.

Vasaras beigās līdzīgi kā iepriekšējās sezonās Latvijā, tāpat kā citās PVO Eiropas reģiona valstīs tika novērots Covid-19 infekcijas saslimstības pacēlums. Laboratoriski apstiprināto Covid-19 vīrusa paraugu īpatsvars 44. nedēļā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, ir samazinājies no 10,4% līdz 8,2%. Augstākais rādītājs kopš saslimstības pacēluma sākuma tika novērots 37. nedēļā (18,9%).

Galvenie akūtu augšējo elpceļu infekciju monitoringa rādītāji pēdējo trīs nedēļu laikā

*Ambulatorās veselības aprūpes iestāžu monitoringa rādītāji**

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	42.	43.	44.
Pacientu ar elpceļu infekciju simptomiem īpatsvars no kopējā ambulatoro apmeklējumu skaita	18%	14%	14%
AEI gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	1 283,2	1 103,6	1 075,6
Gripas gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	4,3	5,9	5,9
Pneimoniju gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	46,1	39,7	32,4

*Monitoringā iekļautās ambulatorās ārstniecības iestādes

Stacionāro ārstniecības iestāžu monitoringa rādītāji

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	42.	43.	44.
SARI stacionēto pacientu skaits*	174	122	136
SARI īpatsvars no kopējā uzņemto pacientu skaita*	4,0%	2,9%	3,1%
Covid-19 stacionēto pacientu skaits**	34	36	38
Nāves gadījumu skaits Covid-19 pacientiem**	2	2	1
Nāves gadījumu skaits gripas pacientiem***	0	0	0

*Monitoringā iekļauto 10 stacionāro ārstniecības iestāžu dati

**Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmas (SAIRIS) dati (25 slimnīcas)

***Saņemto paziņojumu skaits (MK noteikumu Nr. 948 2. pielikums)

Laboratoriju monitoringa rādītāji

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	42.	43.	44.
Gripas pozitīvo paraugu īpatsvars*	1,6%	0,4%	1,3%
RSV pozitīvo paraugu īpatsvars*	0,0%	0,0%	0,0%
SARS-CoV-2 pozitīvo paraugu īpatsvars**	11,2%	10,4%	8,2%

*SIA RAKUS NMRL dati

**Nacionālā veselības dienesta datu centralizētās sistēmas (DCS) dati

*Izglītības iestāžu monitoringa rādītāji**

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	42.	43.	44.
Vidējais vispārējās izglītības iestāžu apmeklējuma īpatsvars	90,0%	Brīvlaiks	94,6%
Vidējais pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējuma īpatsvars	71,9%	63,6%	74,2%


*Monitoringā iesaistīto izglītības iestāžu dati

GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS

2025. gada 44. nedēļā informācija par pacientu skaitu, kas vērsušies ambulatorajās ārstniecības iestādēs akūtu elpceļu infekciju gadījumos, saņemta no 42 ģimenes ārstu praksēm (turpmāk – ĢĀP). Pacientu īpatsvars ambulatorajās iestādēs ar elpceļu infekcijām veido 14% no kopējā iestādē vērsušos pacientu skaita (iepriekšējā nedēļā – 14%).

Gripas intensitāte 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās

Kopš monitoringa sezonas sākuma (2025. gada 40. nedēļa) Latvijā novērota zema gripas izplatības intensitāte. Aizvadītajā nedēļā gripa klīniski noteikta četriem pacientiem jeb vidēji saslimstība sastāda 5,9 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, tāpat kā iepriekšējā nedēļā. Viens no četriem gripas gadījumiem ir apstiprināts ar ātro antigēna testu. Kopš sezonas sākuma ĢĀP kopā reģistrēts 21 klīniski apstiprināts gripas gadījums.



Gripas intensitāte atsevišķās vecuma grupās

2025. gada 44. nedēļā klīniski apstiprinātie divi gripas gadījumi reģistrēti vecuma grupā 15–64 gadi (4,7 gad. uz 100 000 iedz.), viens reģistrēts vecuma grupā 5–14 gadi (12,8 gad. uz 100 000 iedz.) un viens vecuma grupā 65 un vairāk gadi (7,0 gad. uz 100 000 iedz.). Iepriekšējās divās sezonās augstāka saslimstība ar gripu bija novērota bērniem līdz 14 gadu vecumam.

Gripas intensitāte administratīvajās teritorijās 2024.–2025. un 2025.–2026. gada sezonā


2025. gada 44. nedēļā klīniski apstiprināti gripas gadījumi reģistrēti divās monitoringa teritorijās: viens gadījums Ventspilī (22,2 uz 100 000 iedz.) un trīs Rīgā (10,9 uz 100 000 iedz.).

	2024.-2025. (nedēļas)																		2025.-2026. (nedēļas)			
Teritorija	40.	42.	44.	46.	48.	50.	52.	02.	04.	06.	08.	10.	12.	14.	16.	18.	20.	40.	42.	44.	46.	48.
Liepāja																						
Ventspils																						
Daugavpils																						
Rēzekne																						
Jūrmala																						
Valmieras nov.																						
Gulbenes nov.																						
Jēkabpils nov.																						
Jelgava																						
Rīga																						
Vidēji Latvija																						

	0 - gripas gadījumi netika reģistrēti		200 - 399 uz 100 000 iedz.	- vidēja
	< 100 uz 100 000 iedz.	- ļoti zema	400 - 599 uz 100 000 iedz.	- augsta
	100 - 199 uz 100 000 iedz.	- zema	> 600 uz 100 000 iedz.	- ļoti augsta

Akūtas elpceļu infekcijas 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās

2025. gada 44. nedēļā vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs AEI gadījumos (1 075,6 uz 100 000 iedz.) samazinājās par 2,5%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Kopumā saslimstība ar AEI šajā sezonā ir zemāka, nekā iepriekšējās piecās sezonās vidēji.




Akūtu elpceļu infekciju intensitāte atsevišķās vecuma grupās

Augstākā saslimstība ar AEI tiek reģistrēta bērniem 0 – 4 gadu vecuma grupā (5 907,9 uz 100 000 iedz.), tāpat kā iepriekšējās nedēļās. Pārējās vecuma grupās saslimstība ar AEI nedaudz samazinājās.

Pneimonijas 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās

Ambulatorajās iestādēs 2025. gada 44. nedēļā reģistrēti 22 pneimoniju gadījumi jeb 32,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem. Pērn šajā laika periodā saslimstība ar pneimonijām bija vismaz 1,5 reizes augstāka.



Pneimoniju intensitāte atsevišķās vecuma grupās


2025. gada 44. nedēļā augstākā saslimstība ar pneimonijām, tāpat kā iepriekšējās sezonās, tiek reģistrēta bērniem vecuma grupā 0–4 gadi (100,1 uz 100 000 iedz.). Aizvadītajā nedēļā bērniem vecumā līdz 14 gadiem novērojama zemāka saslimstība, nekā 43. nedēļā, taču vecumā no 15 gadiem saslimstība saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī.

STACIONĒTIE PACIENTI SMAGU AKŪTU RESPIRATORO INFEKCIJU (SARI) GADĪJUMOS

Stacionētie SARI pacienti 2025.–2026. gada sezonā


Par stacionētiem pacientiem SARI gadījumos un to testēšanu ziņo 10 stacionārās aprūpes iestādes, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS).

2025. gada 44. nedēļā uzraudzības iestādēs stacionēti 136 SARI pacienti. Stacionēto SARI pacientu īpatsvars no kopā stacionētajiem pacientiem sastādīja 3,1% (43. nedēļā – 2,9%). No 136 pacientiem astoņi (5,9%) tika ievietoti intensīvās terapijas nodaļās (ITN).




Stacionēti SARI pacienti pa vecuma grupām

2025. gada 44. nedēļā stacionēto SARI pacientu skaits palielinājās vecuma grupās 15–64 gadi un 65 un vairāk gadi. Stacionēto senioru (65+ gadi) skaits veido 45,6% no visiem stacionētajiem SARI pacientiem šajā nedēļā.




Stacionāro pacientu testēšana uz gripu, Covid-19 un RSV


2025. gada 44. nedēļā stacionārās veselības aprūpes iestādēs uz gripu laboratoriski izmeklēti 219 pacienti, septiņos (3,2%) gadījumos apstiprināti gripas vīrusi, tostarp četriem pacientiem noteikts *A tipa* gripas vīruss. Iepriekšējā 43. nedēļā gripa apstiprināta astoņiem (3,1%) stacionāros testētiem pacientiem.



Covid-19 infekcijas pozitīvo paraugu īpatsvars 44. nedēļā, salīdzinot ar 43. nedēļu, palielinājās. Uz SARS-CoV-2 testēti 266 pacienti, no tiem 20 (7,5%) pacientiem apstiprināta Covid-19 infekcija (iepriekšējā nedēļā – 15 (4,5%) pacientiem).



Respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) pozitīvo paraugu īpatsvars palielinājies, salīdzinot ar 43. nedēļu. Aizvadītajā nedēļā 46 pacienti tika testēti uz RSV, infekcija netika apstiprināta divos (4,3%) gadījumos (iepriekšējā nedēļā RSV netika apstiprināts nevienā gadījumā).



VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒTĪBA

Vispārējās izglītības iestādēs 2025. gada 44. nedēļā (ceturtdien) vidējā apmeklētība bija 94,6%, kas ir par 4,6% vairāk nekā nedēļā pirms skolēnu brīvlaika.

Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto skolēnu skaita (%)										
	Daugavpils	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils novads	Jūrmala	Liepāja	Rēzekne	Rīga	Valmieras novads	Ventspils	Vidēji
40.	93,3	95,4	99,0	97,6	91,9	94,8	82,5	91,7	97,8	92,9	93,1
41.	93,6	92,3	96,9	92,7	92,3	93,3	91,6	89,2	96,7	92,6	91,9
42.	94,3	93,1	93,2	93,3	90,5	93,5	92,8	84,2	94,2	92,3	90,0
43.	Brīvlaiks										
44.	94,6	94,4	95,9	93,5	92,9	93,4	91,8	94,8	101,0	94,7	94,6
Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu (±)	0,3	1,4	2,6	0,2	2,3	-0,1	-1,0	10,6	6,8	2,4	4,6

Pirmsskolas izglītības iestādēs 2025. gada 44. nedēļā (ceturtdien) vidēji apmeklēja vairāk bērnu kā iepriekšējā nedēļā – 74,2%. Zemākā apmeklētība reģistrēta Jelgavā (61,9%).

Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto bērnu skaita (%)										
	Daugavpils	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils novads	Jūrmala	Liepāja	Rēzekne	Rīga	Valmieras novads	Ventspils	Vidēji
40.	68,7	73,0	76,5	55,1	70,5	62,7	69,7	75,3	67,1	69,2	70,7
41.	73,2	66,1	72,1	59,2	72,8	61,7	71,1	71,7	69,5	71,1	70,6
42.	69,6	72,2	74,3	68,4	68,0	81,0	75,0	73,5	68,1	70,2	71,9
43.	71,8	64,3	62,4	39,8	66,0	70,8	67,1	65,1	53,5	59,4	63,6
44.	75,3	69,6	61,9	70,4	74,0	78,9	78,9	78,3	66,7	71,7	74,2
Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu (±)	3,6	5,2	-0,4	30,6	8,0	8,1	11,8	13,2	13,1	12,3	10,6

GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI

Kopš sezonas sākuma (2025. gada 40. nedēļa) paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripu vai ar aizdomām par gripas infekciju nav saņemti.

MIKROBIOLOĢIJAS DATI

Gripas A tipa un B tipa vīrusu un RSV noteikšana klīniskajos paraugos

2025. gada 44. nedēļā uz gripas vīrusiem un RSV izmeklēti 238 klīniskie paraugi. Apstiprināti trīs A tipa gripas vīrusi, kas piederēja A/H1pdm apakštipam. Respiratori sincitiālais vīruss kopš sezonas sākuma testētajos paraugos netika noteikts.

Monitoringa nedēļa	Izmeklēto paraugu skaits	Gripas vīrusi			Respiratori sincitiālais vīruss (RSV)	
		t.sk. pozitīvi		Pozitīvo paraugu īpatsvars	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars
		A gripa	B gripa			
40.	206	0	0	0,0%	0	0,0%
41.	250	0	0	0,0%	0	0,0%
42.	243	4	0	1,6%	0	0,0%
43.	240	1	0	0,4%	0	0,0%
44.	238	3	0	1,3%	0	0,0%
Kopā	1 177	8	0	0,7%	0	0,0%

Gripas vīrusu tipēšana

Kopš sezonas sākuma laboratoriski apstiprināti astoņi gripas vīrusi, visi (100,0%) A tipa. Visiem apstiprinātajiem gripas vīrusiem, noteikts apakštips: galvenokārt AH1pdm (87,5%).

Gripas vīrusi	Skaits	Īpatsvars
AH1pdm	7	87,5%
AH3	1	12,5%
B/Victoria	0	0,0%
B/Yamagata	0	0,0%
Kopā	8	100,0%

Citu elpceļu infekciju vīrusu noteikšana

2025. gada 44. nedēļā citi elpceļu vīrusi NMRL apstiprināti 35 gadījumos, to skaitā 27 gadījumos konstatēti rinovīrusi. Laboratoriski apstiprināta arī paragripa, adenovīrusi un bokavīruss.

Monitoringa nedēļa	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi							Pozitīvie paraugi kopā	
		Paragripa	Adenovīrusi	Bokavīrusi	hMPV	Enterovīrusi	Koronavīrusi	Rinovīrusi	Skaits	Īpatsvars
40.	115	3	0	0	0	0	1	23	27	23,5%
41.	144	2	1	1	0	0	0	35	39	27,1%
42.	155	9	0	0	0	0	1	28	38	24,5%
43.	134	2	2	0	0	0	1	16	21	15,7%

Monitoringa nedēļa	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi							Pozitīvie paraugi kopā	
		Paragripa	Adenovīrusi	Bokavīrusi	hMPV	Enterovīrusi	Koronavīrusi	Rinovīrusi	Skaits	Īpatsvars
44.	146	4	3	1	0	0	0	27	35	24,0%
Kopā	694	20	6	2	0	0	3	129	160	23,1%

Bakteriālo patogēnu noteikšana

Šajā sezonā izmeklēti 696 paraugi *Mycoplasma pneumoniae* baktēriju noteikšanai, pozitīvo paraugu īpatsvars veido vidēji 2,2%, kas ir ievērojami mazāk nekā iepriekšējā sezonā šajā laika periodā (2024. gada 40. – 44. nedēļā *Mycoplasma pneumoniae* apstiprināta 144 no 793 testētajiem paraugiem jeb 18,2%).

Monitoringa nedēļa	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>			Izmeklēto paraugu skaits	<i>Streptococcus pneumoniae</i>		<i>Haemophilus influenzae</i>		<i>Chlamydia pneumoniae</i>		Kopējais pozitīvo paraugu skaits
	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)		t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)	
40.	113	2	1,8	23	8	34,8	7	30,4	0	0,0	17
41.	153	2	1,3	38	12	31,6	8	21,1	0	0,0	22
42.	146	4	2,7	31	16	51,6	7	22,6	0	0,0	27
43.	138	4	2,9	27	12	44,4	9	33,3	0	0,0	25
44.	146	3	2,1	30	17	56,7	7	23,3	0	0,0	27
Kopā	696	15	2,2	149	65	43,6	38	25,5	0	0,0	118


COVID-19 INFEKCIJAS DATI

Latvijā datus par Covid-19 infekciju sniedz slimnīcas, laboratorijas un ģimenes ārstu prakses (Nacionālā veselības dienesta dati) un stacionārās ārstniecības iestādes, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS).

Pozitīvo testu īpatsvars un stacionāro pacientu skaits Covid-19 infekcijas gadījumos


Vasaras beigās tāpat kā iepriekšējās sezonās Latvijā un citās PVO Eiropas reģiona valstīs tika novērots Covid-19 infekcijas saslimstības pacēlums. Latvijā augstākā saslimstība reģistrēta 37. nedēļā, kad laboratoriski apstiprināto testu īpatsvars sasniedza 18,9%, pēc tam saslimstība samazinājās. 2025. gada 44. nedēļā pozitīvo Covid-19 testu īpatsvars turpināja samazināties, taču pēdējo sešu nedēļu laikā Covid-19 epidemioloģiskā situācija nav bijusi stabila. 2025. gada 44. nedēļā veikti 415 testi Covid-19 apstiprināšanai, no tiem 34 (8,2%) bija pozitīvi uz SARS-CoV-2 (43. nedēļā – 42 (10,4%) pozitīvi).

2025. gada 44. nedēļā slimnīcās uzņemti 38 Covid-19 infekcijas pacienti (iepriekšējā nedēļā – 36 pacienti). Kopā 44. nedēļā stacionāros ārstējušies 84 pacienti, kuriem apstiprināta Covid-19 infekcija, no tiem ar pamata diagnozi Covid-19 bija 32 (38,1%) pacienti.



Mirušo Covid-19 pacientu skaits


2025. gada 44. nedēļā reģistrēts viens nāves gadījums pacientam, kuram laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija. Kopš monitoringa sezonas sākuma kopā reģistrēti 20 nāves gadījumi pacientiem ar Covid-19.



Covid-19 notekūdeņu monitorings

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR monitoringa dati par SARS-COV-2 vīrusa RNS koncentrāciju notekūdeņos rāda, ka Latvijā kopumā tā mēreni samazinās pēc vairāku nedēļu pieauguma vasaras beigās. Monitoringa teritoriju notekūdeņos galvenokārt dominē Omikron KP.3 atvasinājumu apakšlīnija.¹

¹ <https://bior.lv/lv/sars-cov-2-virusa-rns-kopiju-izplatiba-latvija>



PVO EIROPAS REĢIONA ELPCEĻU VĪRUSU UZRAUDZĪBA

European Respiratory Virus Surveillance Summary (ERVISS) 43. nedēļas ziņojums²

Kopsavilkums

PVO Eiropas reģiona valstīs gripas aktivitāte joprojām ir zem epidēmiskā sliekšņa (10%), bet pēdējo nedēļu laikā palielinājusies, salīdzinot ar starpsezonu līmeni. Vairākās reģiona valstīs un apgabalos ir vērojams gripas aktivitātes pieaugums. SARS-CoV-2 aktivitāte reģionālā līmenī kopumā samazinās, bet dažādās reģiona valstīs ir nevienmērīga. Dominējošais SARS-CoV-2 variants reģiona valstīs joprojām ir XFG. RSV aktivitātes rādītāji visā reģionā saglabājas starpsezonas līmenī.

Elpceļu vīrusu aktivitāte

Paaugstināti gripai līdzīgu saslimšanu rādītāji novēroti divās valstīs (Austrijā, Kazahstānā) un akūtu elpceļu infekciju rādītāji ir paaugstināti trijās valstīs (Vācijā, Lietuvā, Spānijā).

Saslimstības rādītāji PVO Eiropas reģiona veselības aprūpes uzraudzības iestādēs:

- **Gripas** aktivitāte saglabājas zem epidēmiskā sliekšņa, pozitīvo testu īpatsvaram sastādot 6% (iepriekšējā nedēļā – 5%). Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 23 reģiona valstīs bija 2% (intervāls: 0%-17%) un divas teritorijas ziņoja par pārsniegtu epidēmisko sliekšni: Apvienotā Karaliste – Ziemeļīrija (17%) un Apvienotā Karaliste – Skotija (16%);

² <https://erviss.org/>

- **SARS-CoV-2** pozitīvo testu īpatsvars nedaudz samazinājies – 11% (iepriekšējā nedēļā – 13%). Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 20 reģiona valstīs bija 9% (intervāls: 0%-47%);
- **RSV** pozitīvo testu īpatsvars saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī – 1%. Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 22 reģiona valstīs bija 0% (intervāls: 0%-6%).

No pozitīvajiem un tipētajiem gripas vīrusu paraugiem (n=128), galvenokārt noteikti *A tipa* vīrusi (98%). No tiem apakštips noteikts 73: *A(H3)* (59%) un *A(H1)pdm09* (41%).

Saslimšanas smaguma rādītāji

Pēc slimnīcu (SARI) uzraudzības datiem:

- **Gripas** pozitīvo testu īpatsvars saglabājas aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī – 4%. Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 11 valstīs bija 2% (intervāls: 0%-18%). No testētajiem SARI paraugiem noteikti 44 gripas vīrusi, galvenokārt *A tipa* (97%), no kuriem apakštips noteikts 11 paraugiem – *A(H3)* (55%) un *A(H1)pdm09* (45%);
- **SARS-CoV-2** pozitīvo testu īpatsvars saglabājās aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī – 10%. Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 10 valstīs bija 10% (intervāls: 0%-25%);
- **RSV** pozitīvo testu īpatsvars saglabājās 1%, tāpat kā iepriekšējā nedēļā. Mediānais pozitīvo testu īpatsvars 10 valstīs bija 0% (intervāls: 0%-4%).

Ar COVID-19 saistīta mirstība 41 valstī saglabājas zema. EuroMOMO³ apkopotie dati par 25 Eiropas valstīm liecina, ka visu cēloņu mirstība visās vecuma grupās ir atbilstoša gaidītajam līmenim.

Vīrusu raksturojums

Gripa

- Pēdējo četru nedēļu laikā dati par gripas vīrusu raksturojumu uzraudzības iestādēs nav ziņoti.

SARS-CoV-2

- 2025. gada 41. – 42. nedēļas dati no deviņām valstīm rāda, ka dominējošie varianti ir:
 - XFG – 84% (60–93% no deviņām valstīm un apgabaliem),
 - NB.1.8.1 – 11% (0–30% no astoņām valstīm un reģioniem),
 - BA.2.86 – 5% (0–14% no astoņām valstīm un reģioniem).
- Saskaņā ar starptautiskās vīrusu genoma datubāzes “GISAID” datiem par 2025. gada oktobri līdz 42. nedēļai Eiropas reģionā visbiežāk sastopamie SARS-CoV-2 paveidi ir XFG (49%), XFG.3 (22%), NB.1.8.1 (9 %) un XFG.3.4.1 (5%) (n=2 163).

Jāņem vērā, ka visi dati ir provizoriski un jaunāko nedēļu tendences var ietekmēt kavēta vai nepilnīga valstu datu ziņošana.

³ <https://www.euromomo.eu/>

***Pasaules Veselības organizācijas Globāla gripas uzraudzības tīkla
2025. gada 28. oktobra 550. ziņojums⁴***

Pasaules mērogā gripas aktivitāte saglabājās zema, dominējot *A tipa* gripas vīrusiem.

Ziemeļu puslodē lielākajā daļā valstu gripas aktivitāte saglabājās zema un stabila. Paaugstināts gripas pozitīvo paraugu īpatsvars tika konstatēts Centrālamerikā un Karību jūras reģionā, Ziemeļu un Austrumu Āfrikā, kā arī Ziemeļeiropā, pārsniedzot 30% pozitīvo paraugu īpatsvaru Rietumāfrikā, Vidusāfrikā, Rietumu, Dienvidu un Dienvidaustrumu Āzijā. Aktivitātes pieaugums novērots atsevišķās Rietumu un Austrumāfrikas, Ziemeļeiropas, Rietumu, Dienvidu un Dienvidaustrumu Āzijas valstīs.

Dienvidu puslodē gripas aktivitāte lielākajā daļā ziņojošo valstu saglabājās zema un stabila. Paaugstināts pozitīvo paraugu īpatsvars (>10%) tika novērots atsevišķās valstīs mērenajā Dienvidamerikā un Austrumāfrikā, bet vienā valstī Dienvidaustrumāzijā pozitīvo paraugu īpatsvars pārsniedza 30%. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, dienvidu puslodes valstīs netika novērots gripas aktivitātes pieaugums.

Reģionos ar paaugstinātu pozitīvo paraugu īpatsvaru, *A(H1N1)pdm09* gripas vīrusi dominēja Ziemeļu un Vidusāfrikā, savukārt *A(H3N2)* gripas vīrusi dominēja Ziemeļeiropā, Rietumu, Dienvidu un Dienvidaustrumu Āzijā un mērenajā Dienvidamerikā. Centrālamerikā un Karību jūras reģionā abi apakštipi cirkulēja līdzīgā proporcijā.

SARS-CoV-2

Globāli SARS-CoV-2 pozitīvo paraugu īpatsvars pieauga, tomēr kopējā aktivitāte saglabājās zemā līmenī. Paaugstināts pozitīvo paraugu īpatsvars (>10%) tika novērots Centrālamerikā un Karību jūras reģionā, tropu Dienvidamerikā, Dienvidrietumu un Austrumeiropā un Austrumāzijā. Neliels aktivitātes pieaugums tika ziņots atsevišķās Austrumāfrikas un Dienvidrietumu Eiropas valstīs.

RSV

RSV pozitīvo paraugu īpatsvars saglabājās paaugstināts dažās Rietumu un Austrumu Āfrikas valstīs, pārsniedzot 30% divās Centrālamerikas un Karību jūras reģiona valstīs. Lielākajā daļā ziņojošo valstu RSV aktivitāte saglabājās stabila, ar pieaugumu dažās Centrālamerikas un Karību jūras reģiona valstīs. RSV un gripas aktivitāte bija paaugstināta dažās Centrālamerikas un Karību jūras reģiona valstīs.

***PVO Konsultatīvās sanāksmes 2025. gada 28. februāra ziņojums par gripas vakcīnas sastāvu
2025.–2026. gada sezonai Ziemeļu puslodē⁵***

2025. gada 28. februārī notikušajā PVO Konsultatīvā sanāksmē tika apstiprināts vakcīnu sastāvs 2025. – 2026. gada sezonai Ziemeļu puslodē.

PVO iesaka izmantot trīsvērtīgas vakcīnas 2025. – 2026. gada gripas sezonā:

Vakcīnās, kuru ražošanā tiek izmantotas olas, jābūt šādiem komponentiem:

- *A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09* – līdzīgs vīruss;
- *A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)* – līdzīgs vīruss;
- *B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria līnija)* – līdzīgs vīruss

⁴ <https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-updates/current-influenza-update>

⁵ <https://www.who.int/publications/m/item/recommended-composition-of-influenza-virus-vaccines-for-use-in-the-2025-2026-nh-influenza-season>

Vakcīnās, kas tiek ražotas, izmantojot šūnas, jeb rekombinantās vakcīnās, jāiekļauj:

- *A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09* – līdzīgs vīruss;
- *A/District of Columbia/27/2023 (H3N2)* – līdzīgs vīruss;
- *B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria līnija)* – līdzīgs vīruss

PVO iesaka, izmantojot četrvērtīgas vakcīnas (šūnas jeb rekombinantās vakcīnās vai vakcīnas, kuru ražošanā tiek izmantotas olas) 2025. – 2026. gada gripas sezonā, kā *B/Yamagata* līnija komponentu iekļaut:

- *B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata līnija)* – līdzīgs vīruss.

PAR GRIPAS UN CITU ELPCEĻU INFEKCIJU MONITORINGU

2025. – 2026. gada sezonā monitoringā ir iesaistītas 44 ĢĀP desmit administratīvajās teritorijās – Liepāja, Ventspils (Kurzeme), Daugavpils, Rēzekne (Latgale), Jūrmala (Pierīga), Valmieras novads, Gulbenes novads (Vidzeme), Jēkabpils novads, Jelgava (Zemgale) un Rīga.

Kopējais reģistrēto pacientu skaits atlasītajās ĢĀP – 70 973 jeb 3,8% no Latvijas iedzīvotāju populācijas un 7,0% no monitoringa populācijas. ĢĀP katru nedēļu sniedz datus par pacientu skaitu, kas vērsušies pēc medicīniskās palīdzības ārsta praksē gripas, citu AEI un pneimoniju gadījumos, norādot pacientu skaitu pa vecuma grupām: 0-4, 5-14, 15-64 un 65 gadi un vairāk. Pēc ĢĀP sniegtās informācijas tiek aprēķināta gripas izplatības intensitāte pa teritorijām un pa vecuma grupām.

Lai novērtētu sezonālās gripas epidēmijas smagumu, katru sezonu monitoringā tiek iesaistītas slimnīcas visās administratīvajās teritorijās. Šajā sezonā ir iesaistītas 10 slimnīcas astoņās pilsētās: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA “Rēzeknes slimnīca”, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. Slimnīcas katru nedēļu, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS), ziņo par kopējo stacionēto pacientu skaitu pa vecuma grupām, kopējo un intensīvās terapijas nodaļā (ITN) stacionēto pacientu skaitu ar smagu akūtu respiratoru infekciju (turpmāk – SARI) pa vecuma grupām, SARI mirušo skaitu pa vecuma grupām un SARI pacientu skaitu, kas testēti uz gripu, Covid-19 un respiratori sincitiālo vīrusu (RSV), t.sk. pozitīvos gadījumus pa vecuma grupām.

Monitoringā tiek iekļautas vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes visās 10 administratīvajās teritorijās, kas katru nedēļu informē par iestāžu apmeklētību ceturtdien. 2025.-2026. gada sezonā tiks iesaistītas 30 skolas, kurās mācās 19 902 skolēni un 32 pirmsskolas izglītības iestādes, kuras apmeklē 4 935 bērni.

Mikrobioloģijas dati par cirkulējošiem elpceļu vīrusiem un baktērijām tiek saņemti no NMRL. Pārskatā tiek iekļauta informācija par izmeklēto klīnisko paraugu skaitu, kas tiek izmeklēti NMRL ar polimerāzes ķēdes reakcijas (RL-PKĶR) un Multiplex metodi elpceļu vīrusu noteikšanai. NMRL paraugi tiek saņemti no Rīgas stacionārajām ārstniecības iestādēm, no reģionālajām slimnīcām, kā arī no citām, t.sk. ambulatorajām iestādēm.

Materiālu sagatavoja: SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vecākā epidemioloģe Karīna Venediktova.

2025. – 2026. gada sezonas AEI un gripas monitoringa 2025. gada 44. nedēļā datus sniedza:

- 42 ģimenes ārstu prakses (reģistrēto pacientu skaits 67 962 jeb 6,7% no iedzīvotāju skaita monitoringa iekļautajās pilsētās; 3,7% no Latvijas iedzīvotāju skaita);
 - 10 stacionārās ārstniecības iestādes;
 - 30 vispārējās izglītības iestādes un 32 pirmsskolas izglītības iestādes.
- Izmantoti SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas dati un Valsts zinātniskais institūts "BIOR", Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Rīgas Tehniskās universitātes notekūdeņu monitoringa dati.

Pateicamies visiem monitoringa dalībniekiem par sniegto informāciju.

Datu pārpublicēšana un citēšana – atsauce uz Slimību profilakses un kontroles centra “Epidemioloģijas biļetenu” ir obligāta.