



Slimību profilakses un kontroles centrs

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, fakss 67501591, e-pasts pasts@spkc.gov.lv

EPIDEMIOLOĢIJAS BIĻETENS

Nr. 4 (1976)

2026. gada 28. janvārī

Gripa un citas akūtas elpceļu infekcijas 2025. – 2026. gada sezonā

Saturs

KOPSAVILKUMS PAR 2026. GADA 4. NEDĒĻU.....	1
GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS	3
STACIONĒTIE PACIENTI SARI GADĪJUMOS.....	6
VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒTĪBA.....	9
GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI.....	10
MIKROBIOLOĢIJAS DATI	10
COVID-19 INFEKCIJAS DATI	13
PVO EIROPAS REĢIONA ELPCEĻU VĪRUSU UZRAUDZĪBA	14
PAR GRIPAS UN CITU ELPCEĻU INFEKCIJU MONITORINGU.....	19

KOPSAVILKUMS PAR 2026. GADA 4. NEDĒĻU

2026. gada 4. nedēļā (19.01. – 25.01.) gripas monitoringā iesaistītajās ambulatorajās iestādēs pacientu īpatsvars ar elpceļu infekcijām veido 23% no kopējā pacientu skaita, kas vērsušies pie ģimenes ārsta. Monitoringa dati liecina, ka aizvadītajā nedēļā saslimstība ar gripu saglabājās augstā līmenī.

Gripa klīniski noteikta 286 pacientiem jeb vidēji 411,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir par 35,5% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā (303,9 uz 100 000 iedz.) taču divas reizes mazāk, nekā nedēļā pirms svētkiem (51. nedēļā – 795,0 uz 100 000 iedz.).

Ar citu AEI simptomiem nedēļas laikā kopā bija vērsušies 1 102 pacienti jeb vidēji 1 587,1 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir par 18,1% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā (1 343,7 uz 100 000 iedz.).

Pneimoniju gadījumā ambulatorajās iestādēs nedēļas laikā vērsušies 60 pacienti jeb vidēji 86,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī (85,0 uz 100 000 iedz.).

Monitoringā iekļautajās 10 stacionārajās ārstniecības iestādēs 4. nedēļā stacionēto pacientu īpatsvars smagas akūtas respiratoras infekcijas (SARI) gadījumos nedaudz palielinājies – 4,7% (3. nedēļā – 3,5%). No slimnīcās testētajiem SARI pacientiem 17,9% gadījumos apstiprināta gripa (3. nedēļā 12,9%).

Aizvadītajā nedēļā saņemti trīs paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu *A tipa* gripas infekciju, kas reģistrēti monitoringa 2. un 3. nedēļā.

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā 4. nedēļā uz gripas vīrusiem izmeklēti 414 klīniskie paraugi, no tiem 53 jeb 12,8% gadījumos apstiprināta gripa (iepriekšējā nedēļā 77 jeb 17,7%), noteikti *A tipa* gripas vīrusi: 11 *A/H3*, seši *A/H1pdm* un 36 netipēti.

Pēc Covid-19 saslimstības pacēluma vasaras beigās un augstākā pozitīvo testu īpatsvara 37. nedēļā (18,9%), saslimstība līmenis ir samazinājies. 2026. gada 4. nedēļā Covid-19 vīrusa pozitīvo paraugu īpatsvars nedaudz samazinājies (5,6%), salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu (6,5%).

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs norāda, ka gripas sezona ES/EEZ valstīs sākusies neparasti agri. Neskatoties uz to, ka dominējošais *A(H3N2)* vīruss būtiski atšķiras no sezonālās vakcīnas celma, tiek uzsvērts vakcinācijas svarīgums, kā arī savlaicīgas pretvīrusu terapijas uzsākšanas un citu profilaktisko pasākumu nozīme.

Galvenie akūtu elpceļu infekciju monitoringa rādītāji pēdējo trīs nedēļu laikā

*Ambulatorās veselības aprūpes iestāžu monitoringa rādītāji**

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	2.	3.	4.
Pacientu ar elpceļu infekciju simptomiem īpatsvars no kopējā ambulatoro apmeklējumu skaita	19%	18%	23%
AEI gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	1 389,6	1 343,7	1 587,1
Gripas gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	268,5	303,9	411,9
Pneimoniju gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	104,7	85,0	86,4

*Monitoringā iekļautās ambulatorās ārstniecības iestādes.

Stacionāro ārstniecības iestāžu monitoringa rādītāji

Monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	2.	3.	4.
SARI stacionēto pacientu skaits*	182	163	212
SARI īpatsvars no kopējā uzņemto pacientu skaita*	3,9%	3,5%	4,7%
Covid-19 stacionēto pacientu skaits**	47	39	57
Nāves gadījumu skaits Covid-19 pacientiem**	5	4	3
Nāves gadījumu skaits gripas pacientiem***	1	2	0

*Monitoringā iekļauto 10 stacionāro ārstniecības iestāžu dati

**Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmas (SAIRIS) dati (19 slimnīcas)

***Saņemto paziņojumu skaits (MK noteikumu Nr. 948 2. pielikums)

Laboratoriju monitoringa rādītāji

Monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	2.	3.	4.
Gripas pozitīvo paraugu īpatsvars*	10,5%	17,7%	12,8%
RSV pozitīvo paraugu īpatsvars*	1,5%	1,4%	1,4%
SARS-CoV-2 pozitīvo paraugu īpatsvars**	7,5%	6,5%	5,6%

*SIA RAKUS NMRL dati

**Nacionālā veselības dienesta datu centralizētās sistēmas (DCS) dati

*Izglītības iestāžu monitoringa rādītāji**

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	2.	3.	4.
Vidējais vispārējās izglītības iestāžu apmeklējuma īpatsvars	90,5%	90,1%	88,2%
Vidējais pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējuma īpatsvars	79,0%	75,4%	71,7%


*Monitoringā iesaistīto izglītības iestāžu dati

GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS

2026. gada 4. nedēļā informācija par pacientu skaitu, kas vērsušies ambulatorajās ārstniecības iestādēs akūtu elpceļu infekciju gadījumos, saņemta no 43 ģimenes ārstu praksēm (turpmāk – ĢĀP). Pacientu īpatsvars ambulatorajās iestādēs ar elpceļu infekcijām veido 23% no kopējā iestādē vērsušos pacientu skaita (iepriekšējā nedēļā – 18%).


Gripas intensitāte 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās

Latvijā šajā sezonā gripas izplatība sākusies agrāk nekā iepriekšējās sezonās. Sākot ar 48. monitoringa nedēļu vidējā gripas izplatības intensitāte strauji pieauga, augstāko rādītāju sasniedzot 51. nedēļā (795,0 uz 100 000 iedz.) un pārsniedzot pēdējo piecu sezonu maksimālo gripas intensitāti. Gada nogales svētku laikā saslimstība ar gripu samazinājās, bet 2026. gada 4. nedēļā palielinājās par 35,5%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.



Gripas intensitāte atsevišķās vecuma grupās

Tāpat kā iepriekšējās sezonās augstāka saslimstība ar gripu reģistrēta bērniem līdz 14 gadiem. Aizvadītajā nedēļā saslimstība palielinājās vecuma grupā 0–4 gadi.



Gripas intensitāte administratīvajās teritorijās 2024.–2025. un 2025.–2026. gada sezonā


2026. gada 4. nedēļā gripas gadījumi reģistrēti visās 10 monitoringa teritorijās. Visaugstākā gripas intensitāte reģistrēta Jēkabpils novadā (733,8 uz 100 000 iedz.), Rēzeknē (646,7 uz 100 000 iedz.) un Daugavpilī (627,0 uz 100 000 iedz.).

	2024.-2025.																		2025.-2026.							
Teritorija	40.	42.	44.	46.	48.	50.	52.	02.	04.	06.	08.	10.	12.	14.	16.	18.	20.	40.	42.	44.	46.	48.	50.	52.	02.	04.
Liepāja																										
Ventspils																										
Daugavpils																										
Rēzekne																										
Valmieras nov.																										
Gulbenes nov.																										
Jelgava																										
Jēkabpils nov.																										
Jūrmala																										
Rīga																										
Videji Latvija																										

	0 - gripas gadījumi netika reģistrēti	200 - 399 uz 100 000 iedz.	- vidēja
	< 100 uz 100 000 iedz.	400 - 599 uz 100 000 iedz.	- augsta
	100 - 199 uz 100 000 iedz.	> 600 uz 100 000 iedz.	- ļoti augsta
	- ļoti zema		
	- zema		


Akūtas elpceļu infekcijas 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās

Vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs citu AEI gadījumos 4. nedēļā palielinājās par 18,1% salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, sasniedzot 1 587,1 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem. Kopš sezonas sākuma saslimstība ar AEI ir līdzīga iepriekšējās sezonas rādītājiem.




Akūtu elpceļu infekciju intensitāte atsevišķās vecuma grupās

Augstāka saslimstība ar AEI tāpat kā iepriekšējās nedēļās reģistrēta bērniem vecumā līdz 14 gadiem, īpaši maziem bērniem vecuma grupā 0–4 gadi. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, saslimstība ar AEI bērnu vidū palielinājās.




Pneimonijas 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās

2026. gada 4. nedēļā vēršanās ambulatorajās iestādēs pneimoniju gadījumos saglabājās aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī (86,4 uz 100 000 iedz.). Kopš sezonas sākuma saslimstība ar pneimonijām ir vidēji trīs reizes zemāka nekā iepriekšējā sezonā šajā laika periodā.



Pneimoniju intensitāte atsevišķās vecuma grupās


Augstākā saslimstība ar pneimonijām tāpat kā iepriekšējās sezonās tiek reģistrēta bērniem, īpaši maziem bērniem vecuma grupā 0–4 gadi. 2026. gada 4. nedēļā saslimstība ar pneimonijām bērniem vecuma grupā 0–4 gadi palielinājās visvairāk.



STACIONĒTIE PACIENTI SMAGU AKŪTU RESPIRATORO INFEKCIJU (SARI) GADĪJUMOS


Stacionētie SARI pacienti 2025.–2026. gada sezonā

Par stacionētiem pacientiem SARI gadījumos un to testēšanu ziņo 10 stacionārās aprūpes iestādes, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS). 2026. gada 4. nedēļā slimnīcās stacionēti 212 SARI pacienti, no tiem 13 (6,1%) tika ievietoti intensīvās terapijas nodaļās (ITN). SARI pacientu īpatsvars (4,7%) no kopējā uzņemto pacientu skaita palielinājās salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu (3,5%).




Stacionēti SARI pacienti pa vecuma grupām

2026. gada 4. nedēļā stacionēto SARI pacientu īpatsvars no kopā stacionētajiem pacientiem samazinājās vecuma grupā 15–64 gadi. Pārējās vecuma grupās stacionēto SARI pacientu īpatsvars saglabājās aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī. Stacionētie SARI pacienti vecumā no 65 gadiem veido lielāko īpatsvaru no visiem stacionētajiem SARI pacientiem.




Stacionāros uzņemto pacientu testēšana uz gripu

2026. gada 4. nedēļā stacionārās veselības aprūpes iestādēs uz gripu testēti 593 pacienti, tostarp 106 (17,9%) gadījumos apstiprināta gripa. *A tipa* gripa apstiprināta 104 gadījumos un divos gadījumos apstiprināta *B tipa* gripa. Iepriekšējā 3. nedēļā gripa apstiprināta 67 (12,9%) stacionāros testētajiem SARI pacientiem.




Stacionāros uzņemto pacientu testēšana uz Covid-19

Covid-19 infekcijas pozitīvo testu īpatsvars stacionāros 4. nedēļā nedaudz palielinājās. Uz SARS-CoV-2 testēti 544 pacienti, no tiem 27 (5,0%) pacientiem apstiprināta Covid-19 infekcija (iepriekšējā nedēļā – 22 jeb 4,6%).



Stacionāros uzņemto pacientu testēšana uz RSV

Aizvadītajā nedēļā uz RSV tika izmeklēti 105 no stacionētajiem pacientiem, infekcija apstiprināta pieciem pacientiem jeb 4,8% (iepriekšējā nedēļā RSV apstiprināta arī pieciem pacientiem – 5,3%).



VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒTĪBA

Vispārējās izglītības iestādēs 2026. gada 4. nedēļā (ceturtdien) vidējā apmeklētība bija 88,2%, kas ir par 1,9% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā. Zemākā apmeklētība reģistrēta Jēkabpils novadā (85,0%).

Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto skolēnu skaita (%)										
	Liepāja	Ventspils	Daugavpils	Rēzekne	Valmieras novads	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils novads	Jūrmala	Rīga	Vidēji
40.	94,8	92,9	93,3	82,5	97,8	95,4	99,0	97,6	91,9	91,7	93,1
41.	93,3	92,6	93,6	91,6	96,7	92,3	96,9	92,7	92,3	89,2	91,9
42.	93,5	92,3	94,3	92,8	94,2	93,1	93,2	93,3	90,5	84,2	90,0
43.	Brīvdienas										
44.	93,4	94,7	94,6	91,8	99,3	94,4	95,9	93,5	92,9	94,8	94,5
45.	92,8	86,1	94,9	90,6	98,5	94,9	95,6	95,6	96,3	96,4	93,6
46.	91,2	91,1	93,5	92,4	92,4	94,2	93,5	92,3	92,5	88,2	90,8
47.	94,1	90,3	92,9	90,4	92,5	92,8	93,8	94,7	91,6	86,1	90,1
48.	92,8	91,0	93,6	89,6	91,4	92,5	91,5	93,7	92,0	78,7	87,7
49.	92,5	89,0	92,5	91,8	82,0	91,7	97,7	94,9	89,5	84,9	88,9
50.	92,3	85,7	91,2	88,8	81,5	86,4	69,1	91,6	89,0	82,8	85,6
51.	91,9	84,7	91,7	83,3	85,1	87,0	96,1	85,5	87,6	82,7	86,3
52.	Brīvdienas										
01.	Brīvdienas										
02.	92,1	92,1	93,7	91,2	94,4	89,8	84,2	89,2	87,4	89,3	90,5
03.	90,5	91,2	92,2	89,6	91,7	92,7	94,6	87,7	91,5	87,7	90,1
04.	91,0	90,0	87,7	87,8	90,7	90,3	92,4	85,0	88,2	86,0	88,2
Salīdzinājumā ar iepr. ned. (±)	0,5	-1,2	-4,5	-1,8	-1,0	-2,4	-2,2	-2,7	-3,3	-1,7	-1,9

Pirmsskolas izglītības iestādēs 2026. gada 4. nedēļā (ceturtdien) apmeklēja 71,7% bērnu, kas ir par 3,7% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā. Zemākā apmeklētība reģistrēta Gulbenes novadā.


Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto bērnu skaita (%)										
	Liepāja	Ventspils	Daugavpils	Rēzekne	Valmieras novads	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils novads	Jūrmala	Rīga	Vidēji
40.	62,7	69,2	68,7	69,7	67,1	73,0	76,5	55,1	70,5	75,3	70,7
41.	61,7	71,1	73,2	71,1	69,5	66,1	72,1	59,2	72,8	71,7	70,6
42.	81,0	70,2	69,6	75,0	68,1	72,2	74,3	68,4	68,0	73,5	71,9
43.	70,8	59,4	71,8	67,1	53,5	64,3	62,4	39,8	66,0	65,1	63,6
44.	78,9	71,7	75,3	78,9	66,7	69,6	61,9	70,4	74,0	78,3	74,2
45.	80,7	74,7	78,0	77,6	71,4	73,0	76,5	72,4	76,5	76,1	76,0
46.	77,1	72,3	76,7	63,2	74,2	70,4	81,9	67,3	81,3	78,8	76,1
47.	78,3	72,4	75,7	68,4	70,9	66,1	75,2	70,4	77,8	77,1	74,9
48.	75,6	74,8	76,7	76,3	69,5	71,3	69,5	78,6	77,5	71,8	73,9
49.	76,8	71,4	75,7	72,4	65,7	78,3	62,4	74,5	71,5	74,3	72,7
50.	80,1	61,6	70,0	73,7	53,5	73,9	68,1	76,5	69,8	73,7	68,9
51.	70,8	59,4	71,8	67,1	53,5	64,3	62,4	39,8	66,0	66,1	63,9
52.	Brīvdienas										
01.	Brīvdienas										
02.	84,6	79,6	78,5	80,3	77,0	78,3	77,4	77,6	78,8	78,0	79,0
03.	81,6	77,1	67,5	63,2	73,2	60,9	73,5	78,6	75,0	77,5	75,4
04.	86,7	70,2	69,8	71,1	70,0	47,0	75,7	72,4	66,0	73,6	71,7
Salīdzinājumā ar iepr. ned. (±)	5,1	-6,9	2,3	7,9	-3,2	-13,9	2,2	-6,2	-9,0	-3,9	-3,7

GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI

2026. gada 4. nedēļā saņemti trīs paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu *A tipa* gripas infekciju, kas reģistrēti monitoringa 2. un 3. nedēļā. Viens nāves gadījums reģistrēts pacientam vecuma grupā 40–49 gadi un divi gadījumi reģistrēti pacientiem vecuma grupā 80–89 gadi. Visiem pacientiem bija noteiktas vairākas blakus slimības (sirds un asinsvadu slimības, hroniskas aknu, nieru slimības, nervu sistēmas slimības u.c.).

Kopš monitoringa sezonas sākuma kopā saņemti astoņi paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu *A tipa* gripas infekciju. Visi pacienti bijuši ar vairākām hroniskām blakus slimībām (sirds un asinsvadu slimības, elpošanas ceļu slimības, onkoloģiskas slimības, imūnsupresija, hroniskas aknu, nieru slimības un nervu sistēmas slimības). Seši no mirušajiem pacientiem šajā sezonā nav bijuši vakcinēti pret gripu.


Iepriekšējā 2024. – 2025. gada sezonā kopā reģistrēti 146 nāves gadījumi.



MIKROBIOLOĢIJAS DATI

Gripas A tipa un B tipa vīrusu un RSV noteikšana klīniskajos paraugos

Šajā monitoringa sezonā gripas izplatības pieaugums novērojams agrāk, nekā iepriekšējās sezonās, sākot ar 46. nedēļu strauji palielinoties pozitīvo gripas paraugu īpatsvaram. Augstākais rādītājs kopš sezonas sākuma tika sasniegts 50. nedēļā (24,3%), pēc kā tas strauji samazinājās, iestājoties Ziemassvētku un Jaunā gada nedēļām.



2026. gada 4. nedēļā uz gripas vīrusiem un RSV izmeklēti 414 klīniskie paraugi. Laboratoriski apstiprināto gripas paraugu īpatsvars 4. nedēļā samazinājās līdz 12,8%. Apstiprināti 53 *A* tipa gripas vīrusi: 11 *A/H3*, seši *A/H1pdm* un 36 netipēti. Aizvadītajā nedēļā NMRL testētajos paraugos apstiprināti seši (1,4%) RSV.

Monitoringa nedēļa	Izmeklēto paraugu skaits	Gripas vīrusi			Respiratori sincitiālais vīruss (RSV)	
		t.sk. pozitīvi		Pozitīvo paraugu īpatsvars	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars
		A gripa	B gripa			
40.	206	0	0	0,0%	0	0,0%
41.	250	0	0	0,0%	0	0,0%
42.	243	4	0	1,6%	0	0,0%
43.	240	1	0	0,4%	0	0,0%
44.	238	3	0	1,3%	0	0,0%
45.	240	4	0	1,7%	0	0,0%
46.	232	8	0	3,4%	1	0,4%
47.	303	16	0	5,3%	0	0,0%
48.	317	29	0	9,1%	0	0,0%
49.	332	60	0	18,1%	1	0,3%
50.	482	117	0	24,3%	0	0,0%
51.	456	77	0	16,9%	2	0,4%
52.	386	75	0	19,4%	2	0,5%
01.	382	59	0	15,4%	4	1,0%
02.	392	41	0	10,5%	6	1,5%
03.	436	77	0	17,7%	6	1,4%
04.	414	53	0	12,8%	6	1,4%
Kopā	5 543	624	0	11,3%	28	0,5%

Gripas vīrusu tipēšana

Kopš sezonas sākuma NMRL apstiprināti 624 *A* tipa gripas vīrusi, no tiem 369 gadījumos noteikts apakštips, t.sk. 297 (80,5%) noteikts *A/H3* un 72 (19,5%) *A/H1pdm*.

B tipa gripas vīrusi kopš monitoringa sezonas sākuma NMRL netika apstiprināti.

Gripas vīrusi	Skaits	Īpatsvars
<i>A</i> gripa (netipēts)	255	40,9%
<i>A/H1pdm</i>	72	11,5%
<i>A/H3</i>	297	47,6%
Kopā	624	100,0%

Citu elpceļu infekciju vīrusu noteikšana

2026. gada 4. nedēļā NMRL apstiprināti 19 citi elpceļu vīrusi, to skaitā 13 rinovīrusi. Laboratoriski apstiprināti arī koronavīrusi, paragripas vīruss, adenovīruss un bokavīruss.

Monitoringa nedēļa	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi							Pozitīvie paraugi kopā	
		Paragripa	Adenovīrusi	Bokavīrusi	hMPV	Enterovīrusi	Koronavīrusi	Rinovīrusi	Skaitis	Īpatsvars
40.	115	3	0	0	0	0	1	23	27	23,5%
41.	144	2	1	1	0	0	0	35	39	27,1%
42.	155	9	0	0	0	0	1	28	38	24,5%
43.	134	2	2	0	0	0	1	16	21	15,7%
44.	146	4	3	1	0	0	0	27	35	24,0%
45.	145	3	3	1	0	0	2	27	36	24,8%
46.	143	4	2	0	0	0	1	16	23	16,1%
47.	176	8	0	0	0	0	0	19	27	15,3%
48.	166	3	2	0	0	0	1	26	32	19,3%
49.	150	3	2	2	0	0	1	18	26	17,3%
50.	174	3	1	5	1	0	1	10	21	12,1%
51.	186	2	5	2	0	0	4	16	29	15,6%
52.	191	1	4	1	0	0	8	18	32	16,8%
01.	163	1	2	3	1	0	4	15	26	16,0%
02.	164	1	3	5	0	0	2	18	29	17,7%
03.	152	4	2	1	1	0	0	9	17	11,2%
04.	138	1	1	1	0	0	3	13	19	13,8%
Kopā	2 642	54	33	23	3	0	30	334	477	18,1%

Bakteriālo patogēnu noteikšana

Šajā sezonā izmeklēti 2 501 paraugi *Mycoplasma pneumoniae* baktēriju noteikšanai, pozitīvo paraugu īpatsvars veido vidēji 0,7%, kas ir ievērojami mazāk nekā iepriekšējā sezonā šajā laika periodā (15,8%).

Monitoringa nedēļa	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>			<i>Chlamydia pneumoniae</i>		
	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)
40.	113	2	1,8	23	0	0,0
41.	153	2	1,3	38	0	0,0
42.	146	4	2,7	31	0	0,0
43.	138	4	2,9	27	0	0,0
44.	146	3	2,1	30	0	0,0
45.	165	3	1,8	36	0	0,0
46.	148	1	0,7	26	0	0,0
47.	185	3	1,6	38	0	0,0
48.	164	1	0,6	44	1	2,3
49.	168	3	1,8	33	0	0,0
50.	162	1	0,6	29	0	0,0
51.	37	1	2,7	37	1	2,7
52.	184	1	0,5	20	1	5,0
01.	152	1	0,7	12	0	0,0
02.	157	1	0,6	38	1	2,6
03.	137	3	2,2	34	1	2,9
04.	146	1	0,7	38	0	0,0
Kopā	2 501	35	1,4	534	5	0,9

COVID-19 INFEKCIJAS DATI


Latvijā datus par Covid-19 infekciju sniedz slimnīcas, laboratorijas un ģimenes ārstu prakses (Nacionālā veselības dienesta dati) un stacionārās ārstniecības iestādes, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS).

Pozitīvo testu īpatsvars un stacionēto pacientu skaits Covid-19 infekcijas gadījumos

Vasaras beigās tāpat kā iepriekšējās sezonās Latvijā un citās PVO Eiropas reģiona valstīs tika novērots Covid-19 infekcijas saslimstības pacēlums. Latvijā augstākā saslimstība reģistrēta 37. nedēļā, kad laboratoriski apstiprināto testu īpatsvars sasniedza 18,9%, pēc tam saslimstība samazinājās.


2026. gada 4. nedēļā veikti 713 testi Covid-19 apstiprināšanai, no tiem 40 (5,6%) bija pozitīvi uz SARS-CoV-2 (3. nedēļā izmeklēti 554, t.sk. pozitīvi 6,5%).

2026. gada 4. nedēļā slimnīcās uzņemti 57 Covid-19 infekcijas pacienti (iepriekšējā nedēļā – 39 pacienti). Kopā aizvadītajā nedēļā stacionāros ārstējušies 80 pacienti ar apstiprinātu Covid-19 infekciju, t.sk. ar pamata diagnozi Covid-19 bija 37 (46,3%) pacienti.




Mirušo Covid-19 pacientu skaits

2026. gada 4. nedēļā reģistrēti trīs nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. Pēc operatīvajiem datiem kopš gada sākuma kopā reģistrēti 15 nāves gadījumi, savukārt 2025. gadā kopā reģistrēti 132 nāves gadījumi pacientiem ar Covid-19.



Covid-19 notekūdeņu monitorings¹

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR monitoringa dati rāda, ka SARS-COV-2 vīrusa RNS koncentrācija notekūdeņos vidēji Latvijā samazinās.



PVO EIROPAS REĢIONA ELPCĒĻU VĪRUSU UZRAUDZĪBA

European Respiratory Virus Surveillance Summary (ERVISS)

3. nedēļas ziņojums²

Kopsavilkums

- Paaugstināti gripas un/vai akūtas elpceļu infekcijas rādītāji novēroti 24 no 31 PVO Eiropas reģiona valsts, kas ziņoja datus.
- Gripas aktivitāte samazinās lielākajā daļā valstu un reģionu, bet joprojām ir augsta un plaši izplatīta. Pozitīvo gripas testu īpatsvars primārās veselības aprūpes iestādēs vairākās valstīs joprojām palielinās, īpaši bērniem. Lielākā daļa slimnīcās uzņemto pacientu ar gripu ir vecumā no 65 gadiem. *A(H3)* tipa gripas vīruss joprojām ir dominējošais cirkulējošais vīruss reģionā, bet *A(H1)* gripas vīrusa izplatība lēnām palielinās.
- Pēdējās nedēļas laikā primārās aprūpes kontrolpunktos ziņotie gripas vīrusa gadījumi ar zināmu tipu (n=1 113) galvenokārt noteikti *A* tipa gripas vīrusi. No tipētajiem *A* gripas vīrusiem (n=723) lielākā daļa piederēja *A(H3)* apakštipam (76%).
- No 35 valstīm un reģioniem, kas ziņoja par gripas intensitāti: 19 ziņoja par vidēju vai augstāku intensitāti. No 34 valstīm un reģioniem, kas ziņoja par gripas ģeogrāfisko izplatību: 31 ziņoja par reģionālu vai plašu gripas izplatību.

¹ <https://bior.lv/lv/notekudenu-monitorings/sars-cov-2-virusa-rns-kopiju-izplatiba-latvija/2025-gada-zinojumi-par-rns-kopiju-izplatiba-latvija/>

² <https://erviss.org/>

- RSV gadījumu skaits un pozitīvo testu īpatsvars reģionālā līmenī turpina pieaugt, un visaugstākā saslimstība novērojama bērniem vecumā līdz 5 gadiem.
- SARS-CoV-2 aktivitātes rādītāji reģionā saglabājas bāzes līmenim. Covid-19 mirstības rādītāji 41 valstī, kas ziņoja par datiem, joprojām bija zemi.
- Šīs nedēļas apkopotie EuroMOMO aprēķini par visu cēloņu mirstību iesaistītajās Eiropas valstīs liecina par paaugstinātu mirstības līmeni, ko nosaka mirstības pieaugums vairākās valstīs vecuma grupā virs 65 gadiem.

Elpceļu vīrusu aktivitāte


Gripas izplatības rādītāji ir paaugstināti 22 valstīs, un akūtu elpceļu infekciju rādītāji ir paaugstināti četrās valstīs (Bulgārijā, Vācijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē – Anglijā).

Pozitīvo testu īpatsvars PVO Eiropas reģiona primārās veselības aprūpes kontroluzraudzības iestādēs:

- **gripas** izplatība saglabājas virs 10% epidēmijas sliekšņa, saglabājoties iepriekšējās nedēļas līmenī 32%. Mediānais īpatsvara rādītājs 28 valstīs bija 34% (diapazons: 0%–75%), un 27 valstīs un reģioni ziņoja par vismaz 10%.
- **SARS-CoV-2** saglabājas iepriekšējās nedēļas līmenī – 3%. Mediānais pozitīvo testu rādītājs 26 valstīs un reģionos bija 3% (diapazons: 0%–15%).
- **RSV** saglabājas iepriekšējās nedēļas līmenī – 9%. Mediānais rādītājs 25 valstīs un reģionos bija 6% (diapazons: 0%–28%).

Primary care sentinel testing

— Secondary care sentinel testing



Infekcijas smagums

Pozitīvo testu īpatsvars PVO Eiropas reģiona stacionārās veselības aprūpes kontroluzraudzības iestādēs SARI pacientiem:

- **Gripas** vīrusu īpatsvars – 28% (iepriekšējā nedēļā – 30%). Mediānais pozitīvo paraugu īpatsvars no 14 valstīm, kas ziņoja datus, bija 24% (diapazons: 1%–38%). Starp SARI paraugiem šonedēļ tīklā tika ziņots par 670 gripas vīrusiem, gandrīz visi *A tipa* gripas vīrusi (99%). No 157 raksturotajiem vīrusiem 71% bija *A(H3)* un 29% bija *A(H1)pdm09*.
- **SARS-CoV-2** bija 2% (iepriekšējā nedēļā – 3%); mediānais pozitīvo testu īpatsvars 12 valstīs, kas sniedza datus bija 0% (diapazons: 0%–5%).

- **RSV** pozitīvo īpatsvars bija 12% (iepriekšējā nedēļā 9%); mediānais pozitīvo testu īpatsvars 14 valstīs, kas sniedza datus bija 12% (diapazons: 0%–29%).
- No 13 valstīm vai reģioniem, kas ziņoja datus par slimnīcās uzņemtajiem gripas pacientiem vai intensīvās terapijas nodaļās uzņemtajiem pacientiem ārpus kontroluzraudzības sistēmas
 - o viena valsts ziņoja par hospitalizācijas gadījumu skaita samazināšanos (Slovākija),
 - o viena valsts ziņoja par hospitalizācijas gadījumu skaita pieaugumu (Lietuva),
 - o četras valstis ziņoja par intensīvās terapijas nodaļās uzņemto pacientu skaita samazināšanos (Čehija, Itālija, Lietuva un Zviedrija),
 - o viena valsts ziņoja par intensīvās terapijas nodaļās uzņemto pacientu skaita pieaugumu (Grieķija).

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra riska novērtējums pieaugošai A(H3N2) apakšklades K cirkulācijai ES/EEZ valstīs ³

Saistībā ar neparasti agru gripas izplatības sākumu un pieaugošu A(H3N2) apakšklades K cirkulāciju Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (turpmāk – ES/EEZ) valstīs Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – ECDC) publicējis riska novērtējumu. Gripas izplatība šajā sezonā sākusies neparasti agri, dominējot A tipa gripas vīrusiem un A(H3N2) apakštipam.

Gandrīz puse no visām ES/EEZ valstu ziņotajām sekvencēm “GISAID” starptautiskajā vīrusu genoma datubāzē laika posmā no 2025. gada maija līdz novembrim atbilst A(H3N2) vīrusa K apakškladei. Filoģenētiskā, antigēniskā un seroloģiskā analīze liecina par būtisku K apakšklades atšķirību no Ziemeļu puslodes A(H3N2) vakcīnas celma.

Pēdējās sezonās A(H3N2) nav bijis dominējošais gripas vīrusa apakštips, kas varētu norādīt uz zemāku populācijas imunitāti, tomēr seroloģiskie dati pašlaik nav pieejami, lai to pilnībā novērtētu. Austrumāzijas valstīs, kurās šobrīd tiek ziņots par A(H3N2) epidēmijas mazināšanos, līdz šim nav novēroti neparasti smagi slimības gadījumi, un cirkulējošie K apakšklades celmi šajās valstīs neatšķiras no tiem, kas konstatēti ES/EEZ valstīs. Pat ja šajā ziemā dominēs vīruss ar vājāku atbilstību vakcīnai, vakcīna joprojām tiek uzskatīta par būtisku profilakses instrumentu, jo paredzams, ka tā nodrošinās zināmu aizsardzību pret smagu slimības gaitu.

Pamatojoties uz pašlaik pieejamo informāciju, ECDC vērtē gripas radīto risku kā vidēju vispārējai populācijai un augstu – personām ar paaugstinātu smagas slimības gaitas risku (seniori, personas ar hroniskām vielmaiņas, plaušu, sirds un asinsvadu, neiromuskulārām un citām slimībām, grūtnieces, imūnsupresētas personas, kā arī cilvēki, kas dzīvo slēgtās kopienās, piemēram, ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs).

ECDC rekomendē:

- neatlikt sezonālo vakcināciju pret gripu riska grupas personām;
- savlaicīgu pretvīrusu līdzekļu lietošanu pacientiem ar gripas simptomiem, lai samazinātu komplikāciju un slimības progresēšanas risku pacientu grupās ar augstāku smagas slimības risku;
- pārskatīt un aktualizēt ārstniecības iestāžu rīcības plānus par darbu gripas epidēmijas laikā un gripas epidēmijas draudu gadījumā, lai mazinātu spiedienu uz veselības aprūpes sistēmu gripas sezonas laikā;

³ <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Threat%20Assessment%20Brief%20-%20Assessing%20the%20risk%20of%20increasing%20circulation%20of%20A%28H3N2%29%20subclade%20K.pdf>

- personālam un apmeklētājiem slimnīcās un ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs lietot sejas maskas periodos, kad pastiprināti cirkulē elpceļu vīrusi.

***Pasaules Veselības organizācijas Globālā gripas uzraudzības tīkla
2025. gada 21. janvāra 561. ziņojums⁴***

Gripa

Pasaulē gripas aktivitāte bija paaugstināta, un 2026. gada 2. nedēļā pozitīvo testu īpatsvars bija nedaudz zem 20%. SARS-CoV-2 aktivitāte kopumā saglabājās stabila un zema. Gripa bija dominējošā infekcija, un pozitīvo paraugu īpatsvars mērenajā un subtropu joslā Ziemeļu puslodē bija aptuveni 20%, bet tropu reģionos – nedaudz zem 20%. Dienvidu puslodes mērenajā un subtropu joslā dominēja SARS-CoV-2 ar pozitīvo paraugu īpatsvaru zem 10% un gripas pozitīvo paraugu īpatsvaru zem 5%.

Ziemeļu puslodē gripas pozitīvo paraugu īpatsvars bija paaugstināts (>10%) dažās Ziemeļamerikas un Rietumu un Vidusāfrikas valstīs. Pozitīvo gripas paraugu īpatsvars pārsniedza 30% dažās Centrālamerikas un Karību jūras reģiona, tropiskās Dienvidamerikas, Ziemeļāfrikas, Eiropas un Rietumu, Dienvidu, Dienvidaustrumu un Austrumāzijas valstīs. Aktivitātes pieaugums tika novērots Centrālamerikas un Karību jūras reģiona, Ziemeļāfrikas, Dienvidrietumu un Austrumeiropas, kā arī Rietumāzijas un Dienvidāzijas valstīs.

Dienvidu puslodē gripas aktivitāte kopumā saglabājās zema, lai gan paaugstināts pozitīvo paraugu īpatsvars (>10%) tika ziņots atsevišķās valstīs mērenajā Dienvidamerikā, Austrumāfrikā, Dienvidaustrumāzijā un Okeānijā. Pozitīvo gripas paraugu īpatsvars pārsniedza 30% vienā valstī tropiskajā Dienvidamerikā. Aktivitātes pieaugums tika novērots atsevišķās tropu un mērenās Dienvidamerikas valstīs.

Zonās ar paaugstinātu gripas īpatsvaru pārsvarā dominēja *A(H3N2)* gripas vīruss, izņemot tropisko Dienvidameriku, kur novērota vienlīdzīga *A(H1N1)pdm09* un *A(H3N2)* izplatība.

SARS-CoV-2

Globāli SARS-CoV-2 izplatība saglabājās stabilā un zemā līmenī, tomēr par paaugstinātu pozitīvo paraugu īpatsvaru (>10%) ziņoja dažas valstis Dienvidrietumu un Austrumeiropā un divas valstis Dienvidamerikas mērenajā joslā. Neliels aktivitātes pieaugums tika ziņots vienā valstī Dienvidamerikas mērenajā joslā.

Respiratori sincitiālais vīruss (RSV)

RSV aktivitāte kopumā bija stabila un zema, lai gan paaugstināts pozitīvo testu īpatsvars (>10%) tika ziņots dažās valstīs Centrālamerikā un Karību jūras reģionā, Dienvidrietumu un Ziemeļeiropā un Rietumāzijā. Par RSV aktivitātes pieaugumu ziņoja atsevišķās Dienvidrietumu un Ziemeļeiropas valstīs. RSV un gripas vienlaicīgi paaugstināta aktivitāte novērota atsevišķās valstīs Centrālamerikā un Karību jūras reģionā, Ziemeļeiropā, Dienvidrietumu Eiropā un Rietumāzijā.

***PVO Konsultatīvās sanāksmes 2025. gada 28. februāra ziņojums par gripas vakcīnas sastāvu
2025.–2026. gada sezonai Ziemeļu puslodē⁵***

2025. gada 28. februārī notikušajā PVO Konsultatīvā sanāksmē tika apstiprināts vakcīnu sastāvs 2025. – 2026. gada sezonai Ziemeļu puslodē.

PVO iesaka izmantot trīsvērtīgas vakcīnas 2025. – 2026. gada gripas sezonā:

Vakcīnās, kuru ražošanā tiek izmantotas olas, jābūt šādiem komponentiem:

⁴ <https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity--weekly-update-n--561>

⁵ <https://www.who.int/publications/m/item/recommended-composition-of-influenza-virus-vaccines-for-use-in-the-2025-2026-nh-influenza-season>

- *A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09* – līdzīgs vīruss;
- *A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)* – līdzīgs vīruss;
- *B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria līnija)* – līdzīgs vīruss

Vakcīnās, kas tiek ražotas, izmantojot šūnas, jeb rekombinantās vakcīnās, jāiekļauj:

- *A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09* – līdzīgs vīruss;
- *A/District of Columbia/27/2023 (H3N2)* – līdzīgs vīruss;
- *B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria līnija)* – līdzīgs vīruss

PVO iesaka, izmantojot četrvērtīgas vakcīnas (šūnas jeb rekombinantās vakcīnās vai vakcīnas, kuru ražošanā tiek izmantotas olas) 2025. – 2026. gada gripas sezonā, kā *B/Yamagata* līnija komponentu iekļaut:

- *B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata līnija)* – līdzīgs vīruss.

PAR GRIPAS UN CITU ELPCEĻU INFEKCIJU MONITORINGU

2025. – 2026. gada sezonā monitoringā ir iesaistītas 44 ĢĀP desmit administratīvajās teritorijās – Liepāja, Ventspils (Kurzeme), Daugavpils, Rēzekne (Latgale), Jūrmala (Pierīga), Valmieras novads, Gulbenes novads (Vidzeme), Jēkabpils novads, Jelgava (Zemgale) un Rīga.

Kopējais reģistrēto pacientu skaits atlasītajās ĢĀP – 70 973 jeb 3,8% no Latvijas iedzīvotāju populācijas un 7,0% no monitoringa populācijas. ĢĀP katru nedēļu sniedz datus par pacientu skaitu, kas vērsušies pēc medicīniskās palīdzības ārsta praksē gripas, citu AEI un pneimoniju gadījumos, norādot pacientu skaitu pa vecuma grupām: 0-4, 5-14, 15-64 un 65 gadi un vairāk. Pēc ĢĀP sniegtās informācijas tiek aprēķināta gripas izplatības intensitāte pa teritorijām un pa vecuma grupām.

Lai novērtētu sezonālās gripas epidēmijas smagumu, katru sezonu monitoringā tiek iesaistītas slimnīcas visās administratīvajās teritorijās. Šajā sezonā ir iesaistītas 10 slimnīcas astoņās pilsētās: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA “Rēzeknes slimnīca”, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. Slimnīcas katru nedēļu, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS), ziņo par kopējo stacionēto pacientu skaitu pa vecuma grupām, kopējo un intensīvās terapijas nodaļā (ITN) stacionēto pacientu skaitu ar smagu akūtu respiratoru infekciju (turpmāk – SARI) pa vecuma grupām, SARI mirušo skaitu pa vecuma grupām un SARI pacientu skaitu, kas testēti uz gripu, Covid-19 un respiratori sincitiālo vīrusu (RSV), t.sk. pozitīvos gadījumus pa vecuma grupām.

Monitoringā tiek iekļautas vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes visās 10 administratīvajās teritorijās, kas katru nedēļu informē par iestāžu apmeklētību ceturtdien. 2025.-2026. gada sezonā tiks iesaistītas 30 skolas, kurās mācās 19 902 skolēni un 32 pirmsskolas izglītības iestādes, kuras apmeklē 4 935 bērni.

Mikrobioloģijas dati par cirkulējošiem elpceļu vīrusiem un baktērijām tiek saņemti no NMRL. Pārskatā tiek iekļauta informācija par izmeklēto klīnisko paraugu skaitu, kas tiek izmeklēti NMRL ar polimerāzes ķēdes reakcijas (RL-PKĶR) un Multiplex metodi elpceļu vīrusu noteikšanai. NMRL paraugi tiek saņemti no Rīgas stacionārajām ārstniecības iestādēm, no reģionālajām slimnīcām, kā arī no citām, t.sk. ambulatorajām iestādēm.

Materiālu sagatavoja: SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vecākā epidemioloģe Karīna Venediktova.

2025. – 2026. gada sezonas AEI un gripas monitoringa 2026. gada 4. nedēļā datus sniedza:

- 43 ģimenes ārstu prakses (reģistrēto pacientu skaits 69 434 jeb 6,9% no iedzīvotāju skaita monitoringa iekļautajās pilsētās; 3,7% no Latvijas iedzīvotāju skaita);
 - 10 stacionārās ārstniecības iestādes;
 - 30 vispārējās izglītības iestādes un 32 pirmsskolas izglītības iestādes.
- Izmantoti SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas dati un Valsts zinātniskais institūts "BIOR", Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Rīgas Tehniskās universitātes notekūdeņu monitoringa dati.

Pateicamies visiem monitoringa dalībniekiem par sniegto informāciju.

Datu pārpublicēšana un citēšana – atsauce uz Slimību profilakses un kontroles centra “Epidemioloģijas biļetenu” ir obligāta.