



Slimību profilakses un kontroles centrs

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, fakss 67501591, e-pasts pasts@spkc.gov.lv

EPIDEMIOLOĢIJAS BIĻETENS

Nr. 6 (1978)

2026. gada 11. februārī

Gripa un citas akūtas elpceļu infekcijas 2025. – 2026. gada sezonā

Saturs

KOPSAVILKUMS PAR 2026. GADA 6. NEDĒĻU	1
GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS	3
STACIONĒTIE PACIENTI SARI GADĪJUMOS	6
VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒTĪBA	10
GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI	11
MIKROBIOLOĢIJAS DATI	12
COVID-19 INFEKCIJAS DATI	14
PVO EIROPAS REĢIONA ELPCEĻU VĪRUSU UZRAUDZĪBA	16
PAR GRIPAS UN CITU ELPCEĻU INFEKCIJU MONITORINGU	21

KOPSAVILKUMS PAR 2026. GADA 6. NEDĒĻU

2026. gada 6. nedēļā (02.02. – 08.02.) gripas monitoringā iesaistītajās ambulatorajās iestādēs pacientu īpatsvars ar elpceļu infekcijām veido 20% no kopējā pacientu skaita, kas vērsušies pie ģimenes ārsta. Monitoringa dati liecina, ka aizvadītajā nedēļā saslimstība ar gripu, saglabājās augstā līmenī.

Gripa klīniski noteikta 216 pacientiem jeb vidēji 311,1 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir par 31,8% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā (455,8 uz 100 000 iedz.).

Ar citu AEI simptomiem nedēļas laikā kopā bija vērsušies 1 004 pacienti jeb vidēji 1 446,0 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir par 23,1% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā (1 880,0 uz 100 000 iedz.).

Pneimoniju gadījumā ambulatorajās iestādēs nedēļas laikā vērsušies 68 pacienti jeb vidēji 97,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir par 26,2% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā (132,8 uz 100 000 iedz.).

Monitoringā iekļautajās 10 stacionārajās ārstniecības iestādēs 6. nedēļā stacionēto pacientu īpatsvars smagas akūtas respiratoras infekcijas (SARI) gadījumos palielinājies – 6,2% (5. nedēļā – 5,4%). No slimnīcās testētajiem SARI pacientiem 18,2% gadījumos apstiprināta gripa (5. nedēļā 21,7%).

Aizvadītajā nedēļā saņemti pieci paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju.

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā 6. nedēļā uz gripas vīrusiem izmeklēti 420 klīniskie paraugi, no tiem 63 jeb 15,0% gadījumos apstiprināta gripa (iepriekšējā nedēļā 74 jeb 16,3%), noteikti *A tipa* gripas vīrusi (septiņi *A/H3*, septiņi *A/H1pdm* un 49 netipēti).

Pēc Covid-19 saslimstības pacēluma vasaras beigās un augstākā pozitīvo testu īpatsvara 37. nedēļā (18,9%), saslimstība līmenis ir samazinājies. 2026. gada 6. nedēļā Covid-19 vīrusa pozitīvo paraugu īpatsvars palielinājās līdz 5,8% (iepriekšējā nedēļā – 4,0%).

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs norāda, ka gripas sezona ES/EEZ valstīs sākusies neparasti agri. Neskatoties uz to, ka dominējošais *A(H3N2)* vīruss būtiski atšķiras no sezonālās vakcīnas celma, tiek uzsvērts vakcinācijas svarīgums, kā arī savlaicīgas pretvīrusu terapijas uzsākšanas un citu profilaktisko pasākumu nozīme.

Galvenie akūtu elpceļu infekciju monitoringa rādītāji pēdējo trīs nedēļu laikā

*Ambulatorās veselības aprūpes iestāžu monitoringa rādītāji**

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	4.	5.	6.
Pacientu ar elpceļu infekciju simptomiem īpatsvars no kopējā ambulatoro apmeklējumu skaita	23%	26%	20%
AEI gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	1 587,1	1 880,8	1 446,0
Gripas gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	411,9	455,8	311,1
Pneimoniju gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	86,4	132,8	97,9

*Monitoringā iekļautās ambulatorās ārstniecības iestādes.

Stacionāro ārstniecības iestāžu monitoringa rādītāji

Monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	4.	5.	6.
SARI stacionēto pacientu skaits*	212	235	274
SARI īpatsvars no kopējā uzņemto pacientu skaita*	4,7%	5,4%	6,2%
Covid-19 stacionēto pacientu skaits**	57	64	64
Nāves gadījumu skaits Covid-19 pacientiem**	3	7	9
Nāves gadījumu skaits gripas pacientiem***	0	1	5

*Monitoringā iekļauto 10 stacionāro ārstniecības iestāžu dati

**Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmas (SAIRIS) dati (24 slimnīcas)

***Saņemto paziņojumu skaits (MK noteikumu Nr. 948 2. pielikums)

Laboratoriju monitoringa rādītāji

Monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	4.	5.	6.
Gripas pozitīvo paraugu īpatsvars*	12,8%	16,3%	15,0%
RSV pozitīvo paraugu īpatsvars*	1,4%	2,2%	2,9%
SARS-CoV-2 pozitīvo paraugu īpatsvars**	5,6%	4,0%	5,8%

*SIA RAKUS NMRL dati

**Nacionālā veselības dienesta datu centralizētās sistēmas (DCS) dati

*Izglītības iestāžu monitoringa rādītāji**

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2025. gada nedēļas		
	4.	5.	6.
Vidējais vispārējās izglītības iestāžu apmeklējuma īpatsvars	88,2%	87,2%	86,6%
Vidējais pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējuma īpatsvars	71,7%	68,2%	66,0%


*Monitoringā iesaistīto izglītības iestāžu dati

GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS

2026. gada 6. nedēļā informācija par pacientu skaitu, kas vērsušies ambulatorajās ārstniecības iestādēs akūtu elpceļu infekciju gadījumos, saņemta no 43 ģimenes ārstu praksēm (turpmāk – ĢĀP). Pacientu īpatsvars ambulatorajās iestādēs ar elpceļu infekcijām veido 20% no kopējā iestādē vērsušos pacientu skaita (iepriekšējā nedēļā – 26%).


Gripas intensitāte 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās

Latvijā šajā sezonā gripas izplatība sākusies agrāk nekā iepriekšējās sezonās. Sākot ar 48. monitoringa nedēļu vidējā gripas izplatības intensitāte strauji pieauga, augstāko rādītāju sasniedzot 51. nedēļā (795,0 uz 100 000 iedz.) un pārsniedzot pēdējo piecu sezonu maksimālo gripas intensitāti. 2026. gada 6. nedēļā saslimstība ar gripu samazinājās par 31,8%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.




Gripas intensitāte atsevišķās vecuma grupās

Tāpat kā iepriekšējās sezonās augstāka saslimstība ar gripu reģistrēta bērniem līdz 14 gadiem. Aizvadītajā nedēļā saslimstība ar gripu samazinājās visās vecuma grupās.




Gripas intensitāte administratīvajās teritorijās 2024.–2025. un 2025.–2026. gada sezonā

2026. gada 6. nedēļā gripas gadījumi reģistrēti visās 10 monitoringa teritorijās. Visaugstākā gripas intensitāte reģistrēta Jelgavā (1 205,6 uz 100 000 iedz.) un Liepājā (580,0 uz 100 000 iedz.).




Akūtas elpceļu infekcijas 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās

Vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs citu AEI gadījumos 6. nedēļā samazinājās par 23,1% salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, sasniedzot 1 446,0 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem. Aizvadītajā nedēļā saslimstība ar AEI nepārsniedz iepriekšējo piecu sezonu līmeni.




Akūtu elpceļu infekciju intensitāte atsevišķās vecuma grupās

Augstāka saslimstība ar AEI tāpat kā iepriekšējās nedēļās reģistrēta bērniem vecumā līdz 14 gadiem, īpaši maziem bērniem vecuma grupā 0–4 gadi. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, saslimstība ar AEI bērnu vidū samazinājās.




Pneimonijas 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās

2026. gada 6. nedēļā vērsšanās ambulatorajās iestādēs pneimoniju gadījumos samazinājās par 26,2%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu (132,8 uz 100 000 iedz.). Kopš sezonas sākuma saslimstība ar pneimonijām ir vidēji trīs reizes zemāka nekā iepriekšējā sezonā šajā laika periodā.



Pneimoniju intensitāte atsevišķās vecuma grupās


Augstākā saslimstība ar pneimonijām tāpat kā iepriekšējās sezonās tiek reģistrēta bērniem, īpaši maziem bērniem vecuma grupā 0–4 gadi. 2026. gada 6. nedēļā saslimstība ar pneimonijām par 36,1% palielinājās vecuma grupā 15–64 gadi, bet pārējās vecuma grupās samazinājās.



STACIONĒTIE PACIENTI SMAGU AKŪTU RESPIRATORO INFEKCIJU (SARI) GADĪJUMOS


Stacionētie SARI pacienti 2025.–2026. gada sezonā

Par stacionētiem pacientiem SARI gadījumos un to testēšanu ziņo 10 stacionārās aprūpes iestādes, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS). 2026. gada 6. nedēļā slimnīcās stacionēti 274 SARI pacienti, no tiem 17 (6,2%) tika ievietoti intensīvās terapijas nodaļās (ITN). SARI pacientu īpatsvars (6,2%) no kopējā uzņemto pacientu skaita palielinājās salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu (5,4%).




Stacionēti SARI pacienti pa vecuma grupām

2026. gada 6. nedēļā stacionēto SARI pacientu īpatsvars samazinājās vecuma grupā 5–14 gadi un pārejās vecuma grupās saglabājās aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī. Puse no visiem stacionētajiem SARI pacientiem ir vecumā no 65 gadiem.




Stacionāros uzņemto pacientu testēšana uz gripu

2026. gada 6. nedēļā stacionārās veselības aprūpes iestādēs uz gripu testēti 677 pacienti, tostarp 123 (18,2%) gadījumos apstiprināta gripa. *A* tipa gripa apstiprināta 120 gadījumos un trijos gadījumos apstiprināta *B* tipa gripa. Iepriekšējā 5. nedēļā gripa apstiprināta 129 (21,7%) stacionāros testētajiem SARI pacientiem.




Stacionāros uzņemto pacientu testēšana uz Covid-19

Covid-19 infekcijas pozitīvo testu īpatsvars stacionāros 6. nedēļā samazinājās. Uz SARS-CoV-2 testēti 622 pacienti, no tiem 22 (3,5%) pacientiem apstiprināta Covid-19 infekcija (iepriekšējā nedēļā – 36 jeb 6,3%).



Stacionāros uzņemto pacientu testēšana uz RSV

RSV infekcijas pozitīvo testu īpatsvars stacionāros 6. nedēļā turpināja palielināties. Uz RSV tika izmeklēti 124 no stacionētajiem pacientiem, infekcija apstiprināta 19 pacientiem jeb 15,3% (iepriekšējā nedēļā RSV infekcija apstiprināta deviņiem pacientiem – 11,0%) .



VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒTĪBA

Vispārējās izglītības iestādēs 2026. gada 6. nedēļā (ceturtdien) vidējā apmeklētība bija 86,6%, kas ir par 0,6% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā. Zemākā apmeklētība reģistrēta Jēkabpils novadā (78,7%), kas daļēji skaidrojams ar 1. klases skolēnu brīvdienām.

Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto skolēnu skaita (%)										
	Liepāja	Ventspils	Daugavpils	Rēzekne	Valmieras novads	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils novads	Jūrmala	Rīga	Vidēji
40.	94,8	92,9	93,3	82,5	97,8	95,4	99,0	97,6	91,9	91,7	93,1
41.	93,3	92,6	93,6	91,6	96,7	92,3	96,9	92,7	92,3	89,2	91,9
42.	93,5	92,3	94,3	92,8	94,2	93,1	93,2	93,3	90,5	84,2	90,0
43.	Brīvdienas										
44.	93,4	94,7	94,6	91,8	99,3	94,4	95,9	93,5	92,9	94,8	94,5
45.	92,8	86,1	94,9	90,6	98,5	94,9	95,6	95,6	96,3	96,4	93,6
46.	91,2	91,1	93,5	92,4	92,4	94,2	93,5	92,3	92,5	88,2	90,8
47.	94,1	90,3	92,9	90,4	92,5	92,8	93,8	94,7	91,6	86,1	90,1
48.	92,8	91,0	93,6	89,6	91,4	92,5	91,5	93,7	92,0	78,7	87,7
49.	92,5	89,0	92,5	91,8	82,0	91,7	97,7	94,9	89,5	84,9	88,9
50.	92,3	85,7	91,2	88,8	81,5	86,4	69,1	91,6	89,0	82,8	85,6
51.	91,9	84,7	91,7	83,3	85,1	87,0	96,1	85,5	87,6	82,7	86,3
52.	Brīvdienas										
01.	Brīvdienas										
02.	92,1	92,1	93,7	91,2	94,4	89,8	84,2	89,2	87,4	89,3	90,5
03.	90,5	91,2	92,2	89,6	91,7	92,7	94,6	87,7	91,5	87,7	90,1
04.	91,0	90,0	87,7	87,8	90,7	90,3	92,4	85,0	88,2	86,0	88,2
05.	87,7	87,5	88,7	86,9	90,0	88,7	92,2	88,4	88,1	85,0	87,2
06.	92,3	85,6	85,8	88,0	89,7	86,1	88,4	78,7	90,3	85,4	86,6
Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu (±)	4,5	-1,9	-2,9	1,2	-0,3	-2,6	-3,8	-9,7	2,3	0,4	-0,6

Pirmsskolas izglītības iestādēs 2026. gada 6. nedēļā (ceturtdien) apmeklēja 66,0% bērnu, kas ir par 2,2% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā. Zemākā apmeklētība reģistrēta Daugavpilī (56,8%), bet salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu apmeklētība visvairāk samazinājusies Liepājā.

Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto bērnu skaita (%)										
	Liepāja	Ventspils	Daugavpils	Rēzekne	Valmieras novads	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils novads	Jūrmala	Rīga	Vidēji
40.	62,7	69,2	68,7	69,7	67,1	73,0	76,5	55,1	70,5	75,3	70,7
41.	61,7	71,1	73,2	71,1	69,5	66,1	72,1	59,2	72,8	71,7	70,6
42.	81,0	70,2	69,6	75,0	68,1	72,2	74,3	68,4	68,0	73,5	71,9
43.	70,8	59,4	71,8	67,1	53,5	64,3	62,4	39,8	66,0	65,1	63,6
44.	78,9	71,7	75,3	78,9	66,7	69,6	61,9	70,4	74,0	78,3	74,2
45.	80,7	74,7	78,0	77,6	71,4	73,0	76,5	72,4	76,5	76,1	76,0
46.	77,1	72,3	76,7	63,2	74,2	70,4	81,9	67,3	81,3	78,8	76,1
47.	78,3	72,4	75,7	68,4	70,9	66,1	75,2	70,4	77,8	77,1	74,9
48.	75,6	74,8	76,7	76,3	69,5	71,3	69,5	78,6	77,5	71,8	73,9
49.	76,8	71,4	75,7	72,4	65,7	78,3	62,4	74,5	71,5	74,3	72,7
50.	80,1	61,6	70,0	73,7	53,5	73,9	68,1	76,5	69,8	73,7	68,9
51.	70,8	59,4	71,8	67,1	53,5	64,3	62,4	39,8	66,0	66,1	63,9
52.	Brīvdienas										
01.	Brīvdienas										
02.	84,6	79,6	78,5	80,3	77,0	78,3	77,4	77,6	78,8	78,0	79,0


Monitoringa pilsētas / nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto bērnu skaita (%)										
	Liepāja	Ventspils	Daugavpils	Rēzekne	Valmieras novads	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils novads	Jūrmala	Rīga	Vidēji
03.	81,6	77,1	67,5	63,2	73,2	60,9	73,5	78,6	75,0	77,5	75,4
04.	86,7	70,2	69,8	71,1	70,0	47,0	75,7	72,4	66,0	73,6	71,7
05.	69,6	67,8	60,9	67,1	64,3	66,1	70,8	67,3	71,8	70,5	68,2
06.	59,9	67,5	56,8	67,1	60,6	66,1	67,3	60,2	66,0	70,2	66,0
Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu (±)	-9,6	-0,3	-4,1	0,0	-3,7	0,0	-3,5	-7,1	-5,8	-0,3	-2,2

GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI

2026. gada 6. nedēļā saņemti pieci paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju. Visi mirušie bija vecumā virs 70 gadiem ar vairākām hroniskām blakus slimībām (sirds un asinsvadu slimības, elpceļu slimības, onkoloģiskas slimības, hroniskas aknu, nieru slimības, nervu sistēmas slimības u.c.) un riska faktoriem (smēķēšana).

Kopš monitoringa sezonas sākuma kopā saņemti 14 paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju. Visi pacienti bijuši ar vairākām hroniskām blakus slimībām (sirds un asinsvadu slimības, elpceļu slimības, onkoloģiskas slimības, imūnsupresija, hroniskas aknu, nieru slimības, nervu sistēmas slimības, cukura diabēts, adipozitāte u.c.). No visiem mirušajiem pacientiem 11 (79%) pacienti šajā sezonā nav bijuši vakcinēti pret gripu.


Iepriekšējā 2024. – 2025. gada sezonā kopā reģistrēti 146 nāves gadījumi.



MIKROBIOLOĢIJAS DATI

Gripas A tipa un B tipa vīrusu un RSV noteikšana klīniskajos paraugos

Šajā monitoringa sezonā gripas izplatības pieaugums novērojams agrāk, nekā iepriekšējās sezonās, sākot ar 46. nedēļu strauji palielinoties pozitīvo gripas paraugu īpatsvaram. Augstākais rādītājs kopš sezonas sākuma tika sasniegts 50. nedēļā (24,3%), pēc kā tas strauji samazinājās, iestājoties Ziemassvētku un Jaunā gada nedēļām. 2026. gada sākumā gripas intensitāte saglabājās virs epidēmiskā sliekšņa un ir nestabila.



2026. gada 6. nedēļā uz gripas vīrusiem un RSV izmeklēti 420 klīniskie paraugi. Laboratoriski apstiprināto gripas paraugu īpatsvars 6. nedēļā samazinājās līdz 15,0%. Apstiprināti 63 *A tipa* gripas vīrusi (septiņi *A/H3*, septiņi *A/H1pdm* un 49 netipēti). Aizvadītajā nedēļā NMRL testētajos paraugos apstiprināti 12 (2,9%) RSV. Pozitīvo RSV testu īpatsvars pakāpeniski pieaug.

Monitoringa nedēļa	Izmeklēto paraugu skaits	Gripas vīrusi			Respiratori sincitiālais vīruss (RSV)	
		t.sk. pozitīvi		Pozitīvo paraugu īpatsvars	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars
		A gripa	B gripa			
40.	206	0	0	0,0%	0	0,0%
41.	250	0	0	0,0%	0	0,0%
42.	243	4	0	1,6%	0	0,0%
43.	240	1	0	0,4%	0	0,0%
44.	238	3	0	1,3%	0	0,0%
45.	240	4	0	1,7%	0	0,0%
46.	232	8	0	3,4%	1	0,4%
47.	303	16	0	5,3%	0	0,0%
48.	317	29	0	9,1%	0	0,0%
49.	332	60	0	18,1%	1	0,3%
50.	482	117	0	24,3%	0	0,0%
51.	456	77	0	16,9%	2	0,4%
52.	386	75	0	19,4%	2	0,5%
01.	382	59	0	15,4%	4	1,0%
02.	392	41	0	10,5%	6	1,5%
03.	436	77	0	17,7%	6	1,4%
04.	414	53	0	12,8%	6	1,4%
05.	454	73	1	16,3%	10	2,2%
06.	420	63	0	15,0%	12	2,9%

Monitoringa nedēļa	Izmeklēto paraugu skaits	Gripas vīrusi			Respiratori sincitiālais vīruss (RSV)	
		t.sk. pozitīvi		Pozitīvo paraugu īpatsvars	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars
		A gripa	B gripa			
Kopā	6 417	760	1	11,9%	50	0,8%

Gripas vīrusu tipēšana

Kopš sezonas sākuma NMRL apstiprināts 761 gripas vīruss, tostarp 760 *A tipa* un viens *B tipa* gripas vīruss. No apstiprinātajiem *A tipa* gripas vīrusiem 414 gadījumos noteikts apakštips, t.sk. 322 (77,8%) noteikts *A/H3* un 92 (22,2%) *A/H1pdm*. Dominējošais gripas apakštips joprojām ir *A/H3*, taču starp tipētajiem gripas vīrusiem pakāpeniski palielinās arī *A/H1pdm* gripas vīrusa īpatsvars.

Gripas vīrusi	Skaits	Īpatsvars
<i>A gripa (netipēts)</i>	346	45,5%
<i>A/H1pdm</i>	92	12,1%
<i>A/H3</i>	322	42,3%
<i>B gripa (netipēts)</i>	1	0,1%
Kopā	761	100,0%

Citu elpceļu infekciju vīrusu noteikšana

2026. gada 6. nedēļā NMRL apstiprināti astoņi citi elpceļu vīrusi, to skaitā pieci rinovīrusi. Laboratoriski apstiprināti arī koronavīrusi un paragripa.

Monitoringa nedēļa	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi							Pozitīvie paraugi kopā	
		Paragripa	Adenovīrusi	Bokavīrusi	hMPV	Enterovīrusi	Koronavīrusi	Rinovīrusi	Skaits	Īpatsvars
40.	115	3	0	0	0	0	1	23	27	23,5%
41.	144	2	1	1	0	0	0	35	39	27,1%
42.	155	9	0	0	0	0	1	28	38	24,5%
43.	134	2	2	0	0	0	1	16	21	15,7%
44.	146	4	3	1	0	0	0	27	35	24,0%
45.	145	3	3	1	0	0	2	27	36	24,8%
46.	143	4	2	0	0	0	1	16	23	16,1%
47.	176	8	0	0	0	0	0	19	27	15,3%
48.	166	3	2	0	0	0	1	26	32	19,3%
49.	150	3	2	2	0	0	1	18	26	17,3%
50.	174	3	1	5	1	0	1	10	21	12,1%
51.	186	2	5	2	0	0	4	16	29	15,6%
52.	191	1	4	1	0	0	8	18	32	16,8%
01.	163	1	2	3	1	0	4	15	26	16,0%
02.	164	1	3	5	0	0	2	18	29	17,7%
03.	152	4	2	1	1	0	0	9	17	11,2%
04.	138	1	1	1	0	0	3	13	19	13,8%
05.	196	4	6	8	2	0	14	18	52	26,5%
06.	86	1	0	0	0	0	2	5	8	9,3%
Kopā	2 924	59	39	31	5	0	46	357	537	18,4%

Bakteriālo patogēnu noteikšana

Šajā sezonā izmeklēti 2 718 paraugi *Mycoplasma pneumoniae* baktēriju noteikšanai, pozitīvo paraugu īpatsvars veido vidēji 1,3%, kas ir ievērojami mazāk nekā iepriekšējā sezonā šajā laika periodā (14,8%).

Monitoringa nedēļa	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>			<i>Chlamydia pneumoniae</i>		
	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)
40.	113	2	1,8	23	0	0,0
41.	153	2	1,3	38	0	0,0
42.	146	4	2,7	31	0	0,0
43.	138	4	2,9	27	0	0,0
44.	146	3	2,1	30	0	0,0
45.	165	3	1,8	36	0	0,0
46.	148	1	0,7	26	0	0,0
47.	185	3	1,6	38	0	0,0
48.	164	1	0,6	44	1	2,3
49.	168	3	1,8	33	0	0,0
50.	162	1	0,6	29	0	0,0
51.	37	1	2,7	37	1	2,7
52.	184	1	0,5	20	1	5,0
01.	152	1	0,7	12	0	0,0
02.	157	1	0,6	38	1	2,6
03.	137	3	2,2	34	1	2,9
04.	146	1	0,7	38	0	0,0
05.	179	0	0,0	35	0	0,0
06.	38	0	0,0	38	0	0,0
Kopā	2 718	35	1,3	607	5	0,8

COVID-19 INFEKCIJAS DATI


Latvijā datus par Covid-19 infekciju sniedz slimnīcas, laboratorijas un ģimenes ārstu prakses (Nacionālā veselības dienesta dati) un stacionārās ārstniecības iestādes, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS).

Pozitīvo testu īpatsvars un stacionēto pacientu skaits Covid-19 infekcijas gadījumos

Vasaras beigās tāpat kā iepriekšējās sezonās Latvijā un citās PVO Eiropas reģiona valstīs tika novērots Covid-19 infekcijas saslimstības pacēlums. Latvijā augstākā saslimstība reģistrēta 37. nedēļā, kad laboratoriski apstiprināto testu īpatsvars sasniedza 18,9%, pēc tam saslimstība samazinājās.


2026. gada 6. nedēļā veikti 690 testi Covid-19 apstiprināšanai, no tiem 40 (5,8%) bija pozitīvi uz SARS-CoV-2 (5. nedēļā izmeklēti 747, t.sk. pozitīvi 4,0%).

2026. gada 6. nedēļā slimnīcās uzņemti 64 Covid-19 infekcijas pacienti (iepriekšējā nedēļā – 64 pacienti). Kopā aizvadītajā nedēļā stacionāros ārstējušies 105 pacienti ar apstiprinātu Covid-19 infekciju, t.sk. ar pamata diagnozi Covid-19 bija 62 (59,0%) pacienti.



Mirušo Covid-19 pacientu skaits


2026. gada 6. nedēļā reģistrēti deviņi nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. Pēc operatīvajiem datiem kopš gada sākuma kopā reģistrēts 31 nāves gadījums. Salīdzinājumam, 2025. gadā šajā pašā laika periodā reģistrēti 23 nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju.



Covid-19 notekūdeņu monitorings¹

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR monitoringa dati rāda, ka SARS-COV-2 vīrusa RNS koncentrācija notekūdeņos vidēji Latvijā stabilizējas un mēreni pieaug, taču pilsētās tendences ir atšķirīgas. Lielākais SARS-COV-2 vīrusa RNS koncentrācijas tendences pieaugums novērojams Daugavpils, Madonas, Jelgavas un Liepājas notekūdeņos.

¹ <https://bior.lv/lv/2026-gada-zinojumi-par-rns-kopiju-izplatiba-latvija/>



PVO EIROPAS REĢIONA ELPCEĻU VĪRUSU UZRAUDZĪBA

European Respiratory Virus Surveillance Summary (ERVISS) **5. nedēļas ziņojums²**

Kopsavilkums

- Paaugstināti gripas un/vai akūtas elpceļu infekcijas rādītāji novēroti 22 no 30 PVO Eiropas reģiona valstīm, kas ziņoja datus.
- Pēc maksimālā saslimstības līmeņa sasniegšanas 52. nedēļā, reģionālie gripas monitoringa rādītāji ir samazinājušies, bet pēdējo trīs nedēļu laikā kopumā ir saglabājušies stabili paaugstinātā līmenī. Nelielā daļā valstu gripas aktivitāte turpināja pieaugt. *A(H3)* tipa gripas vīruss joprojām ir dominējošais cirkulējošais vīruss reģionā.
- Pēdējās nedēļas laikā primārās aprūpes kontrolpunktos ziņotie gripas vīrusa gadījumi ar zināmu tipu (n=1 106) galvenokārt noteikti *A* tipa gripas vīrusi. No tipētajiem *A* gripas vīrusiem (n=773) lielākā daļa piederēja *A(H3)* apakštipam (74%).
- No 33 valstīm un reģioniem, kas ziņoja par gripas intensitāti: 18 ziņoja par vidēju vai augstāku intensitāti. No 32 valstīm un reģioniem, kas ziņoja par gripas ģeogrāfisko izplatību: 29 ziņoja par reģionālu vai plašu gripas izplatību.
- Pēc nepārtraukta RSV gadījumu skaita pieauguma pēdējo trīs mēnešu laikā, ir sasniegts maksimālais RSV izplatības līmenis vai tas tuvojas maksimālajam rādītājam. Tomēr tendences dažādos reģionos atšķiras, un dažās valstīs aktivitāte joprojām pieaug. Visaugstākā saslimstība ar RSV novērojama bērniem vecumā līdz 5 gadiem.
- SARS-CoV-2 aktivitātes rādītāji reģionā saglabājas bāzes līmenī. Covid-19 mirstības rādītāji 41 valstī, kas ziņoja par datiem, joprojām bija zemi.

² <https://erviss.org/>

- Šīs nedēļas apkopotie EuroMOMO aprēķini par visu cēloņu mirstību iesaistītajās Eiropas valstīs liecina par paaugstinātu mirstības līmeni, ko nosaka mirstības pieaugums vairākās valstīs vecuma grupā virs 65 gadiem.

Elpceļu vīrusu aktivitāte

Gripas izplatības rādītāji ir paaugstināti 18 valstīs, un akūtu elpceļu infekciju rādītāji ir paaugstināti piecās valstīs (Bulgārijā, Vācijā, Lietuvā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē - Anglijā).


Pozitīvo testu īpatsvars PVO Eiropas reģiona primārās veselības aprūpes kontroluzraudzības iestādēs:

- **gripas** izplatība saglabājās virs 10% epidēmijas sliekšņa, sasniedzot 33% (iepriekšējā nedēļā – 30%). Mediānais īpatsvara rādītājs 26 valstīs bija 30% (diapazons: 0%–64%), un 19 valstīs un reģioni ziņoja par vismaz 10%.
- **SARS-CoV-2** saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī – 3%. Mediānais pozitīvo testu rādītājs 24 valstīs un reģionos bija 2% (diapazons: 0%–16%).
- **RSV** saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī – 10%. Mediānais rādītājs 23 valstīs un reģionos bija 8% (diapazons: 0%–29%).

Infekcijas smagums

Pozitīvo testu īpatsvars PVO Eiropas reģiona stacionārās veselības aprūpes kontroluzraudzības iestādēs SARI pacientiem:

- **Gripas** vīrusu īpatsvars – 26% (iepriekšējā nedēļā – 27%). Mediānais pozitīvo paraugu īpatsvars 14 valstīs, kas ziņoja datus, bija 15% (diapazons: 0%–57%). Starp SARI paraugiem šonedēļ tīklā tika ziņots par 554 gripas vīrusiem, gandrīz visi *A tipa* gripas vīrusi (99%). No 95 raksturotajiem vīrusiem 79% bija *A(H3)* un 21% bija *A(H1)pdm09*.
- **SARS-CoV-2** bija 2% (iepriekšējā nedēļā – 2%); mediānais pozitīvo testu īpatsvars 13 valstīs, kas sniedza datus bija 0% (diapazons: 0%–9%).
- **RSV** īpatsvars bija 16% (iepriekšējā nedēļā – 15%); mediānais pozitīvo testu īpatsvars 13 valstīs, kas sniedza datus bija 25% (diapazons: 0%–30%).
- No 14 valstīm vai reģioniem, kas ziņoja datus par slimnīcās uzņemtajiem gripas pacientiem vai intensīvās terapijas nodaļās uzņemtajiem pacientiem ārpus kontroluzraudzības sistēmas
 - o divas valstis ziņoja par hospitalizācijas gadījumu skaita samazināšanos (Īrija un Slovākija),
 - o viena valsts ziņoja par hospitalizācijas gadījumu skaita pieaugumu (Lietuva),
 - o divas valstis ziņoja par intensīvās terapijas nodaļās uzņemto pacientu skaita samazināšanos (Čehija un Francija),
 - o viena valsts ziņoja par intensīvās terapijas nodaļās uzņemto pacientu skaita pieaugumu (Lietuva).



Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra riska novērtējums pieaugošai A(H3N2) apakšklades K cirkulācijai ES/EEZ valstīs³

Saistībā ar neparasti agru gripas izplatības sākumu un pieaugošu A(H3N2) apakšklades K cirkulāciju Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (turpmāk – ES/EEZ) valstīs Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – ECDC) publicējis riska novērtējumu. Gripas izplatība šajā sezonā sākusies neparasti agri, dominējot A tipa gripas vīrusiem un A(H3N2) apakštipam.

Gandrīz puse no visām ES/EEZ valstu ziņotajām sekvencēm “GISAID” starptautiskajā vīrusu genoma datubāzē laika posmā no 2025. gada maija līdz novembrim atbilst A(H3N2) vīrusa K apakškladei. Filoģenētiskā, antigēniskā un seroloģiskā analīze liecina par būtisku K apakšklades atšķirību no Ziemeļu puslodes A(H3N2) vakcīnas celma.

Pēdējās sezonās A(H3N2) nav bijis dominējošais gripas vīrusa apakštīps, kas varētu norādīt uz zemāku populācijas imunitāti, tomēr seroloģiskie dati pašlaik nav pieejami, lai to pilnībā novērtētu. Austrumāzijas valstīs, kurās šobrīd tiek ziņots par A(H3N2) epidēmijas mazināšanos, līdz šim nav novēroti neparasti smagi slimības gadījumi, un cirkulējošie K apakšklades celmi šajās valstīs neatšķiras no tiem, kas konstatēti ES/EEZ valstīs. Pat ja šajā ziemā dominēs vīruss ar vājāku atbilstību vakcīnai, vakcīna joprojām tiek uzskatīta par būtisku profilakses instrumentu, jo paredzams, ka tā nodrošinās zināmu aizsardzību pret smagu slimības gaitu.

Pamatojoties uz pašlaik pieejamo informāciju, ECDC vērtē gripas radīto risku kā vidēju vispārējai populācijai un augstu – personām ar paaugstinātu smagas slimības gaitas risku (seniori, personas ar hroniskām vielmaiņas, plaušu, sirds un asinsvadu, neiromuskulārām un citām slimībām, grūtnieces, imūnsupresētas personas, kā arī cilvēki, kas dzīvo slēgtās kopienās, piemēram, ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs).

ECDC rekomendē:

- neatlikt sezonālo vakcināciju pret gripu riska grupas personām;
- savlaicīgu pretvīrusu līdzekļu lietošanu pacientiem ar gripas simptomiem, lai samazinātu komplikāciju un slimības progresēšanas risku pacientu grupās ar augstāku smagas slimības risku;

³ <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Threat%20Assessment%20Brief%20-%20Assessing%20the%20risk%20of%20increasing%20circulation%20of%20A%28H3N2%29%20subclade%20K.pdf>

- pārskatīt un aktualizēt ārstniecības iestāžu rīcības plānus par darbu gripas epidēmijas laikā un gripas epidēmijas draudu gadījumā, lai mazinātu spiedienu uz veselības aprūpes sistēmu gripas sezonas laikā;
- personālam un apmeklētājiem slimnīcās un ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs lietot sejas maskas periodos, kad pastiprināti cirkulē elpceļu vīrusi.

***Pasaules Veselības organizācijas Globālā gripas uzraudzības tīkla
2026. gada 4. februāra 563. ziņojums⁴***

Pasaulē gripas aktivitāte pēdējo trīs nedēļu laikā turpināja samazināties, bet saglabājās paaugstināta, un 2026. gada 4. nedēļā pozitīvo testu īpatsvars bija aptuveni 15%. SARS-CoV-2 aktivitāte kopumā saglabājās zema. Gripa bija dominējošā infekcija, un pozitīvo paraugu īpatsvars mērenajā, subtropu un tropu joslā Ziemeļu puslodē bija aptuveni 15%. Dienvidu puslodes mērenajā un subtropu joslā gan SARS-CoV-2 gan gripas pozitīvo paraugu īpatsvars bija zems.

Gripa

Ziemeļu puslodē gripas pozitīvo paraugu īpatsvars bija paaugstināts (>10%) Ziemeļamerikas un Rietumāfrikas valstīs. Pozitīvo gripas paraugu īpatsvars pārsniedza 30% Centrālamerikas un Karību jūras reģiona, tropiskās Dienvidamerikas, Ziemeļāfrikas, Eiropas un Āzijas valstīs (izņemot Centrālāziju). Aktivitātes pieaugums tika novērots Centrālamerikas un Karību jūras reģiona, tropiskās Dienvidamerikas, Rietumāfrikas un Dienvidrietumu un Austrumeiropas valstīs.

Dienvidu puslodē gripas aktivitāte kopumā saglabājās zema, lai gan paaugstināts pozitīvo paraugu īpatsvars (>10%) tika ziņots atsevišķās valstīs tropiskajā Dienvidamerikā, Austrumāfrikā un Dienvidaustrumāzijā. Pozitīvo gripas paraugu īpatsvars pārsniedza 30% atsevišķās valstīs mērenajā Dienvidamerikā un Okeānijā. Neliels aktivitātes pieaugums tika novērots vienā Dienvidamerikas mērenās joslas valstī.

Zonās ar paaugstinātu gripas īpatsvaru pārsvarā dominēja *A(H3N2)* gripas vīruss, izņemot Centrālameriku, Karību jūras reģionu un tropisko Dienvidameriku, kur novērota vienlīdzīga *A(H1N1)pdm09* un *A(H3N2)* izplatība, un Austrumāfriku, kur novērota vienlīdzīga *A(H1N1)pdm09*, *A(H3N2)* un *B* tipa gripas vīrusu cirkulācija.

SARS-CoV-2

Globāli SARS-CoV-2 izplatība saglabājās stabilā un zemā līmenī, tomēr par paaugstinātu pozitīvo paraugu īpatsvaru (>10%) ziņoja atsevišķas valstis mērenajā Dienvidamerikā un Dienvidrietumu Eiropā.

Respiratori sincitiālais vīruss (RSV)

RSV aktivitāte kopumā bija stabila un zema, lai gan paaugstināts pozitīvo testu īpatsvars (>10%) tika ziņots atsevišķās valstīs Centrālamerikā un Karību jūras reģionā, Rietumāfrikā, Ziemeļeiropā un Dienvidrietumu Eiropā un Rietumāzijā. Par RSV aktivitātes pieaugumu ziņoja atsevišķās valstīs Centrālamerikā, Karību jūras reģionā un Dienvidrietumu Eiropā. RSV un gripas vienlaicīgi paaugstināta aktivitāte novērota atsevišķās valstīs Centrālamerikā un Karību jūras reģionā, Rietumāfrikā, Ziemeļeiropā un Dienvidrietumu Eiropā un Rietumāzijā.

***PVO Konsultatīvās sanāksmes 2025. gada 28. februāra ziņojums par gripas vakcīnas sastāvu
2025.–2026. gada sezonai Ziemeļu puslodē⁵***

⁴ <https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity--weekly-update-n--563>

⁵ <https://www.who.int/publications/m/item/recommended-composition-of-influenza-virus-vaccines-for-use-in-the-2025-2026-nh-influenza-season>

2025. gada 28. februārī notikušajā PVO Konsultatīvā sanāksmē tika apstiprināts vakcīnu sastāvs 2025. – 2026. gada sezonai Ziemeļu puslodē.

PVO iesaka izmantot trīsvērtīgas vakcīnas 2025. – 2026. gada gripas sezonā:

Vakcīnās, kuru ražošanā tiek izmantotas olas, jābūt šādiem komponentiem:

- *A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09* – līdzīgs vīruss;
- *A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)* – līdzīgs vīruss;
- *B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria līnija)* – līdzīgs vīruss

Vakcīnās, kas tiek ražotas, izmantojot šūnas, jeb rekombinantās vakcīnās, jāiekļauj:

- *A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09* – līdzīgs vīruss;
- *A/District of Columbia/27/2023 (H3N2)* – līdzīgs vīruss;
- *B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria līnija)* – līdzīgs vīruss

PVO iesaka, izmantojot četrvērtīgas vakcīnas (šūnas jeb rekombinantās vakcīnās vai vakcīnas, kuru ražošanā tiek izmantotas olas) 2025. – 2026. gada gripas sezonā, kā *B/Yamagata* līnija komponentu iekļaut:

- *B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata līnija)* – līdzīgs vīruss.

PAR GRIPAS UN CITU ELPCEĻU INFEKCIJU MONITORINGU

2025. – 2026. gada sezonā monitoringā ir iesaistītas 44 ĢĀP desmit administratīvajās teritorijās – Liepāja, Ventspils (Kurzeme), Daugavpils, Rēzekne (Latgale), Jūrmala (Pierīga), Valmieras novads, Gulbenes novads (Vidzeme), Jēkabpils novads, Jelgava (Zemgale) un Rīga.

Kopējais reģistrēto pacientu skaits atlasītajās ĢĀP – 70 973 jeb 3,8% no Latvijas iedzīvotāju populācijas un 7,0% no monitoringa populācijas. ĢĀP katru nedēļu sniedz datus par pacientu skaitu, kas vērsušies pēc medicīniskās palīdzības ārsta praksē gripas, citu AEI un pneimoniju gadījumos, norādot pacientu skaitu pa vecuma grupām: 0-4, 5-14, 15-64 un 65 gadi un vairāk. Pēc ĢĀP sniegtās informācijas tiek aprēķināta gripas izplatības intensitāte pa teritorijām un pa vecuma grupām.

Lai novērtētu sezonālās gripas epidēmijas smagumu, katru sezonu monitoringā tiek iesaistītas slimnīcas visās administratīvajās teritorijās. Šajā sezonā ir iesaistītas 10 slimnīcas astoņās pilsētās: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA “Rēzeknes slimnīca”, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. Slimnīcas katru nedēļu, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS), ziņo par kopējo stacionēto pacientu skaitu pa vecuma grupām, kopējo un intensīvās terapijas nodaļā (ITN) stacionēto pacientu skaitu ar smagu akūtu respiratoru infekciju (turpmāk – SARI) pa vecuma grupām, SARI mirušo skaitu pa vecuma grupām un SARI pacientu skaitu, kas testēti uz gripu, Covid-19 un respiratori sincitiālo vīrusu (RSV), t.sk. pozitīvos gadījumus pa vecuma grupām.

Monitoringā tiek iekļautas vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes visās 10 administratīvajās teritorijās, kas katru nedēļu informē par iestāžu apmeklētību ceturtdien. 2025.-2026. gada sezonā tiks iesaistītas 30 skolas, kurās mācās 19 902 skolēni un 32 pirmsskolas izglītības iestādes, kuras apmeklē 4 935 bērni.

Mikrobioloģijas dati par cirkulējošiem elpceļu vīrusiem un baktērijām tiek saņemti no NMRL. Pārskatā tiek iekļauta informācija par izmeklēto klīnisko paraugu skaitu, kas tiek izmeklēti NMRL ar polimerāzes ķēdes reakcijas (RL-PKĶR) un Multiplex metodi elpceļu vīrusu noteikšanai. NMRL paraugi tiek saņemti no Rīgas stacionārajām ārstniecības iestādēm, no reģionālajām slimnīcām, kā arī no citām, t.sk. ambulatorajām iestādēm.

Materiālu sagatavoja: SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vecākā epidemioloģe Karīna Venediktova.

2025. – 2026. gada sezonas AEI un gripas monitoringa 2026. gada 6. nedēļā datus sniedza:

- 43 ģimenes ārstu prakses (reģistrēto pacientu skaits 69 434 jeb 6,9% no iedzīvotāju skaita monitoringa iekļautajās pilsētās; 3,7% no Latvijas iedzīvotāju skaita);
 - 10 stacionārās ārstniecības iestādes;
 - 30 vispārējās izglītības iestādes un 32 pirmsskolas izglītības iestādes.
- Izmantoti SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas dati un Valsts zinātniskais institūts "BIOR", Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Rīgas Tehniskās universitātes notekūdeņu monitoringa dati.

Pateicamies visiem monitoringa dalībniekiem par sniegto informāciju.

Datu pārpublicēšana un citēšana – atsauce uz Slimību profilakses un kontroles centra “Epidemioloģijas biļetenu” ir obligāta.