



Slimību profilakses un kontroles centrs

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, fakss 67501591, e-pasts pasts@spkc.gov.lv

EPIDEMIOLOĢIJAS BIĻETENS

Nr. 19 (1991)

2026. gada 22. aprīlī

Gripa un citas akūtas elpceļu infekcijas 2025. – 2026. gada sezonā

Saturs

KOPSAVILKUMS PAR 2026. GADA 16. NEDĒĻU.....	1
GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS	3
STACIONĒTIE PACIENTI SARI GADĪJUMOS.....	6
VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒTĪBA.....	9
GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI.....	10
MIKROBIOLOĢIJAS DATI	11
COVID-19 INFEKCIJAS DATI	14
PVO EIROPAS REĢIONA ELPCEĻU VĪRUSU UZRAUDZĪBA	17
PAR GRIPAS UN CITU ELPCEĻU INFEKCIJU MONITORINGU.....	20

KOPSAVILKUMS PAR 2026. GADA 16. NEDĒĻU

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumu Nr. 948 „Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem”¹ 6.5.2. punktu un, pamatojoties uz 2026. gada 11. – 13. nedēļas monitoringa datiem, Slimību profilakses un kontroles centrs **paziņo par gripas epidēmijas beigām no 2026. gada 31. marta.**

2026. gada 16. nedēļā (13.04. – 19.04.) gripas monitoringā iesaistītajās ģimenes ārstu praksēs pacientu īpatsvars ar elpceļu infekcijām veido 11% no kopējā pie ārsta vērsušos pacientu skaita. Monitoringa dati liecina, ka saslimstība ar gripu un citām akūtām elpceļu infekcijām (AEI) vidēji valstī saglabājas zemā līmenī.

Saslimstība ar gripu aizvadītajā nedēļā nedaudz pieauga salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Monitoringā iekļautajās ambulatorās aprūpes iestādēs apstiprināti septiņi gripas gadījumi jeb 10,1 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem (15. nedēļā – 7,2 uz 100 000 iedz.). Gripas gadījumi reģistrēti divās no desmit monitoringā iekļautajām teritorijām.

Saslimstība ar citām AEI nedaudz samazinājās par 4,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, reģistrēti 940,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem (15. nedēļā – 983,7 uz 100 000 iedz.).

Pneimoniju gadījumos vērsušos pacientu skaits ambulatorajās iestādēs samazinājās par 25% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Reģistrēti 17,3 pneimoniju gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem (15. nedēļā – 23,0 uz 100 000 iedz.).

Monitoringā iekļautajās stacionārajās ārstniecības iestādēs 2026. gada 16. nedēļā stacionēto pacientu skaits smagas akūtas respiratoras infekcijas (SARI) gadījumos nedaudz palielinājies – stacionēti 159 pacienti ar SARI. 2026. gada 16. nedēļā no testētajiem SARI pacientiem 1,9% gadījumu apstiprināta gripa, 0,3% apstiprināta Covid-19 infekcija un 21,9% pacientiem noteikts respiratori sincitiālais vīruss (RSV).

¹ „Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem” <https://likumi.lv/ta/id/148626-noteikumi-par-gripas-pretepidemijas-pasakumiem>

Aizvadītajā nedēļā nav saņemti paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju.

SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā apstiprināto gripas paraugu nedaudz palielinājies. Aizvadītajā nedēļā gripas vīrusu noteikšanai izmeklēti 246 klīniskie paraugi, no tiem septiņos jeb 2,8% gadījumos apstiprināti *A tipa* gripas vīrusi (iepriekšējā nedēļā – 1,6%). Apstiprināto RSV paraugu īpatsvars, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, nav mainījies – 6,9% (iepriekšējā nedēļā – 6,8%).

2026. gada 16. nedēļā Covid-19 infekcijas vīrusa pozitīvo paraugu īpatsvars no kopā izmeklētajiem paraugiem veido 1,6% (iepriekšējā nedēļā – 1,6%). Kopš 2025. gada 47. nedēļas pozitīvo paraugu īpatsvars nepārsniedz 7,5%.

Galvenie akūtu elpceļu infekciju monitoringa rādītāji pēdējo trīs nedēļu laikā

*Ambulatorās veselības aprūpes iestāžu monitoringa rādītāji**

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2026. gada nedēļa		
	14.	15.	16.
Pacientu ar elpceļu infekciju simptomiem īpatsvars no kopējā ambulatoro apmeklējumu skaita	13%	14%	11%
AEI gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	878,6	983,7	940,5
Gripas gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	19,1	7,2	10,1
Pneimoniju gadījumu skaits uz 100 000 iedz.	36,7	23,0	17,3

*Monitoringā iekļautās ambulatorās ārstniecības iestādes.

Stacionāro ārstniecības iestāžu monitoringa rādītāji

Monitoringa rādītājs	2026. gada nedēļa		
	14.	15.	16.
SARI stacionēto pacientu skaits*	156	140	159
SARI īpatsvars no kopējā uzņemto pacientu skaita*	4,2%	3,3%	3,6%
Covid-19 stacionēto pacientu skaits**	6	3	4
Nāves gadījumu skaits Covid-19 pacientiem**	1	0	0
Nāves gadījumu skaits gripas pacientiem***	2	1	0

*Monitoringā iekļauto 10 stacionāro ārstniecības iestāžu dati

**Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmas (SAIRIS) dati (23 slimnīcas)

***Saņemto paziņojumu skaits (MK noteikumu Nr. 948 2. pielikums)

Laboratoriju monitoringa rādītāji

Monitoringa rādītājs	2026. gada nedēļa		
	14.	15.	16.
Gripas pozitīvo paraugu īpatsvars*	2,6%	1,6%	2,8%
RSV pozitīvo paraugu īpatsvars*	12,9%	6,8%	6,9%
SARS-CoV-2 pozitīvo paraugu īpatsvars**	2,3%	1,6%	1,6%

*SIA RAKUS NMRL dati

**Nacionālā veselības dienesta datu centralizētās sistēmas (DCS) dati

*Izglītības iestāžu monitoringa rādītāji**

Epidemioloģiskās situācijas monitoringa rādītājs	2026. gada nedēļa		
	14.	15.	16.
Vidējais vispārējās izglītības iestāžu apmeklējuma īpatsvars	89,2%	91,7%	92,8%
Vidējais pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējuma īpatsvars	72,9%	79,4%	83,0%

*Monitoringā iesaistīto izglītības iestāžu dati


GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS

2026. gada 16. nedēļā informācija par pacientu skaitu, kas vērsušies ambulatorajās ārstniecības iestādēs akūtu elpceļu infekciju gadījumos, saņemta no 43 ģimenes ārstu praksēm (turpmāk – ĢĀP). Pacientu īpatsvars ar elpceļu infekcijām ambulatorajās iestādēs veido 11% no kopējā vērsušos pacientu skaita (iepriekšējā nedēļā – 14%).

Gripas intensitāte 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās


Latvijā šajā sezonā gripas izplatība sākusies agrāk nekā iepriekšējās sezonās. Sākot ar 2025. gada 48. nedēļu vidējā gripas izplatības intensitāte strauji pieauga, augstāko rādītāju sasniedzot 51. nedēļā (795,0 uz 100 000 iedz.), kas pārsniedza iepriekšējo sezonu maksimālo gripas intensitāti. Sākot ar 6. nedēļu saslimstība ar gripu pakāpeniski samazinās.

Aizvadītajā nedēļā monitoringā iesaistītajās ĢĀP reģistrēti septiņi klīniski apstiprināti gripas gadījumi (10,1 uz 100 000 iedz.).





Gripa atsevišķās vecuma grupās

Tāpat kā iepriekšējās sezonās augstāka saslimstība ar gripu reģistrēta bērniem vecuma grupās 0–4 gadi un 5–14 gadi. No visiem 16. nedēļā reģistrētajiem gripas gadījumiem četri bija vecuma grupā 5-14 gadi, divi vecuma grupā 15–64 gadi un viens vecuma grupā 0-4 gadi.




Gripa monitoringa teritorijās 2024.–2025. un 2025.–2026. gada sezonā

2026. gada 16. nedēļā gripas gadījumi reģistrēti divās no desmit monitoringa teritorijām: Jelgavā apstiprināti četri gripas gadījumi (130,3 uz 100 000 iedzīvotājiem) un Rīgā apstiprināti trīs gripas gadījumi (10,4 uz 100 000 iedzīvotājiem).




Akūtas elpceļu infekcijas 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās

Vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs citu AEI gadījumos 16. nedēļā nedaudz samazinājās par 4,4% līdz 940,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem (15. nedēļā – 983,7 uz 100 000 iedz.). Saslimstība ar AEI nepārsniedz iepriekšējo piecu sezonu vidējo līmeni.




Akūtu elpceļu infekcijas atsevišķās vecuma grupās

Augstāka saslimstība ar AEI tāpat kā iepriekšējās sezonās reģistrēta bērniem vecumā līdz 14 gadiem, īpaši maziem bērniem vecuma grupā 0–4 gadi. 2026. gada 16. nedēļā, saslimstība ar AEI samazinājās paaugstinājās bērnu vidū, bet pārējās vecuma grupās nedaudz samazinājās. Visvairāk saslimstība samazinājās vecuma grupā 65 un vairāk gadi (321,3 uz 100 000 iedzīvotājiem).




Pneimonijas 2025.–2026. gadā un iepriekšējās sezonās

Kopš monitoringa 6. nedēļas vēršanās ambulatorajās iestādēs pneimoniju gadījumos pakāpeniski samazinās. 2026. gada 15. nedēļā saslimstība ar pneimonijām samazinājās – reģistrēti 17,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem (iepriekšējā nedēļā – 23,0 uz 100 000 iedz.). Kopš sezonas sākuma saslimstība ar pneimonijām ir vidēji trīs reizes zemāka nekā iepriekšējā sezonā attiecīgajā laika periodā, kad tā bija saistīta ar augstu *Mycoplasma pneumoniae* izplatību.



Pneimonijas atsevišķās vecuma grupās

Augstākā saslimstība ar pneimonijām tāpat kā iepriekšējās sezonās tiek reģistrēta bērniem. 2026. gada 16. nedēļā saslimstība ar pneimonijām 5-14, 15-64 un 65+ gadu vecuma grupās, taču paaugstinājās 0-4 gadu vecuma grupā (100,1 uz 100 000 iedz.).




STACIONĒTIE PACIENTI SMAGU AKŪTU RESPIRATORO INFEKCIJU (SARI) GADĪJUMOS

Stacionētie SARI pacienti 2025.–2026. gada sezonā


Par stacionētajiem pacientiem SARI gadījumos un to testēšanu ziņo 10 stacionārās aprūpes iestādes, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS).

2026. gada 16. nedēļā slimnīcās uzņemto SARI pacientu skaits nedaudz palielinājies. Nedēļas laikā uzņemti 159 SARI pacienti (3,6% no kopā stacionētajiem pacientiem), no tiem 9 (5,7%) tika ievietoti intensīvās terapijas nodaļās (ITN).




Stacionēti SARI pacienti pa vecuma grupām

2026. gada 16. nedēļā stacionēto SARI pacientu skaits palielinājās vecuma grupā 0-4 un 65+ gadu vecuma grupās. Savukārt, pārējās vecuma grupās stacionēto SARI pacientu skaits samazinājās vai saglabājās aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī. Lielākais īpatsvars no visiem stacionētajiem SARI pacientiem bija vecumā no 65 gadiem (46,5%).




Stacionāros uzņemto pacientu testēšana uz gripu

2026. gada 16. nedēļā stacionārās veselības aprūpes iestādēs uz gripu testēti 359 pacienti, tostarp 7 gadījumos (1,9%) apstiprināta gripa. Noteikti 7 A tipa gripas vīrusi. Iepriekšējā 15. nedēļā gripa apstiprināta 20 (4,3 %) stacionāros testētajiem SARI pacientiem.




Stacionāros uzņemto pacientu testēšana uz Covid-19

Covid-19 infekcijas pozitīvo testu īpatsvars stacionāros nedaudz samazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Uz SARS-CoV-2 laboratoriski izmeklēti 342 pacienti, no tiem vienam (0,3%) pacientam apstiprināta Covid-19 infekcija.



Stacionāros uzņemto pacientu testēšana uz RSV

Kopš 2026. gada 4. nedēļas RSV infekcijas pozitīvo testu īpatsvars stacionāros strauji palielinājies. Iepriekšējā, 16. nedēļā RSV infekcijas pozitīvo testu īpatsvars nedaudz pieauga līdz 21,9% – izmeklēti 114 stacionārie pacienti, RSV infekcija apstiprināta 25 pacientiem (15. nedēļā – 19,5%). Aptuveni trešā daļa (30,6%) RSV apstiprināti bērniem 0–4 gadu vecuma grupā, taču saslimšanas gadījumi vērojami arī pārējās vecuma grupās.



VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒTĪBA

Vispārējās izglītības iestādēs 2026. gada 16. nedēļā (ceturtdien) apmeklētība palielinājās (92,8%). Zemākā apmeklētība reģistrēta Rēzeknē (89,2%).

Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto skolēnu skaita (%)										
	Liepāja	Ventspils	Daugavpils	Rēzekne	Valmieras novads	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils novads	Jūrmala	Rīga	Vidēji
40.	94,8	92,9	93,3	82,5	97,8	95,4	99,0	97,6	91,9	91,7	93,1
41.	93,3	92,6	93,6	91,6	96,7	92,3	96,9	92,7	92,3	89,2	91,9
42.	93,5	92,3	94,3	92,8	94,2	93,1	93,2	93,3	90,5	84,2	90,0
43.	Brīvdienas										
44.	93,4	94,7	94,6	91,8	99,3	94,4	95,9	93,5	92,9	94,8	94,5
45.	92,8	86,1	94,9	90,6	98,5	94,9	95,6	95,6	96,3	96,4	93,6
46.	91,2	91,1	93,5	92,4	92,4	94,2	93,5	92,3	92,5	88,2	90,8
47.	94,1	90,3	92,9	90,4	92,5	92,8	93,8	94,7	91,6	86,1	90,1
48.	92,8	91,0	93,6	89,6	91,4	92,5	91,5	93,7	92,0	78,7	87,7
49.	92,5	89,0	92,5	91,8	82,0	91,7	97,7	94,9	89,5	84,9	88,9
50.	92,3	85,7	91,2	88,8	81,5	86,4	69,1	91,6	89,0	82,8	85,6
51.	91,9	84,7	91,7	83,3	85,1	87,0	96,1	85,5	87,6	82,7	86,3
52.	Brīvdienas										
01.	Brīvdienas										
02.	92,1	92,1	93,7	91,2	94,4	89,8	84,2	89,2	87,4	89,3	90,5
03.	90,5	91,2	92,2	89,6	91,7	92,7	94,6	87,7	91,5	87,7	90,1
04.	91,0	90,0	87,7	87,8	90,7	90,3	92,4	85,0	88,2	86,0	88,2
05.	87,7	87,5	88,7	86,9	90,0	88,7	92,2	88,4	88,1	85,0	87,2
06.	92,3	85,6	85,8	88,0	89,7	86,1	88,4	78,7	90,3	85,4	86,6
07.	91,2	86,0	87,6	89,4	73,6	89,5	90,4	89,4	90,5	84,3	86,6
08.	90,7	85,4	92,4	87,6	89,2	88,8	92,9	85,8	91,6	88,1	88,8
09.	91,6	88,9	91,0	88,0	90,7	88,1	88,1	84,5	91,1	85,4	88,1
10.	87,6	90,2	93,7	89,4	91,2	93,9	92,3	94,0	88,9	85,5	89,0
11.	Brīvlaiks										
12.	92,2	91,1	95,1	90,0	89,3	94,5	95,0	93,7	89,8	88,7	91,1
13.	93,8	91,3	92,4	91,2	94,9	93,7	93,5	92,3	91,4	88,3	91,0
14.	92,2	90,7	92,2	89,6	91,7	95,9	91,6	88,9	90,3	84,9	89,2
15.	93,5	92,3	92,9	92,8	94,9	93,1	95,5	92,2	91,4	89,4	91,7
16.	94,0	93,5	95,0	89,2	100,0	93,2	96,7	94,4	92,5	90,0	92,8
Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu (±)	0.5	1.1	2.1	-3.6	5.1	0.1	1.2	2.2	1.1	0.6	1.1


Pirmsskolas izglītības iestādēs 2026. gada 16. nedēļā (ceturtdien) apmeklēja vairāk bērnu – 83,0% bērnu, nekā iepriekšējā nedēļā. Zemākā apmeklētība reģistrēta Jēkabpils novadā (63,3%).

Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto bērnu skaita (%)										
	Liepāja	Ventspils	Daugavpils	Rēzekne	Valmieras novads	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils novads	Jūrmala	Rīga	Vidēji
40.	62,7	69,2	68,7	69,7	67,1	73,0	76,5	55,1	70,5	75,3	70,7
41.	61,7	71,1	73,2	71,1	69,5	66,1	72,1	59,2	72,8	71,7	70,6
42.	81,0	70,2	69,6	75,0	68,1	72,2	74,3	68,4	68,0	73,5	71,9
43.	70,8	59,4	71,8	67,1	53,5	64,3	62,4	39,8	66,0	65,1	63,6
44.	78,9	71,7	75,3	78,9	66,7	69,6	61,9	70,4	74,0	78,3	74,2
45.	80,7	74,7	78,0	77,6	71,4	73,0	76,5	72,4	76,5	76,1	76,0
46.	77,1	72,3	76,7	63,2	74,2	70,4	81,9	67,3	81,3	78,8	76,1

Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto bērnu skaita (%)										
	Liepāja	Ventspils	Daugavpils	Rēzekne	Valmieras novads	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils novads	Jūrmala	Rīga	Vidēji
47.	78,3	72,4	75,7	68,4	70,9	66,1	75,2	70,4	77,8	77,1	74,9
48.	75,6	74,8	76,7	76,3	69,5	71,3	69,5	78,6	77,5	71,8	73,9
49.	76,8	71,4	75,7	72,4	65,7	78,3	62,4	74,5	71,5	74,3	72,7
50.	80,1	61,6	70,0	73,7	53,5	73,9	68,1	76,5	69,8	73,7	68,9
51.	70,8	59,4	71,8	67,1	53,5	64,3	62,4	39,8	66,0	66,1	63,9
52.	Brīvdienas										
01.	Brīvdienas										
02.	84,6	79,6	78,5	80,3	77,0	78,3	77,4	77,6	78,8	78,0	79,0
03.	81,6	77,1	67,5	63,2	73,2	60,9	73,5	78,6	75,0	77,5	75,4
04.	86,7	70,2	69,8	71,1	70,0	47,0	75,7	72,4	66,0	73,6	71,7
05.	69,6	67,8	60,9	67,1	64,3	66,1	70,8	67,3	71,8	70,5	68,2
06.	59,9	67,5	56,8	67,1	60,6	66,1	67,3	60,2	66,0	70,2	66,0
07.	73,8	69,4	70,9	71,1	67,1	70,4	71,7	75,5	71,8	71,7	71,0
08.	82,1	71,0	74,8	64,5	76,1	72,2	69,5	74,5	72,6	71,0	72,3
09.	74,1	71,0	71,6	76,3	76,1	60,0	64,6	70,4	65,5	72,4	71,0
10.	69,0	71,5	80,8	76,3	67,6	58,3	63,7	72,4	73,3	73,0	72,3
11.	60,2	61,4	76,2	63,2	67,1	49,6	57,1	32,7	74,8	69,3	65,7
12.	77,4	74,4	83,7	71,1	70,0	66,1	71,2	71,4	83,5	75,0	75,9
13.	79,8	75,4	84,9	72,4	70,0	78,3	65,0	70,4	81,0	73,0	75,7
14.	75,9	67,8	76,7	72,4	74,6	77,4	73,0	67,3	74,0	75,0	72,9
15.	79,8	79,7	83,5	77,6	73,7	73,9	75,2	73,5	80,5	79,7	79,4
16.	80,1	95,5	79,6	69,7	76,1	70,4	72,1	63,3	80,5	79,8	83,0
Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu (±)	0.3	15.9	-3.9	-7.9	2.3	-3.5	-3.1	-10.2	0.0	0.1	3.6

GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI


2026. gada 16. nedēļā nav saņemti paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju. Kopš monitoringa sezonas sākuma kopā saņemts 51 paziņojums par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju. Gandrīz visi pacienti bijuši ar vairākām hroniskām blakus slimībām (sirds un asinsvadu slimības, elpceļu slimības, onkoloģiskas slimības, imūnsupresija, hroniskas aknu, nieru slimības, nervu sistēmas slimības, cukura diabēts, adipozitāte, citi riska faktori). No 51 mirušā pacienta 46 (90,2%) pacienti šajā sezonā nav bijuši vakcināti pret gripu. Iepriekšējās divās sezonās kopā reģistrēti, attiecīgi 106 un 146 nāves gadījumi.



MIKROBIOLOĢIJAS DATI

Gripas A tipa un B tipa vīrusu un RSV noteikšana klīniskajos paraugos

Gripas izplatības pacēlums novērojams agrāk nekā iepriekšējās sezonās. Gripas pozitīvo paraugu īpatsvara pacēlums novērots sākot no 46. nedēļas. Augstākais šis rādītājs reģistrēts 2025. gada 50. nedēļā (24,3%). 2026. gada sākumā gripas intensitāte saglabājas virs epidēmijas sliekšņa, bet sākot ar 11. nedēļu pakāpeniski samazinās un nepārsniedz 10%.



2026. gada 16. nedēļā uz gripas vīrusiem un RSV izmeklēti 246 paraugi. Laboratoriski apstiprināto gripas paraugu īpatsvars 16. nedēļā palielinājās līdz 2,8%. Apstiprināti septiņi *A tipa* gripas vīrusi. Pozitīvo RSV paraugu īpatsvars aizvadītajā nedēļā būtiski nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu - 6,9%.

Monitoringa nedēļa	Izmeklēto paraugu skaits	Gripas vīrusi			Respiratori sincitiālais vīruss (RSV)	
		t.sk. pozitīvi		Pozitīvo paraugu īpatsvars	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars
		A gripa	B gripa			
40.	206	0	0	0,0%	0	0,0%
41.	250	0	0	0,0%	0	0,0%
42.	243	4	0	1,6%	0	0,0%
43.	240	1	0	0,4%	0	0,0%
44.	238	3	0	1,3%	0	0,0%
45.	240	4	0	1,7%	0	0,0%
46.	232	8	0	3,4%	1	0,4%
47.	303	16	0	5,3%	0	0,0%
48.	317	29	0	9,1%	0	0,0%
49.	332	60	0	18,1%	1	0,3%
50.	482	117	0	24,3%	0	0,0%
51.	456	77	0	16,9%	2	0,4%
52.	386	75	0	19,4%	2	0,5%
01.	382	59	0	15,4%	4	1,0%
02.	392	41	0	10,5%	6	1,5%
03.	436	77	0	17,7%	6	1,4%
04.	414	53	0	12,8%	6	1,4%
05.	454	73	1	16,3%	10	2,2%
06.	419	62	0	14,8%	12	2,9%
07.	388	58	0	14,9%	13	3,4%
08.	428	64	0	15,0%	20	4,7%
09.	469	58	0	12,4%	22	4,7%
10.	348	53	1	15,5%	25	7,2%
11.	386	35	2	9,6%	29	7,5%
12.	354	12	1	3,7%	31	8,8%
13.	332	8	1	2,7%	43	13,0%
14.	271	6	1	2,6%	35	12,9%
15.	249	4	0	1,6%	17	6,8%
16.	246	7	0	2,8%	17	6,9%
Kopā	9886	1063	7	10,8%	302	3,1%

Gripas vīrusu tipēšana

Kopš sezonas sākuma NMRL apstiprināti 1 070 gripas vīrusi, tostarp 1 063 *A tipa* un septiņi *B tipa* gripas vīrusi. No apstiprinātajiem *A tipa* gripas vīrusiem 485 gadījumos noteikts apakštips, t.sk. 346 (71,3%) noteikts *A/H3* un 139 (28,7%) *A/H1pdm*. Visi apstiprinātie *B tipa* gripas vīrusi piederēja *B/Victoria* apakšlīnijai. Šajā sezonā dominējošais gripas vīruss ir *A/H3*, taču sezonas otrajā pusē pakāpeniski palielinājies apstiprināto *A/H1pdm* gripas vīrusu īpatsvars.

2026. gada 16. nedēļā apstiprinātajiem gripas vīrusiem apakštips nav noteikts.

Gripas vīrusi	Skaits	Īpatsvars
<i>A gripa</i> (netipēts)	578	54,0%
<i>A/H1pdm</i>	139	13,0%
<i>A/H3</i>	346	32,3%
<i>B/Victoria</i>	7	0,7%
Kopā	1 070	100,0%

Citu elpceļu infekciju vīrusu noteikšana

2026. gada 16. nedēļā NMRL apstiprināti arī citi elpceļu vīrusi (7), to skaitā rinovīrusi, cilvēka metapneimovīrusi (hMPV) un adenovīrusi.

Monitoringa nedēļa	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi							Pozitīvie paraugi kopā	
		Paragripa	Adenovīrusi	Bokavīrusi	hMPV	Enterovīrusi	Koronavīrusi	Rinovīrusi	Skaitis	Īpatsvars
40.	115	3	0	0	0	0	1	23	27	23,5%
41.	144	2	1	1	0	0	0	35	39	27,1%
42.	155	9	0	0	0	0	1	28	38	24,5%
43.	134	2	2	0	0	0	1	16	21	15,7%
44.	146	4	3	1	0	0	0	27	35	24,0%
45.	145	3	3	1	0	0	2	27	36	24,8%
46.	143	4	2	0	0	0	1	16	23	16,1%
47.	176	8	0	0	0	0	0	19	27	15,3%
48.	166	3	2	0	0	0	1	26	32	19,3%
49.	150	3	2	2	0	0	1	18	26	17,3%
50.	174	3	1	5	1	0	1	10	21	12,1%
51.	186	2	5	2	0	0	4	16	29	15,6%
52.	191	1	4	1	0	0	8	18	32	16,8%
01.	163	1	2	3	1	0	4	15	26	16,0%
02.	164	1	3	5	0	0	2	18	29	17,7%
03.	152	4	2	1	1	0	0	9	17	11,2%
04.	138	1	1	1	0	0	3	13	19	13,8%
05.	196	4	6	8	2	0	14	18	52	26,5%
06.	86	1	0	0	0	0	2	5	8	9,3%
07.	59	0	2	1	0	0	14	5	22	37,3%
08.	69	0	8	4	1	0	11	7	31	44,9%
09.	57	2	4	2	2	0	8	7	25	43,9%
10.	44	0	4	1	1	0	2	3	11	25,0%
11.	99	4	3	1	2	0	3	4	17	17,2%
12.	57	2	2	4	5	0	7	9	29	50,9%
13.	48	0	1	7	5	0	7	7	27	56,3%
14.	54	1	3	3	5	0	5	10	27	50,0%
15.	24	0	1	0	3	0	0	5	9	37,5%
16.	33	0	1	0	2	0	0	4	7	21,2%
Kopā	3468	68	68	54	31	0	103	418	742	21,4%

Bakteriālo patogēnu noteikšana

Kopš sezonas sākuma *Mycoplasma pneumoniae* noteikta 37 no 3 064 izmeklētajiem paraugiem (1,2%), kas ir būtiski mazāk nekā iepriekšējā sezonā attiecīgajā periodā (10,5%). *Chlamydia pneumoniae* pozitīvo paraugu īpatsvars ir 1,2%. Kopumā sezonas laikā abu bakteriālo patogēnu cirkulācija bija zema, un novēroti galvenokārt sporādiski gadījumi.

Monitoringa nedēļa	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>			<i>Chlamydia pneumoniae</i>		
	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)
40.	113	2	1,8	23	0	0,0
41.	153	2	1,3	38	0	0,0
42.	146	4	2,7	31	0	0,0
43.	138	4	2,9	27	0	0,0

Monitoringa nedēļa	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>			<i>Chlamydia pneumoniae</i>		
	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)	Izmeklēto paraugu skaits	t.sk. pozitīvi	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)
44.	146	3	2,1	30	0	0,0
45.	165	3	1,8	36	0	0,0
46.	148	1	0,7	26	0	0,0
47.	185	3	1,6	38	0	0,0
48.	164	1	0,6	44	1	2,3
49.	168	3	1,8	33	0	0,0
50.	162	1	0,6	29	0	0,0
51.	37	1	2,7	37	1	2,7
52.	184	1	0,5	20	1	5,0
01.	152	1	0,7	12	0	0,0
02.	157	1	0,6	38	1	2,6
03.	137	3	2,2	34	1	2,9
04.	146	1	0,7	38	0	0,0
05.	179	0	0,0	35	0	0,0
06.	38	0	0,0	38	0	0,0
07.	46	0	0,0	46	0	0,0
08.	47	1	2,1	42	1	2,4
09.	54	0	0,0	54	3	5,6
10.	35	0	0,0	32	0	0,0
11.	48	0	0,0	46	1	2,2
12.	29	0	0,0	29	0	0,0
13.	31	0	0,0	31	0	0,0
14.	32	0	0,0	31	2	6,5
15.	24	1	4,2	23	0	0,0
16.	35	0	0,0	35	0	0,0
Kopā	3099	37	1.2	976	12	1.2

COVID-19 INFEKCIJAS DATI


Latvijā datus par Covid-19 infekciju sniedz slimnīcas, laboratorijas un ģimenes ārstu prakses (Nacionālā veselības dienesta dati) un stacionārās ārstniecības iestādes, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS).

Pozitīvo testu īpatsvars un stacionēto pacientu skaits Covid-19 infekcijas gadījumos

2025. gada augustā un septembrī Latvijā tāpat kā citās PVO Eiropas valstīs tika novērots Covid-19 infekcijas saslimstības pacēlums, kad tika reģistrēts visaugstākais pozitīvo paraugu īpatsvars (17,3%–18,9%), kā arī stacionāros uzņemto Covid-19 pacientu skaits.


Kopš 2026. gada sākuma no kopā izmeklētajiem paraugiem pozitīvo SARS-CoV-2 testu īpatsvars nepārsniedz 7,5%, taču janvārī un februārī slimnīcās uzņemto pacientu skaits ar apstiprināto Covid-19 infekciju ir bijis paaugstinātā līmenī.

Aizvadītajā nedēļā pozitīvo Covid-19 testu īpatsvars saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī - 1,6% (iepriekšējā nedēļā – 1,6%) un arī nav novērotas būtiskas izmaiņas stacionēto pacientu skaitā ar Covid-19 infekciju. No jauna nedēļas laikā stacionēti četri pacienti ar Covid-19 infekciju (iepriekšējā nedēļā – trīs pacienti), kopā stacionāros 16. nedēļā ārstējušies astoņi pacienti ar Covid-19 infekciju.




Stacionāros mirušo Covid-19 pacientu skaits

2026. gada 16. nedēļā stacionāros nav reģistrēti nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. Kopš gada sākuma (1.–16. nedēļā) slimnīcās kopā reģistrēti 58 nāves gadījumi. 2025. gadā šajā pašā periodā miruši 38 pacienti ar Covid-19 infekciju.



Kumulatīvais mirušo gripas un Covid-19 pacientu skaits*


Kopš monitoringa sezonas sākuma kopējais mirušo Covid-19 pacientu skaits ir aptuveni divas reizes lielāks nekā nāves gadījumu skaits pacientiem ar gripas infekciju. Nāves gadījumi Covid-19 pacientiem tiek reģistrēti arī ārpus gripas monitoringa perioda (20.–40. gada nedēļa), ņemot vērā nenoteikto Covid-19 izplatības sezonālītāti. Dati liecina par pastāvīgu Covid-19 radīto smago iznākumu slogu visa gada garumā un uzsvēr nepieciešamību turpināt Covid-19 infekcijas epidemioloģisko uzraudzību un vakcināciju riska grupām.



*Dati par mirušajiem pacientiem ar Covid-19 infekciju tiek iegūti no SAIRIS (operatīvie apkopotie dati), bet dati par mirušajiem pacientiem ar gripas infekciju tiek saņemti no ārstniecības personu paziņojumiem. Dati sezonas noslēgumā tiks salīdzināti un apkopoti ar datiem no Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes.

Covid-19 notekūdeņu monitorings²

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR monitoringa dati rāda, ka SARS-CoV-2 vīrusa RNS koncentrācija notekūdeņos vidēji Latvijā samazinās. SARS-CoV-2 vīrusa RNS koncentrācijas pieaugums novērojams Limbažu, Valmieras, Rēzeknes, Daugavpils, Jēkabpils, Salaspils un Saldus notekūdeņos, bet pārējo monitoringa teritoriju notekūdeņos novērojama stabila tendence vai tendences samazinājums.



² <https://bior.lv/lv/2026-gada-zinojumi-par-rns-kopiju-izplatiba-latvija/>

PVO EIROPAS REĢIONA ELPCĒĻU VĪRUSU UZRAUDZĪBA
European Respiratory Virus Surveillance Summary (ERVISS)
15. nedēļas ziņojums³

Elpceļu vīrusu aktivitāte

- Paaugstināti gripas un/vai akūtu elpceļu infekciju rādītāji novēroti 1 no 32 PVO Eiropas reģiona valstīm, kas ziņoja datus.
- **Gripas vīrusu** aktivitāte ir atgriezies starpsezonu līmenī un pozitīvo gripas vīrusu īpatsvars uzraudzības iestādēs ir zem epidēmiskā sliekšņa (<10%).
- 2026. gada 15. nedēļā primārās veselības aprūpes kontrolpunktos 32 (91%) paraugos noteikti *A tipa* gripas vīrusi. Apakštips noteikts 23 paraugiem, tostarp 14 *A(H3)* un 9 *A(H1)pdm09* apakštipa gripas vīrusi.
- No 33 valstīm un reģioniem, kas ziņoja par gripas intensitātes līmeni, divas valstis ziņoja par vidēju vai augstāku intensitāti (Gruzija un Polija).
- No 33 valstīm un reģioniem, kas informēja par gripas ģeogrāfiskās izplatības līmeni, astoņas ziņoja par reģionālu vai plašu gripas izplatību.
- **RSV aktivitātes** rādītāji joprojām ir paaugstināti, bet veikto testu skaits un pozitīvo paraugu skaits reģionālā līmenī turpina samazināties.
- **SARS-CoV-2 aktivitātes** rādītāji reģionā saglabājas zemā līmenī.
- **EuroMOMO** dati par visu ceļoņu mirstību iesaistītajās Eiropas valstīs uzrāda prognozējamo mirstības līmeni visās vecuma grupās. Dati pagājušajā nedēļā tika ievākti no 27 Eiropas valstīm vai reģioniem.

Infekcijas smagums


Pozitīvo testu īpatsvars PVO Eiropas reģiona stacionārās veselības aprūpes kontroluzraudzības iestādēs SARI pacientiem:

- **Gripas** vīrusu īpatsvars saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī – 3%. Mediānais pozitīvo paraugu īpatsvars desmit valstīs, kas ziņoja datus, bija 4% (diapazons: 0%-10%). Starp SARI paraugiem šonedēļ tīklā tika ziņots par 53 gripas vīrusiem, galvenokārt noteikti *A tipa* gripas vīrusi (88%). No septiņiem raksturotajiem vīrusiem četri bija *A(H3)* un trīs bija *A(H1)pdm09*.
- **SARS-CoV-2** bija 1% (iepriekšējā nedēļā – 2%); mediānais pozitīvo testu īpatsvars deviņās valstīs, kas sniedza datus, bija 1% (diapazons: 0%-5%).
- **RSV** samazinājās līdz 11% (iepriekšējā nedēļā – 13%); mediānais pozitīvo testu īpatsvars deviņās valstīs, kas sniedza datus bija 15% (diapazons: 0%-40%).

³ <https://erviss.org/>

Primary care sentinel testing

Secondary care sentinel testing



Pasaules Veselības organizācijas Globālā gripas uzraudzības tīkla 2026. gada 15. aprīļa 573. ziņojums⁴

Pasaulē gripas aktivitāte saglabājas stabila, un 2026. gada 14. nedēļā pozitīvo testu īpatsvars nepārsniedza 10%. SARS-CoV-2 aktivitāte kopumā saglabājās zema. Ziemeļu puslodē mērenās, tropu un subtropu joslas reģionā dominēja gripa, un pozitīvo paraugu īpatsvars bija zem 10%. Dienvidu puslodes mērenās un subtropu joslas apgabalos gan gripas, gan SARS-CoV-2 pozitīvo paraugu īpatsvars bija zems. Pozitīvo RSV testu īpatsvars pasaulē saglabājās zems un stabils. Jāatzīmē, ka atsevišķos reģionos ierasto uzraudzības un testēšanas kārtību varēja ietekmēt brīvdienas 2026. gada 14. nedēļā.

Gripa

Visā pasaulē gripas pozitīvo paraugu īpatsvars 14. nedēļā turpināja samazināties. No apstiprinātajiem gripas vīrusiem dominēja *B tipa* gripas vīrusi.

Ziemeļu puslodē gripas pozitīvo paraugu īpatsvars bija paaugstināts (>10%) atsevišķās valstīs Ziemeļamerikā, Ziemeļāfrikā un Austrumāfrikā, kā arī Dienvidāzijā, Austrumāzijā un Dienvidaustrumāzijā. Pozitīvo testu īpatsvars pārsniedza 30% Centrālamerikas un Karību jūras reģiona valstīs, Austrumeiropā, kā arī vienā valstī Rietumāfrikā. Neliels aktivitātes pieaugums tika novērots atsevišķās valstīs Centrālamerikā un Karību jūras reģionā, Dienvidāzijā un vienā valstī Centrālāfrikā un Centrālāzijā.

Dienvidu puslodē gripas aktivitāte kopumā saglabājās zema, lai gan paaugstināts pozitīvo paraugu īpatsvars (>10%) tika ziņots atsevišķās valstīs mērenajā un tropiskajā Dienvidamerikā, Austrumāfrikā un Dienvidāfrikā, un Dienvidaustrumāzijā. Pozitīvo testu īpatsvars pārsniedza 30% vienā valstī Dienvidamerikas tropiskajā joslā. Par aktivitātes pieaugumu netika ziņots.

Zonās ar paaugstinātu gripas pozitīvo paraugu īpatsvaru *A(H3N2)* dominēja Centrālamerikā un Karību jūras reģionā, Dienvidamerikas tropiskajā un mērenajā joslā un Austrumāfrikā. Austrumeiropā un Dienvidāfrikā dominēja *A(H1N1)pdm09* gripas vīrusi. *B tipa* gripas vīrusi dominēja Ziemeļamerikā, Rietumāfrikā, Austrumāzijā. Vienāds *A* un *B tipa* gripas vīrusu skaits tika novērots Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā.

SARS-CoV-2

Globāli SARS-CoV-2 izplatība saglabājās stabilā un zemā līmenī.

Respiratori sincitiālais vīruss (RSV)

⁴ <https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity--weekly-update-n--573>

RSV aktivitāte kopumā bija stabila un zema. Par paaugstinātu pozitīvo testu īpatsvaru (>10%) ziņoja dažas valstis Dienvidamerikas tropu joslā, Eiropā un vienā valstī Ziemeļāfrikā un Rietumāzijā. Par pozitīvo paraugu īpatsvaru virs 30% ziņoja vienā valstī Austrumāfrikā. Par nelielu aktivitātes pieaugumu tika ziņots vienā Austrumeiropas valstī, Dienvidamerikas topiskajā joslā un vienā valstī Rietumāzijā. Gan RSV, gan gripas aktivitāte bija paaugstināta vienā valstī Ziemeļāfrikā un Austrumeiropā.

PVO Konsultatīvās sanāksmes 2026. gada 27. februāra ziņojums par gripas vakcīnas sastāvu 2026.–2027. gada sezonai Ziemeļu puslodē⁵

2026. gada 27. februārī notikušajā PVO Konsultatīvā sanāksmē tika apstiprināts vakcīnu sastāvs 2026.–2027. gada sezonai Ziemeļu puslodē.

PVO iesaka izmantot trīsvērtīgas vakcīnas 2026.–2027. gada gripas sezonā:

Vakcīnās, kuru ražošanā tiek izmantotas olas, jābūt šādiem komponentiem:

- *A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09* – līdzīgs vīruss;
- *A/Darwin/1454/2025 (H3N2)* – līdzīgs vīruss;
- *B/Tokyo/EIS13-175/2025 (B/Victoria līnija)* – līdzīgs vīruss

Vakcīnās, kas tiek ražotas, izmantojot šūnas, jeb rekombinantās vakcīnās, jāiekļauj:

- *A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09* – līdzīgs vīruss;
- *A/Darwin/1415/2025 (H3N2)* – līdzīgs vīruss;
- *B/Pennsylvania/14/2025 (B/Victoria līnija)* – līdzīgs vīruss

Laboratoriski apstiprināti *B tipa* gripas vīrusi ar *Yamagata* apakšlīniju nav noteikti kopš 2020. gada marta, kas liecina par zemu inficēšanās risku ar šīs līnijas vīrusiem. Saskaņā ar PVO gripas vakcīnu konsultatīvās komitejas rekomendācijām, *B/Yamagata* līnijas antigēna iekļaušana četrvalento gripas vakcīnu sastāvā vairs nav pamatota.

⁵ <https://www.who.int/publications/m/item/recommended-composition-of-influenza-virus-vaccines-for-use-in-the-2026-2027-northern-hemisphere-influenza-season>

PAR GRIPAS UN CITU ELPCEĻU INFEKCIJU MONITORINGU

2025.–2026. gada sezonā monitoringā ir iesaistītas 44 ĢĀP desmit administratīvajās teritorijās – Liepāja, Ventspils (Kurzeme), Daugavpils, Rēzekne (Latgale), Jūrmala (Pierīga), Valmieras novads, Gulbenes novads (Vidzeme), Jēkabpils novads, Jelgava (Zemgale) un Rīga.

Kopējais reģistrēto pacientu skaits atlasītajās ĢĀP – 70 973 jeb 3,8% no Latvijas iedzīvotāju populācijas un 7,0% no monitoringa populācijas. ĢĀP katru nedēļu sniedz datus par pacientu skaitu, kas vērsušies pēc medicīniskās palīdzības ārsta praksē gripas, citu AEI un pneimoniju gadījumos, norādot pacientu skaitu pa vecuma grupām: 0-4, 5-14, 15-64 un 65 gadi un vairāk. Pēc ĢĀP sniegtās informācijas tiek aprēķināta gripas izplatības intensitāte pa teritorijām un pa vecuma grupām.

Lai novērtētu sezonālās gripas epidēmijas smagumu, katru sezonu monitoringā tiek iesaistītas slimnīcas visās administratīvajās teritorijās. Šajā sezonā ir iesaistītas 10 slimnīcas astoņās pilsētās: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA “Rēzeknes slimnīca”, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. Slimnīcas katru nedēļu, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS), ziņo par kopējo stacionēto pacientu skaitu pa vecuma grupām, kopējo un intensīvās terapijas nodaļā (ITN) stacionēto pacientu skaitu ar smagu akūtu respiratoru infekciju (turpmāk – SARI) pa vecuma grupām, SARI mirušo skaitu pa vecuma grupām un SARI pacientu skaitu, kas testēti uz gripu, Covid-19 un respiratori sincitiālo vīrusu (RSV), t.sk. pozitīvos gadījumus pa vecuma grupām.

Monitoringā tiek iekļautas vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes visās 10 administratīvajās teritorijās, kas katru nedēļu informē par iestāžu apmeklētību ceturtdien. 2025.-2026. gada sezonā tiks iesaistītas 30 skolas, kurās mācās 19 902 skolēni un 32 pirmsskolas izglītības iestādes, kuras apmeklē 4 935 bērni.

Mikrobioloģijas dati par cirkulējošiem elpceļu vīrusiem un baktērijām tiek saņemti no NMRL. Pārskatā tiek iekļauta informācija par izmeklēto klīnisko paraugu skaitu, kas tiek izmeklēti NMRL ar polimerāzes ķēdes reakcijas (RL-PKĶR) un Mutliplex metodi elpceļu vīrusu noteikšanai. NMRL paraugi tiek saņemti no Rīgas stacionārajām ārstniecības iestādēm, no reģionālajām slimnīcām, kā arī no citām, t.sk. ambulatorajām iestādēm.

Materiālu sagatavoja: SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģe Kate Karolīna Tomašūna.

2025.–2026. gada sezonas AEI un gripas monitoringa 2026. gada 16. nedēļā datus sniedza:

- 43 ģimenes ārstu prakses (reģistrēto pacientu skaits 69 434 jeb 6,9% no iedzīvotāju skaita monitoringa iekļautajās teritorijās un 3,7% no Latvijas iedzīvotāju populācijas);
- 10 stacionārās ārstniecības iestādes;
- 30 vispārējās izglītības iestādes un 32 pirmsskolas izglītības iestādes.

Izmantoti SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas, Nacionālā veselības dienesta, Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS) dati, kā arī Valsts zinātniskais institūta "BIOR", Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Rīgas Tehniskās universitātes notekūdeņu monitoringa dati.

Pateicamies visiem monitoringa dalībniekiem par sniegto informāciju.

Datu pārpublicēšana un citēšana – atsauce uz Slimību profilakses un kontroles centra “Epidemioloģijas biļetenu” ir obligāta.