

Ieteikumi **ambulatorām ārstniecības iestādēm** sākotnējai rīcībai jaunā koronavīrusa infekcijas (COVID-19) aizdomu gadījumā

Pacientam ir **akūta elpceļu infekcijas slimība (pēkšņs sākums un vismaz viens no šādiem simptomiem: paaugstināta ķermeņa t^o, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums)**

14 dienu laikā

pēc atgriešanās no **skartās teritorijas*** VAI pēc kontakta ar pacientu, kuram ir apstiprināta COVID-19 infekcija.

- Nodrošiniet pacientu ar ķirurģisko masku
- Nomazgājiet vai dezinficējiet rokas
- Uzlieciet respiratoru vai masku* un citus individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL)
- Izolējiet/norobežojiet pacientu no citiem līdz pārvešanai
- Zvaniet:
 - SPKC (diennakts tālrunis – **67271738**)
 - **113** un informējiet par pacienta iespējamo saslimšanu ar COVID-19 infekciju
- Pārtrauciet pacientu pieņemšanu un organizējiet kontaktpersonu apzināšanu ārstniecības iestādē
- Telpās, kur uzturējies patients ar aizdomām par COVID-19, veic dezinfekciju
- Tālākā rīcība atbilstoši pacienta laboratoriskās izmeklēšanas rezultātiem un SPKC epidemiologa norādījumiem

* Aktuāls skarto teritoriju saraksts pieejams: www.spkc.gov.lv

** Ja respirators nav pieejams

Nepieciešamie IAL:

- FFP2 vai FFP3 respirators, ja nav pieejams – ķirurģisko masku
- acu aizsargi (brilles vai sejas ekrāns)
- virsvalks ar garām piedurknēm
- vienreizlietojamie cimdi

Pēc pacienta pārvešanas:

- Atkritumus ievietojiet marķētā, dubultā, ūdens necaurlaidīgā maisā kā bīstamos atkritumus, atbilstoši iestādes iekšējai kārtībai.
- Veiciet aprīkojuma, telpas uzkopšanu un dezinfekciju:
 - dezinfekcijai izmanto ārstniecības iestādē lietotos dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, līdzekļus ar 70% etanolu, hloru saturošus līdzekļus.
- Pēc telpas uzkopšanas, novelciet IAL, ievērojot nepieciešamo piesardzību, un izmetiet kā bīstamos atkritumus