



## Saslimstība un hospitalizācija ar Covid-19 turpina būtiski pieaugt


Publicēts: 11.10.2021.

Covid-19

Preses relīzes

Aizvadītās nedēļas laikā, no 4.oktobra līdz 10.oktobrim, atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 40,5%, turpinās pieaugums arī stacionāros ievietotajiem pacientiem, sasniedzot pieaugumu par 36,1%, bet 10,6% no visiem Covid-19 pacientiem stacionāros ir ar smagu slimības gaitu.

### No 27. septembra līdz 3. oktobrim **stacionēto\*** Covid-19 pacientu **vakcinācijas statuss**



\*Nacionālā Veselības dienesta (NVD) operatīvie dati



Aktuālā informācija  
par COVID-19

[www.spkc.gov.lv](http://www.spkc.gov.lv)  
[www.covid19.gov.lv](http://www.covid19.gov.lv)


No visiem veiktajiem testiem 42% (47 337 testi) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 58% (65 892 testi) pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 13% (1 297 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 87% (8 336 inficētie) pārejā sabiedrības daļā. No visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem 65% epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka ir novēroti saslimšanas simptomi.

Pagājušajā nedēļā vidēji dienā tika veikti vidēji 16 176 testi (iepriekš – 20 378) un atklāti vidēji 1 376 jauni gadījumi (iepriekš 979).

Saslimstības pieaugums ir visās vecuma grupās, saglabājas pacēlums vecuma grupā 10-14 gadi. Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) aizvadītajā nedēļā nedaudz samazinājies līdz 1,28 (nedēļu iepriekš 1,38), kas liecina par infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.

Pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 gadījumus un izvērtējot inficēto cilvēku vakcinācijas statusu, 7 518 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeidzis, kas kopumā ir 78% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem, savukārt 2 115 cilvēks bija vakcinēts, kas ir 22% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem. Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū, nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta 2,7 reizes biežāk, nekā pilnībā vakcinētiem.

# Jauni Covid-19 gadījumi:



Dati: Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) un Nacionālais veselības dienests (NVD)

27.09.-03.10.2021.



Aktuālā informācija  
par COVID-19

[www.spkc.gov.lv](http://www.spkc.gov.lv)  
[www.covid19.gov.lv](http://www.covid19.gov.lv)

Jāatzīmē, ka, pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nedaudz palielinājies - līdz 150,6 (nedēļu iepriekš – 146,9). Latvijas šis rādītājs ir ievērojami pieaudzis - līdz 580,9 (pirms nedēļas – 398).

Iepriekšējā nedēļā nedaudz samazinājies ievesto Covid-19 gadījumu skaits (53), sastādot 0,6% no visiem saslimšanas gadījumiem Latvijā. Laikā no 35. līdz 40. nedēļai saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Turcijas (59 gadījumi), Krievijas (39), Gruzijas (27), Vācijas (24), Lietuvas (21), Zviedrijas(20), Igaunijas (17), Itālijas (19), Lielbritānijas (19), Grieķijas (18), Somijas (17), Ukrainas(15), Spānijas(14).

## Aicinām iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19!

Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā. Par konkrēta ražotāja vakcīnas pieejamību izvēlētajā vakcinācijas punktā iedzīvotāji var uzzināt [šeit](#).

Atgādinām, ka joprojām jāievēro spēkā esošie drošības noteikumi un Covid-19 profilakses pasākumi, piemēram:

nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru);

roku higiēna (regulāra roku mazgāšana un/vai dezinfekcija),

pareiza sejas maskas lietošana (maskai nosedzot degunu un zodu),

regulāra telpu vēdināšana (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā),  
iespēju robežās strādāt attālināti,

[Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un kontaktpersonām](#)

[Papildu informācija par vakcināciju pret Covid-19](#)

[Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcīnām](#)

<https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/saslimstiba-un-hospitalizacija-ar-covid-19-turpina-butiski-pieaugt>