



## Turpina samazināties Covid-19 pacientu skaits stacionāros

Publicēts: 17.10.2022.

[Covid-19](#)

[Preses relīzes](#)

Aizvadītajā nedēļā, no 10. oktobra līdz 16. oktobrim, Latvijā par 22,8% samazinājies jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, reģistrēti 5189 jauni Covid-19 gadījumi. Infekcijas reprodaktivitātes koeficienta samazināšanās līdz (R) 0,85 norāda uz lēnāku infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Par 8% samazinājies pacientu skaits stacionāros.

Iepriekšējās nedēļas laikā Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis tikai Zemgalē, bet pārējos reģionos turpināja samazināties. Gandrīz visās vecuma grupās turpina samazināties saslimstība ar Covid-19, tomēr vecuma grupā no 60 līdz 79 gadu vecumam samazinājums vairs nav izteikts.

Pielāgotās vakcīnas pret Covid-19 ir pieejamas ģimenes ārstu praksēs un vakcinācijas kabinetos. Atgādinām, ka šobrīd ir iespējams vakcinēties arī pret gripu, tādējādi pasargājot sevi no gripas izraisītām komplikācijām. Īpaši nozīmīgi tas ir hronisko slimību pacientiem, senioriem, bērniem un grūtniecēm, kā arī tiem cilvēkiem, kuriem plānots saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, piemēram, plānveida operācijas. Vakcināciju pret gripu un Covid-19 var saņemt vienā vakcinācijas reizē.

| <b>Vakcinācija pret sezonālo gripu un Covid-19 rekomendējama visai sabiedrībai</b>   |  |
|--|--|
| <b>Vakcinācija pret gripu īpaši tiek rekomendēta:</b>  | <b>Vakcinācija pret Covid-19 īpaši tiek rekomendēta:</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bērniem vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem (ieskaitot);</li> <li>• bērniem un pieaugušajiem ar hroniskām slimībām un imūnsupresiju;</li> <li>• grūtniecēm;</li> <li>• ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kuras, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar pacientiem;</li> <li>• ilgstošas sociālās aprūpes centru darbiniekiem, kuri, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar klientiem;</li> <li>• ilgstošas sociālās aprūpes centru klientiem;</li> <li>• personām vecumā no 65 gadiem;</li> <li>• cilvēkiem ar psihiskām slimībām.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• veselības aprūpes personālam;</li> <li>• senioriem vecumā no 65 gadiem;</li> <li>• cilvēkiem ar hroniskām slimībām;</li> <li>• imūnsupresētiem cilvēkiem un viņu ciešām kontaktpersonām;</li> <li>• ilgstošiem sociālās aprūpes centru iemītniekiem un viņu aprūpes personālam;</li> <li>• grūtniecēm.</li> </ul> |
| <b>Kur saņemt vakcīnu?</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pie sava ģimenes ārsta</li> <li>• ārstniecības iestādēs;</li> <li>• vakcinācijas kabinetos;</li> <li>• pieteikties tīmekļa vietnē <a href="http://Manavakcina.lv">Manavakcina.lv</a>.</li> </ul>  |  |
|  | <b>Kad vakcinēties pret Covid-19</b>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 mēneši pēc pēdējās vakcīnas saņemšanas cilvēkiem no 65 gadu vecuma un imūnsupresētiem cilvēkiem;</li> <li>• 6 mēneši (bet ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem) pēc pēdējās vakcīnas saņemšanas pārējiem cilvēkiem;</li> <li>• 4-6 mēneši (bet ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem) pēc pārslimota Covid-19.</li> </ul>            |

!Atgādinām, ka joprojām jāievēro Covid-19 profilakses pasākumi, piemēram:

izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem un nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru) vai citām Covid-19 pazīmēm; censties ievērot 2 metru distanci, atrodoties publiskajās vietās;

izvairīties no pārpildītām vietām, kur nevar atrasties 2 metru attālumā no citiem;

izvērtēt nepieciešamību ceļot, riskus ceļojuma laikā un iespējas tos mazināt;

ievērot roku higiēnu (regulāri mazgāt un/vai dezinficēt rokas), nepieskarties ar netīrām rokām sejai;

bieži vēdināt telpas (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā). Ja iespējams, maksimāli intensīvi jāvedina sabiedriskā transporta saloni;

vietās, kur nav iespējams ievērot drošu distanci, sejas masku vai respiratoru FFP2 lietošana ir svarīgs piesardzības pasākums, kas īpaši ieteicams cilvēkiem ar hroniskām slimībām, pazeminātu imunitāti. Lietojot sejas masku, ir svarīgi to darīt pareizi - cieši nosedzot degunu un muti;

medicīnas iestādēs un sociālās aprūpes centros sejas masku lietošana ir obligāta;

Covid-19 slimnieka kontaktpersonai 7 dienas pēc pēdējā kontakta ieteicams palikt mājās un nekontaktēties ar citiem cilvēkiem, bet

ja tas nav iespējams, tad būt atbildīgam par citu cilvēku veselību un sabiedriskās vietās lietot ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru, tai skaitā veicot darba pienākumus, esot telpā, kur atrodas vairāk par vienu cilvēku. Jāatceras, ka Covid-19 inficēta persona kļūst infekcioza 2 dienas pirms simptomu parādīšanās un respirators šādos gadījumos ievērojami samazina inficēšanās risku citiem cilvēkiem;

publisko pasākumu rīkotājiem ir svarīgi apzināt ar Covid-19 infekciju saistītos riskus un noteikt konkrētas epidemioloģiskās drošības prasības savai pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietai, piemēram, sejas masku lietošanu, distances un plūsmu ievērošanu.



[Vairāk par Covid-19 statistiku:](#)

[Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un kontaktpersonām](#)

[Papildu informācija par vakcināciju pret Covid-19](#)

[Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcīnām](#)

[Rekomendācijas](#)

## Komunikācijas nodaļa

Ilze Arāja

Nodaļas vadītāja - Rīga, Dunties iela 22/5, 311.  
kab.

☎ 67387667 📠 29487552



<https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/turpina-samazinaties-covid-19-pacientu-skaitis-stacionaros>