



## Iepriekšējā nedēļā pieaudzis Covid-19 pacientu skaits stacionāros; Eiropā pieaug arī saslimstība ar gripu

Publicēts: 05.12.2022.

[Covid-19](#)

[Preses relīzes](#)



## Aktuālā informācija par epidemioloģisko situāciju Latvijā



Aktuālā informācija  
par COVID-19

[www.spkc.gov.lv](http://www.spkc.gov.lv)  
[www.covid19.gov.lv](http://www.covid19.gov.lv)


Covid-19 gadījumu skaits iepriekšējā nedēļā no 28.novembra līdz 4.decembrim samazinājās par 11,7% (kopā 3124 gadījumi). Tomēr jau otro nedēļu turpina palielināties kopējo pacientu skaits stacionāros, iepriekšējā nedēļā pieaugums bija par 20,4%.

Arī citviet Eiropas Savienībā novērojama saslimstības pieauguma tendence. Kopumā Latvijā saslimstība ar Covid-19 ir zem ES vidējā radītāja.

Salīdzinot Covid-19 infekcijas izplatības intensitāti no jūlija līdz novembrim uz 100 000 aktuāli vakcinēto iedzīvotāju\*, primāro vakcināciju pabeigušo un nevakinēto cilvēku, aktuāli vakcinētajiem infekcija konstatēta 1,9 reizes retāk nekā nevakinētajiem.

No jūlija līdz oktobrim aktuāli vakcinētie tika stacionēti 6,7 reizes retāk nekā nevakinētie. Savukārt, letāli Covid-19 iznākumi aktuāli vakcinētajiem cilvēkiem konstatēti 10,1 reizi retāk, nekā nevakinētajiem.

# Vakcinācijas pret Covid-19 ietekme uz saslimstību ar Covid-19, hospitalizāciju un letālo iznākumu **2022. gada jūlijā – novembrī**



Covid-19 gadījumi Latvijā 2022. gada jūlijā – novembrī (salīdzinot intensitāti uz 100 000 iedzīvotājiem)

**RR** jeb relatīvais risks norāda uz to, cik reizes inficēšanās, stacionēšanas vai nāves risks ir mazāk vakcinētām personām salīdzinājumā ar nevakcinētām.  
\*Pēdējo 6 mēnešu laikā veikta balstvakcinācija vai pabeigta primārā vakcinācija.



[www.spkc.gov.lv](http://www.spkc.gov.lv)

Slimību profilakses un kontroles centra un Nacionālā veselības dienesta dati; 01.07.22.–30.11.22.

Kopš šajā sezonā uzsāktā gripas monitoringa, Latvijā līdz šim laboratoriski apstiprināti 15 gripas gadījumi un ģimenes ārstu prakses ziņojušas par 79 klīniski apstiprinātiem gripas gadījumiem. Gripas reģionāla un plaša izplatība jau konstatēta dažās Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas valstīs: Albānija, Somija, Francija, Vācija, Kazahstāna, Kirgizstāna, Moldovas Republika, Portugāle, Turcija, Ukraina, Apvienotā Karaliste (Skotija).

! Speciālisti aicina seniorus un cilvēkus ar hroniskām slimībām neatlikt vakcināciju pret sezonālo gripu un Covid-19. Vakcinācijai var pieteikties pie sava ģimenes ārsta, ārstniecības iestādēs, vakcinācijas kabinetos vai portālā [manavakcina.lv](http://manavakcina.lv)

Vakcināciju pret gripu un Covid-19 var saņemt vienā vakcinācijas reizē.

<b>Vakcinācija pret sezonālo gripu un Covid-19 rekomendējama visai sabiedrībai</b>	
<b>Vakcinācija pret gripu īpaši tiek rekomendēta:</b>	<b>Vakcinācija pret Covid-19 īpaši tiek rekomendēta:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bērniem vecumā līdz 17 gadiem;</li> <li>• bērniem un pieaugušajiem ar hroniskām slimībām un imūnsupresiju;</li> <li>• grūtniecēm;</li> <li>• ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kuras, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar pacientiem;</li> <li>• ilgstošas sociālās aprūpes centru darbiniekiem, kuri, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar klientiem;</li> <li>• ilgstošas sociālās aprūpes centru klientiem;</li> <li>• personām vecumā no 50 gadiem;</li> <li>• cilvēkiem ar psihiskām slimībām.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• veselības aprūpes personālam;</li> <li>• senioriem vecumā no 65 gadiem;</li> <li>• cilvēkiem ar hroniskām slimībām;</li> <li>• imūnsupresētiem cilvēkiem un viņu ciešām kontaktpersonām;</li> <li>• ilgstošiem sociālās aprūpes centru iemītniekiem un viņu aprūpes personālam;</li> <li>• grūtniecēm.</li> </ul>
<b>Kur saņemt vakcīnu?</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pie sava ģimenes ārsta</li> <li>• ārstniecības iestādēs;</li> <li>• vakcinācijas kabinetos;</li> <li>• pieteikties tīmekļa vietnē <a href="http://Manavakcina.lv">Manavakcina.lv</a>.</li> </ul>	
	<b>Kad vakcinēties pret Covid-19</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 mēneši pēc pēdējās vakcīnas saņemšanas cilvēkiem no 65 gadu vecuma un imūnsupresētiem cilvēkiem;</li> <li>• 6 mēneši (bet ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem) pēc pēdējās vakcīnas saņemšanas pārējiem cilvēkiem;</li> <li>• 4-6 mēneši (bet ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem) pēc pārslimota Covid-19.</li> </ul>

!Atgādinām, ka joprojām jāievēro Covid-19 profilakses pasākumi, piemēram:

izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem un nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru) vai citām Covid-19 pazīmēm;

censties ievērot 2 metru distanci, atrodoties publiskajās vietās;

izvairīties no pārpildītām vietām, kur nevar atrasties 2 metru attālumā no citiem;

izvērtēt nepieciešamību ceļot, riskus ceļojuma laikā un iespējas tos mazināt;

ievērot roku higiēnu (regulāri mazgāt un/vai dezinficēt rokas), nepieskarties ar netīrām rokām sejai;

bieži vēdināt telpas (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā). Ja iespējams, maksimāli intensīvi jāvedina sabiedriskā transporta saloni;

vietās, kur nav iespējams ievērot drošu distanci, sejas masku vai respiratoru FFP2 lietošana ir svarīgs piesardzības pasākums, kas īpaši ieteicams cilvēkiem ar hroniskām slimībām, pazeminātu imunitāti. Lietojot sejas masku, ir svarīgi to darīt pareizi - cieši nosedzot degunu un muti;

medicīnas iestādēs un sociālās aprūpes centros sejas masku lietošana ir obligāta;

Covid-19 slimnieka kontaktpersonai 7 dienas pēc pēdējā kontakta ieteicams palikt mājās un nekontaktēties ar citiem cilvēkiem, bet ja tas nav iespējams, tad būt atbildīgam par citu cilvēku veselību un sabiedriskās vietās lietot ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru, tai skaitā veicot darba pienākumus, esot telpā, kur atrodas vairāk par vienu cilvēku. Jāatceras, ka Covid-19 inficēta persona kļūst infekcioza 2 dienas pirms simptomu parādīšanās un respirators šādos gadījumos ievērojami samazina

inficēšanās risku citiem cilvēkiem;

publisko pasākumu rīkotājiem ir svarīgi apzināt ar Covid-19 infekciju saistītos riskus un noteikt konkrētas epidemioloģiskās drošības prasības savai pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietai, piemēram, sejas masku lietošanu, distances un plūsmu ievērošanu.

[Vairāk par Covid-19 statistiku:](#)

[Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un kontaktpersonām](#)

[Papildu informācija par vakcināciju pret Covid-19](#)

[Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcīnām](#)

[Rekomendācijas](#)

*\*Aktuāli vakcinētie (pēdējo 6 mēnešu laikā veikta balstvakcinācija vai pabeigta primārā vakcinācija); primāro vakcināciju pabeigušie (ilgāk par 6 mēnešiem)*

#### Komunikācijas nodaļa

---

**Ilze Arāja**

Nodaļas vadītāja - Rīga, Dunties iela 22/5, 311.  
kab.

 [67387667](tel:67387667)  [29487552](tel:29487552)



<https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/iepriekseja-nedela-pieaudzis-covid-19-pacientu-skaits-stacionaros-eiropa-pieaug-arisaslimstiba-ar-gripu>