

3. tabula. Vakcīnu, šļirču un standarta tuberkulīna piegādātāji 2020. – 2021.gadā

| Piegādātājs (zāļu lieltirgotava) | Vakcīna pret | Vakcīnas nosaukums | Ražotājs | Mērķa grupa (-as) | Papildu informācija |
|--|--|--|------------------------------|--|---|
| SIA „Vakcīna”, Lielvārdes iela 68, Rīga, tālr. 67582948 | pret tuberkulozi (BCG) | <i>Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10</i> | <i>Biomed Lublin S.A. PL</i> | 2.-5.diena | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |
| | difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomiēlītu un b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju (DTaP-IPV-Hib) | <i>Pentaxim</i> | <i>Sanofi Pasteur</i> | riska grupas bērnu, kuri tika vakcinēti ar monovakcīnu pret B hepatītu un bērnu ar medicīniskajām kontraindikācijām imunizācijai ar kombinēto vakcīnu <i>Infanrix Hexa</i> | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |
| | difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu un poliomiēlītu (DTaP-IPV) | <i>Tetraxim</i> | <i>Sanofi Pasteur</i> | bērnu balstvakcinācijai 7 gadu vecumā | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |
| SIA „Oribalt-Rīga” Dzelzavas iela 120M, Rīga, tālr. 67840807 | difteriju un stinguma krampjiem (dT) | <i>Imovax d.T. Adult</i> | <i>Sanofi Pasteur</i> | pieaugušo vakcinācijai un balstvakcinācijai, kā arī bērnu balstvakcinācijai 14 gadu vecumā | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |
| | trakumsērgu | <i>Verorab</i> | <i>Sanofi Pasteur</i> | vakcinācijai pēc klīniskām un epidemioloģiskām indikācijām | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|---|--|
| SIA "GlaxoSmithKline Latvia", Duntes iela 3, Rīga, tālr. 26185543 | B hepatītu bērniem līdz 15 gadu vecumam (HB) | <i>Engerix B 10 mkg</i> | <i>GlaxoSmithK line</i> | riska grupas jaundzimušie (dzimuši B hepatīta virsmas antigēna (HBsAg) pozitīvām mātēm vai mātēm, kuras nebija pārbaudītas HBsAg klātbūtnei); | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |
| | B hepatītu pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze (HB) | <i>Engerix B 20 mkg</i> | <i>GlaxoSmithK line</i> | pacientu, kuriem tiek veikta hemodialīze, vakcinācijai (hemodialīžu centros). | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |
| SIA "Magnum Medical", Ulbrokas iela 23, Rīga, tāl. 67718706 | ērču encefalītu bērniem vecumā 12-15 gadi | <i>TicoVac 0,25 ml</i> | <i>Pfizer</i> | bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācijai visā Latvijas teritorijā, bērnu vakcinācijai endēmiskajās teritorijās. Bērniem vecumā no 1 līdz 15 gadiem | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| | ērču encefalītu bērniem vecumā 16-17 gadi | <i>TicoVac 0,5 ml</i> | <i>Pfizer</i> | bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācijai visā Latvijas teritorijā, bērnu vakcinācijai endēmiskajās teritorijās. Bērniem vecumā no 16 līdz 17 gadiem | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |
| SIA "Tamro", Noliktavu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu novads, Rīgas rajons, tāl. 67067845 (<i>Varivax</i> <i>Gardasil 9, M-M-RVaxPro</i>) tāl. 67067819 (<i>RotaTeq, Synflorix,</i> <i>Infanrix Hexa</i>) | vējbakām (<i>Varicella</i>) | <i>Varivax</i> | <i>Merck Sharp</i> | bērnu vakcinācijai 12 – 15 mēnešu vecumā un balstvakcinācijai 7 gadu vecumā | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |
| | cilvēka papilomas vīrusu infekciju (CPV) | <i>Gardasil 9</i> | <i>Merck Sharp</i> | meiteņu vakcinācijai 12 gadu vecumā | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |
| | masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu (MPR) | <i>M-M-RVaxPro</i> | <i>Merck Sharp</i> | bērnu vakcinācijai 12 – 15 mēnešu vecumā un balstvakcinācijai 7 gadu vecumā | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |
| | rotavīrusa infekciju (RV) | <i>RotaTeq</i> | <i>Merck Sharp</i> | bērnu vakcinācijai 2, 4 un 6 mēnešu vecumā | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |
| | pneimokoku infekciju (PCV) | <i>Synflorix</i> | <i>GlaxoSmithK line</i> | bērnu vakcinācijai 2, 4 un balstvakcinācijai 12 – 15 mēnešu vecumā | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|------------------------|---|---|
| | difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu (DTaP-IPV-Hib-HB) ¹ | <i>Infanrix Hexa</i> | <i>GlaxoSmithKline</i> | Zīdaiņu vakcinācijai 2, 4, 6 mēnešu vecumā un balstvakcinācijai 12 – 15 mēnešu vecumā | Instrukcija un zāļu apraksts ir pieejams šeit |
| SIA “Elpis”, Rāmuļu iela 15, Rīga, tālr. 67517693 | Standarta tuberkulīns | <i>Tuberculin</i> | | intradermalā testa (Mantū raudze) veikšanai | |
| SIA “B.Braun Medical”, Ūdeļu iela 16, Rīga, tālr. 28009009 | šķirces BCG vakcīnas ievadīšanai | | | | |