



Slimību profilakses un kontroles centrs

Bērnu vakcinācijas kalendārs 2019. gadā

Nr. p.k.	Vakcinējamās personas vecums	Infekcijas slimība, pret kuru obligāti veicama vakcinācija	Vakcīnu nosaukumu apzīmējumi	Piezīmes	
1.	0-12 stundas	B hepatīts	HB	Vakcīnu pret B hepatītu ievada tikai riska grupas jaundzimušajiem (dzimuši B hepatīta virsmas antigēna (HBsAg) pozitīvām mātēm vai mātēm, kuras nebija pārbaudītas HBsAg klātbūtnes noteikšanai). Vakcīnas devas ievada atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai	
2.	No 12 stundām	Tuberkuloze	BCG	Ja vakcinācija tiek veikta, bērnam sasniedzot divu mēnešu vecumu, pirms vakcinācijas tiek veikts tuberkulīna tests, lai izslēgtu iespējamu bērna inficēšanos ar tuberkulozi	
3.	No 6 nedēļām	Rotavīrusu infekcija	RV1, RV2 vai RV1, RV2 un RV3	Divas vai trīs devas atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai	
4.	2 mēneši	Difterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatīts	DTaP-IPV-Hib-HB1	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomiēlītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu	
		Pneimokoku infekcija	PCV1		
5.	4 mēneši	Difterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatīts	DTaP-IPV-Hib-HB2	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomiēlītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu	
		Pneimokoku infekcija	PCV2		
6.	6 mēneši	Difterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatīts	DTaP-IPV-Hib-HB3	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomiēlītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu	
7.	6-23 mēneši (ieskaitot)	Gripa	Vaccinum influenzae	Lieto vakcīnu pret sezonālo gripu	
8.	12-15 mēneši	Difterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatīts	DTaP-IPV-Hib-HB4	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomiēlītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu	
		Pneimokoku infekcija	PCV3		
		Masalas, masaliņas, epidēmiskais parotīts	MPR1	Lieto kombinēto vakcīnu pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu. Iespējams lietot arī kombinēto vakcīnu pret masalām, masaliņām, epidēmisko parotītu un vējbakām	
		Vējbakas	Varicella1		
9.	7 gadi	Difterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomiēlīts	DTaP-IPV5	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu) un poliomiēlītu. Bērnu drīkst vakcinēt agrāk, ja bērns uzsāk obligātās pamatzglītības apguvi	
		Masalas, masaliņas, epidēmiskais parotīts	MPR2		Pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu revakcinē bērnus, kuri saņēmuši vienu MPR vakcīnas devu. Bērnu drīkst vakcinēt agrāk, ja bērns uzsāk obligātās pamatzglītības apguvi
		Vējbakas	Varicella2		Pret vējbakām revakcinē bērnus, kuri saņēmuši vienu vakcīnas devu pret vējbakām un kuri nav pārslimojuši vējbakas. Bērnu drīkst vakcinēt agrāk, ja bērns uzsāk obligātās pamatzglītības apguvi
10.	12 gadi (meitenes)	Cilvēka papilomas vīrusa infekcija	CPV1 un CPV2 vai CPV1, CPV2 un CPV3	Divas vai trīs devas atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai un meitenes vecumam vakcinācijas brīdī	
11.	14 gadi	Difterija, stingumkrampji un poliomiēlīts*	dT-IPV6	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju un stingumkrampjiem ar samazinātu difterijas toksoīda daudzumu	

* līdz 2020. gadam