
Algoritms: Mātes kolapss, diferenciāldiagnostika
4.ATSD agrīnai pacientu identificēšanai stacionārā
3. Simptomi un pazīmes, kas liecina par kritisku stāvokli
1. Mātes kolapss
2. Fizioloģiskās pārmaiņas grūtniecības laikā, kas ietekmē palīdzības sniegšanu
12.Mātes kolapsa galvenie iemesli
4 H
4 T
PE/E
9. Ievietošana ITN (operāciju zālē)
5. Rīcība stacionārā
6.Rīcība pirms slimnīcas etapā
10.ABCDEF strukturēta pieeja
13.Trombembolija
14.Asiņošana
15.Sepse
16.Sirds slimības
17.Intrakraniāla asiņošana
18.Eklampsija
19.Medikamentu toksicitāte
20.Anafilakse
21.Augļūdens embolija
22.Citi cēloņi
11.Sekundārā izvērtēšana
7b. Pieugušo KPR
ja gestācijas laiks < 20. -24.ned. vai dzemdes dibens zem nabas
7a.Grūtnieces kardiopulmonālā reanimācija
ja gestācijas laiks > 20. -24. ned. vai dzemdes dibens virs nabas
Skatīt algoritmu Grūtnieces kardiopulmonālā reanimācija
Ja nav efekta 4 minūšu laikā un grūtniecības laiks > 20 nedēļām veikt *peri mortem* ķeizargrieziena operāciju 5.minūtē auglim/bērnam ir jābūt piedzimušam
Atjaunojas cirkulācija
8.*Peri mortem* ķeizargrieziena operācija
Skatīt algoritmu *Peri mortem* ķeizargrieziena operācija
23.Pacienta informācija: VM infografika Mātes mirstība Latvijā
7a. Turpina KPR
Saskaņā ar Eiropas atdzīvināšanas Padomes algoritmiem