



Uzvari cīņā ar vēzi, pirms tā sākas!

MAMMU, TĒTI, VAI JŪS ESAT IZDARĪJUŠI VISU IESPĒJAMO, LAI PASARGĀTU MANI NO VĒŽA?

Vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu (CPV) ir **valsts apmaksāta meitenēm vecumā no 12 līdz 17 gadiem (ieskaitot)**. CPV vakcīna pasargā no priekšvēža izmaiņām un dzemdes kakla vēža attīstības.

Par iespēju vakcinēties jautā ģimenes ārstam

Vizītes datums pie ģimenes ārsta:

dd/mm/gg

1.

pote

dd/mm/gg

2.

pote

dd/mm/gg

Divas potes, ja vakcinācija veikta 12 līdz 15 g.v.

3.

pote

dd/mm/gg

Trīs potes, ja vakcinācija uzsākta pēc 15 g.v.

ZINI FAKTUS PAR CPV

- Cilvēka papilomas vīruss, saukts arī par CPV vai HPV (angl.val. human papilloma virus), var izraisīt dažādu orgānu (dzemdes kakla, maksts, ārējo dzimumorgānu, taisnās zarnas, kā arī mutes un rīkles) audzējus sievietēm un vīriešiem.
- Ar CPV parasti inficējas dzimumkontakta ceļā. 8 no 10 seksuāli aktīviem cilvēkiem ir inficēti ar CPV.
- Ir pierādīts, ka 99% gadījumu dzemdes kakla vēzi izraisa CPV.
- Latvijā dzemdes kakla vēzis ir otrs biežāk sastopamais ļaundabīgais audzējs gados jaunām sievietēm. Tas tiek diagnosticēts vidēji 240 sievietēm gadā un ik gadu Latvijā no šīs slimības mirst vidēji 110 sievietes.
- Vakcinācijas pret CPV mērķis ir novērst priekšvēža izmaiņas un saslimšanu ar dzemdes kakla vēzi un citām CPV izraisītām onkoloģiskajām slimībām.
- Visaugstākā vakcinācijas efektivitāte ir jaunām meitenēm un sievietēm pirms dzimumattiecību uzsākšanas.

Kā pasargāt sevi no dzemdes kakla vēža un par iespēju vakcinēties, jautā savam ģimenes ārstam vai ārstam speciālistam.



Veselības ministrija



Slimību profilakses un
kontroles centrs

Vairāk informācijas: www.spkc.gov.lv