

MĀTES UN BĒRNA VESELĪBA

2008. gadā turpinājās pozitīva tendence dzemdības un abortus raksturojošos statistiskajos rādītājos. Pozitīvi, ka 2008. gadā mātes mirstības un zīdaiņu mirstības rādītāji nedaudz samazinājās, lai gan tie joprojām vērtējami kā augsti.

Jāatzīmē, ka šajā nodaļā atspoguļotie dati var atšķirties no iepriekš publicētajiem, jo 2008.gadā informācija par dzemdībām, jaundzimušajiem balstās uz Jaundzimušo reģistra datiem.

Dzemdību skaits pieaudzis par 735 gadījumiem (23834 pret 23099 2007. gadā).

Mākslīgo abortu rādītājs ievērojami samazinājies – 435 uz 1000 dzīvi dzimušiem pret 508 uz 1000 dzīvi dzimušiem 2007. gadā. Samazinājušies arī mākslīgie aborti uz 1000 sievietēm reproduktīvajā vecumā (15-49 gadi) – 17,8 pret 20,2 2007. gadā. Mākslīgo abortu skaits turpina samazināties, ne tikai Latvijā, bet arī pārējās Baltijas valstīs. Lietuvā 2007. gadā novēroja viszemāko mākslīgo abortu rādītāju uz 1000 dzīvi dzimušiem – 297, tad sekoja Latvija – 508 un Igaunija – 564.

Kopējais mākslīgo abortu īpatsvars ir 69,8% (72,5% 2007.gadā) no visiem abortiem. Arī legālo abortu īpatsvars 2008. gadā bija ievērojami samazinājies – par 2,8 procentu punktiem (68,4% pret 71,2 2007. gadā).

Ambulatoro iestāžu statistikas dati liecina, ka grūtniecības uzskaitē reģistrētas 2,3% pusaudzes (2,4% 2007. gadā), šis rādītājs praktiski nemainās. 2008. gadā bijušas 4 dzemdētājas līdz 14 gadu vecumam un 513 no 15 līdz 17 gadiem, kas ir attiecīgi 0,01% un 2,2% no visām dzemdētājām.

Pēc pēdējiem pieejamajiem statistikas datiem valstu salīdzinājumā, redzams, ka 2007. gadā Latvijā bija 8,6% jaundzimušo mātes līdz 20 gadiem, Lietuvā – 7,5%, Igaunijā – 7,4%, savukārt Ziemeļvalstīs vidēji 2%.

Perinatālā mirstība saglabājas iepriekšējā gada līmenī – 9,2 pret 9,4 no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem 2007. gadā, jo kopā perinatālajā periodā mirušo jaundzimušo skaits praktiski nav mainījies – 222 pret 219 gadījumiem.

Kā pozitīvu faktu var minēt, ka palielinās bērnu īpatsvars, kuri ilglaicīgāk tiek **baroti ar krūti**. Līdz 6 mēnešiem mātes pienu saņēmuši par 3,1 procentu punktiem vairāk jaundzimušo nekā 2007. gadā (48,9% - 2008.gadā; 45,8% - 2007. gadā), līdz 3 mēnešiem ar mātes pienu baroto bērnu īpatsvars ir palielinājies par 2,1 procentu punktu (73,5% - 2008. gadā; 71,4% - 2007. gadā), kā arī par 0,7 procentu punktiem palielinājies to bērnu īpatsvars, kuri baroti ar mātes pienu līdz gada vecumam (18,9% - 2008. gadā pret 18,2% - 2007. gadā). Pieaudzis arī to zīdaiņu īpatsvars, kuri ēdināti ar krūti līdz 6 nedēļām. Lai saglabātos pieauguma tendence to bērnu īpatsvarā, kuri ilglaicīgāk tiek baroti ar mātes pienu, nepieciešams turpināt darbu pie zīdīšanas veicināšanas pasākumu izstrādes un to īstenošanas sabiedrībā, jo kā zināms zīdīšanas veicināšana ir viens no efektīvākajiem pasākumiem, lai uzlabotu bērnu veselību, kā arī tai ir būtiska ietekme uz mātes veselību.

Bērnu (0-17) saslimstībai **ar infekcijas un parazitārām slimībām** ir mainīgs raksturs. 2008. gadā vērojams pieaugums atsevišķām slimībām: difterijai (2,7 gadījumi uz 100 000 apskatītiem bērniem 2008. gadā pret 1,4 gadījumi – 2007. gadā), ērcu encefalītam (4,1 pret 3,6 – 2007. gadā), kā arī akūtām zarnu infekcijām (1435,7 pret 1130,5 – 2007. gadā).


1. tabula

Daži reproduktīvo veselību raksturojošie rādītāji

| | Mākslīgo abortu skaits uz 1000 dzīvi dzimušiem | Mākslīgo abortu skaits uz 1000 sievietēm 15-49 gadu vecumā | Apauglotība uz 1000 sievietēm 15-49 gadu vecumā | Dzemdību skaits | Ārpusdzemdes grūtniecību skaits uz 1000 dzīvi dzimušiem |
|------|--|--|---|-----------------|---|
| 1999 | 933 | 29,7 | 70,8 | 19 276 | 35,2 |
| 2000 | 854 | 29,1 | 72,7 | 20 194 | 34,3 |
| 2001 | 796 | 26,5 | 68,5 | 19 555 | 31,3 |
| 2002 | 734 | 24,8 | 66,8 | 19 955 | 26,7 |
| 2003 | 691 | 24,5 | 68,4 | 20 886 | 27,1 |
| 2004 | 674 | 23,2 | 65,7 | 20 256 | 25,7 |
| 2005 | 594 | 21,6 | 66,4 | 21 417 | 26,9 |
| 2006 | 530 | 20,0 | 66,0 | 22 197 | 23,0 |
| 2007 | 508 | 20,2 | 67,8 | 23 099 | 22,8 |
| 2008 | 435 | 17,8 | 67,1 | 23 834 | 20,7 |

1. attēls

Zīdaiņu barošana ar krūti



2. tabula

Bērnu (3-14 gadi) un pusaudžu (15-17 gadi) veselības stāvoklis

| | Gads | Sadalījums veselības grupās. % | | | Profilaktisko apskašu rezultāti (no 1000 apskatītiem) | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------|---|------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | | I grupa | II grupa | III grupa | pazemināta dzirde | pavājināta redze | valodas traucējumi | skolioze | stājas traucējumi |
| Bērni (3-14) | 2006 | 56,7 | 39,1 | 4,2 | 4,6 | 97,4 | 39,6 | 33,8 | 130,8 |
| | 2007 | 57,2 | 38,9 | 3,9 | 4,9 | 98,1 | 41,0 | 36,1 | 132,8 |
| | 2008 | 57,8 | 38,4 | 3,8 | 5,0 | 99,8 | 43,1 | 38,0 | 131,4 |
| Pusaudži (15-17) | 2006 | 59,3 | 36,7 | 4,0 | 3,6 | 117,0 | 5,8 | 55,1 | 131,8 |
| | 2007 | 59,7 | 36,7 | 3,6 | 3,8 | 117,0 | 6,9 | 54,9 | 126,7 |
| | 2008 | 59,0 | 37,4 | 3,6 | 4,4 | 122,8 | 7,7 | 61,7 | 136,3 |

3. tabula

Daži bērnu saslimstības rādītāji
uz 100 000 bērniem (0-17 gadi)

| | 2005 | 2006* | 2007* | 2008 |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Visu formu aktīva tuberkuloze | 19,6 | 21,8 | 17,1 | 15,2 |
| Sifiliss | 3,8 | 1,9 | 1,2 | 0,7 |
| Difterija | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 2,4 |
| Meningokoku infekcija | 2,9 | 1,4 | 3,7 | 2,7 |
| Ērču encefalīts | 3,8 | 4,1 | 3,6 | 4,1 |
| Laimas slimība | 13,1 | 16,7 | 9,4 | 8,7 |
| Akūts vīrushepatīts B | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 1,2 |
| Akūts vīrushepatīts C | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 1,7 |
| Akūtas zarnu infekcijas | 1050,2 | 1384,6 | 1130,5 | 1435,7 |