

# Bērnu vakcinācijas kalendārs 2019. gadā

Vakcinācijas kalendārs ir viegli lietojams - atrodi bērna vecumu un uzzini, pret kuru infekcijas slimību, atbilstošajā vecumā, bērns jāvakcinē

0-12 stundas	no 12 stundām	no 6 nedēļām	2 mēneši	4 mēneši	6 mēneši	6-23 mēneši (ieskaitot)	12-15 mēneši	7 gadi	12 gadi	14 gadi
B hepatīts <sup>1</sup>	Tuberkuloze <sup>2</sup>	Rotavīrusu infekcija <sup>3</sup>	(kombinētā vakcīna) Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts	(kombinētā vakcīna) Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts	(kombinētā vakcīna) Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts	Gripa <sup>4</sup>	(kombinētā vakcīna) Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts	(kombinētā vakcīna) Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts	(tikai meitenēm) Cilvēka papilomas vīrusa infekcija <sup>5</sup>	(kombinētā vakcīna) Difterija, stinguma krampji
			Pneimokoku infekcija	Pneimokoku infekcija			(kombinētā vakcīna) Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas	(kombinētā vakcīna) Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas		
							Pneimokoku infekcija	Vējbakas		

**Piezīmes**

<sup>1</sup> Vakcīnu pret B hepatītu pirmajās 0-12 dzīves stundās ievada tikai riska grupas jaundzimušajiem (bērniem, kuri dzimuši mātēm, kuras inficētas ar B hepatītu (B hepatīta virsmas antigēna (HBsAg) pozitīvām mātēm) vai mātēm, kuras nebija pārbaudītas HBsAg klātbūtnes noteikšanai. Turpmākās vakcīnas devas ievada atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai.

<sup>2</sup> Ja vakcinācija pret tuberkulozi tiek veikta bērnam, sasniedzot 2 mēnešu vecumu, pirms vakcinācijas tiek veikts tuberkulīna ādas tests (Mantū reakcija), lai izslēgtu iespējamo bērna inficēšanos ar tuberkulozi.

<sup>3</sup> Vakcinācijas kurss pret rotavīrusu infekciju ietver divas vai trīs vakcinācijas atbilstoši esošās vakcīnas lietošanas instrukcijai.

<sup>4</sup> Vakcināciju pret gripu sešus līdz 23 mēnešus (ieskaitot) veciem bērniem uzsāk ar 2019. gada 1. oktobri.

<sup>5</sup> Kurss pret cilvēka papilomas vīrusu infekciju ietver vakcinācijas divas potes, kuras ievada atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai.

**Atceries!** Vakcinācija ir labākais un efektīvākais veids, kā bērnu pasargāt no bīstamām un nāvējošām infekcijas slimībām!

Vakcinācijas kalendārā iekļautās vakcinācijas par valsts budžeta līdzekļiem pienākas ikvienam bērnam, arī tad, ja viņš nav bijis vakcinēts savlaicīgi (medicīnisku vai citu iemeslu dēļ).



Slimību profilakses un kontroles centrs



Nevakcinētam bērnam apmeklējot sabiedriskas vietas, palielinās inficēšanās risks gan pašam, gan apkārtējiem.

Ļoti svarīgi sekot līdzi vakcinācijas kalendāra ievērošanai un laikus izdarīt paredzētās vakcinācijas, lai aizsargātu bērnu pirms tas sasniedz vecumu, kad inficēšanās risks ir visaugstākais.

Atbilstošajā vecumā paredzētās vakcinācijas ir iespējams veikt vienlaicīgi un tas nemazina to iedarbību.

Ja Jums radās jautājumi par bērna vakcināciju, iesakām vērsties pie ģimenes ārsta