

# Kā aptur Ebolas vīrusslimības izplatīšanos?



LATVIJAS REPUBLIKAS  
VESELĪBAS MINISTRIJA

**SPKC.gov.lv**  
SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS

**1**

Iespējama slimnieks ir jāatrod un saslimšana jādiagnosticē pēc iespējas ātrāk



Ķermeņa temperatūras paaugstināšanās un citi raksturīgie simptomi  
+  
kontakts ar slimnieku/ mirušo no Ebolas vīrusslimības  
vai  
ceļojums uz Ebolas vīrusslimības uzliesmojuma skarto valsti



Palikt mājās, nekavējoties sazināties ar ārstu un informēt par savu kontaktu ar slimnieku vai ceļojumu un iespējamo inficēšanos



Asins analīze



Parauga testēšana laboratorijā

**2**

Izolē un izmeklē slimnieku



Pacients hospitalizēts un izolēts



Pacients tiek aptaujāts, noskaidrotas un sameklētas visas kontaktpersonas



Slimnieka kontaktpersonas tiek informētas un uzraudzītas **21 DIENU** pēc saskarsmes ar slimnieku – ķermeņa temperatūras mērīšana divas reizes dienā



Ja kādai kontaktpersonai novērošanas laikā konstatē paaugstinātu  $t^0$ , process sākas no sākuma

**3**

Infekcijas izplatības ierobežošana ārstniecības iestādē



Aizsargtērpi un piesardzības pasākumu stingra ievērošana



Materiāls tapis, izmantojot Amerikas Slimību Kontroles Centra informāciju [www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)  
Sagatavots: 2014.gada 17.oktobrī.

PLAŠĀK:  
[www.spkc.gov.lv](http://www.spkc.gov.lv) un [www.vm.gov.lv](http://www.vm.gov.lv)